





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu





LEXICON
MEDICVM, GRAE-
COLATINVM. DON V
BARTHOLOMÆI CASTELLI
MESSANENSIS STUDIO,
EX HIPPOCRATE, ET GALENO

alena DESVMTVM. *Disputa de Antibis*

ΕΚ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΔΟΧΑ

PERMITTIBVS



PERIORIBVS.

MESSANÆ, Typis Petri Breæ 1598

IN HOC LEXICON OMNIUM
 medicarum vocum, ex Græco, & Latino
 idiomate desumptarū, quibus Gal. Hipp.
 alijq; grauiiores autores vsi sunt, Etymon
 & significatio, quam plurimā à Galeno
 venari licuit, serie alphabetica, recen-
 setur.

BARTHOLOMÆI CASTELLI
*Theologi, Philosophi, & Medici Messanensis,
 atq; in publico Messanēsi Gymnasio praxeus Me-
 dicinæ professoris publici, opera & studio, plures
 annos elaboratum, nunc demum in lucem editum.*

IN CALCE VERO OPERIS AD-
 ditæ sunt, præcipuæ Arabicæ voces, ad
 rem medicam facientes, classicis autori-
 bus frequentatissimæ, quibus adiectæ à
 latere sunt Græcæ & Latinæ, illis signifi-
 cato respondentes.

ILLVSTRISSIMO 02
MESSANENSI
SENATV I.

*Petro Pharaonio, D. Francisco de Ioanne,
D. Iacobo de Iuenio, Paduano de Costa,
D. Thomæ de Gregorio, Ioan-
ni Cauaturio.*



VANTVM semper
Fortuna, tuo nomini
perpetuam & immor-
talem in rebus bellicis
foris gestis gloriam,
æternumque tuorum gestorū moni-
mentum, inuiderit, testes sunt omnes
sapientum virorum libri, plena vetu-
stas, quæ firmo ære, stabiliq̃ue mar-
more Messanensium gesta, quæ ad Ro-
manum fouendum, & augēdum im-
perium,

perium, cum quo tibi perpetuum fœ-
dus initum fuerat, pertinerent, tum
quæ ad hostium insultus reprimendos
facerent, incidi curauit; deficeret me
dies si hoc loco, ea omnia, breui com-
pendio percensere numerâdo vellem.
Deerat tamen ad apicē, & culmen tuæ
felicитatis consequendum id vnum, ut
abesset inuidia, totiusq; Italiae floren-
tissimis studijs, doctrinas omnes exco-
lendo, superior videreris; Id à te præ-
senti hoc instituto, superioribus annis
factum esse intelligo, vt quas in omni
scientiarum genere, priuato studio, cō-
tinuis lucubrationibus, Academies in-
stitueras, publico Summorum Ponti-
ficum, Imperatorum, Regumq; di-
plomate nunc confirmares, & docto-
ratus insignijs decorares, quo quid illu-
strius ingenuæ, & insigni urbi nobili-
tatis

03

tatis titulo donatæ? Cùm nihil inge-
nuo, libero, clarisq̃ue natalibus orto vi-
ro, magis è re possit cedere, quàm vel
præsentem nobilitatem adipisci, uel
adeptâ tueri, & augere; Id omne quod
est summę nobilitatis impressum figil-
lum, vobis omnibus acceptum referi-
mus, Illustrissime Senatus, quo mune-
re hæc vrbs vestrum omnium ope, &
auxilio donata, gloriatur, seque supe-
riorem omnibus Italiæ urbibus, iure
iactat. Ego verò vestri nominis deuo-
tissimus ciuis, ad quem huius gloriæ
pars pertinere potest, eam ex animi
mei stimulis, spectando, & assidua
medicæ rei lectione, vobis præcipien-
tibus, ad augendo, ita persentio, vt in-
grato viderer animo, nisi vobis, accep-
ti muneris gratias, totius urbis nomine
pro viribus referrem, nomēq; vestrū,

non iam ex ære alte incisis literis ; aut è
solido marmore insculptis imagini-
bus , sed ad perpetuam orbis terrarum
memoriam, huic, operi, (quod vestre
glorię multo inferius est monimētū,)
inscriptis nominibus, futuro ævo, cō-
mendatum consecrarem ; Quod qui-
dem opus , multo ante à me tempore
confectum & elaboratū, quod ἀνέφαλον,
& sine capite, fautore, & patrono esset,
in lucem prodire pertimescebat, atque
inuidorum telis laceffitum, asylum ali-
quod, ad quod tanquam ad sacram an-
choram confugeret, exoptabat. Ve-
stro igitur nomini dicandum illud, &
consecrandum curavi, Illustrissime Se-
natus, vt qui ea hilari atq; exporrecta
fronte, qua literarū studia es cōplexus,
eadem ēt tuorum studiorum alūnos,
sectatores, professores, professorum q̃;
con-

conceptos partus in lucem editos, alas,
foucas, nutrias, atque in perfectam in-
dolem adolere contendas. Id verò one-
ris suscipiendi, operisq; componendi,
ea fuit apud me ratio, vt rei medicę au-
ditores, meę fidei commissos, quos à
primo limine, vsque ad omnes medi-
cinę gradus, supremumq; doctoratus
apicem promouere (quod mei mune-
ris est) semper conatus sum, in ianuis
aberrare non permetterem, sed ijs om-
nibus, medicarum vocum etymon, &
significatio innotesceret, ne vel meis,
aut aliorū Doctorū medicis lectionib;
audiēdis, vel Hippocratis, Galeni, Aui-
cennę, cęterorumq; classicorum libris
percurrentis, vocis alicuius proprię
ignorantia, à cursu lectionū, eos auer-
teret, & remoraretur, atq; ad vltorio-
ra intelligenda aditum præcluderet;

Quod & ego, cum eiusdem artis studio initiarer, in me ipso expertus fueram dum legentem Ioannem Antonium Pisanum, in Neapolitana Academia audirem, ignorata enim vel morbi alicuius, vel humani corporis partium voce aliqua, in reliquis omnibus cęcutire videbar, atq; ob id vehementi me rore angebar, donec ab eodem Pisano, eiusdem vocis significationem domi edoctus, cętera omnia prospero flatu, claraque intelligentia prosequutus fuisset. Non erit igitur deinceps medicinę sectatoribus insudandum, in inuestigandis medicarum vocum significatis, ex Græco potissimum fonte desumptarum, quamuis Græcarum literarum prorsus sint imperiti cū hinc tum Græcorum omnium, tum Latinorum, tum Arabum voces medicas


vocum-

65
vorumq; depromptas significationes,
nullo labore, haurire possint. Hoc
itaque opus, diuturnis meis lucubrati-
onibus editum, Illustrissime Senatus,
hilari fronte suscipias, atque ubi quan-
tus utilitatis cumulus medicæ rei stu-
diosis, ex eo accrescat, cognoveris, me
ad maiora in tui honorem, eorundem
commodum & beneficium, in sin-
gulos annos, excudenda eriges; Deus
Opt. Max. in dies Nestoreos vos sospi-
tet, & incolumes reddat.

Bartholomæus Castellus, vestrum
omnium studiosissimus,
filius, & ciuis.

AV-

AVTOR LECTORI
MEDICÆ REI STUDIOSO.



NIL arduum, aut laboriosum unquam existimaui, quod è re tua foret, studiosè Lector, cum nihil mihi iucundius à primæua etate visum fuerit, quàm cæteris prodesse; non enim nobis solis nascimur sed posteris, iuxta illud, Homo homini Deus; Cùm igitur experimento comprobauerim, eos qui rem medicam sectantur, non tam sapientiæ, quàm lucri studio, cum primum humaniores literas superarint, vixq; è primis Grammaticæ rudimentis emerferint, in altum Philosophiæ & Medicinæ pelagus, se ipsos sponte insinuare, ignoratis utriusq; scien-

scientia vocibus, quæ prima elementa censentur; & ceco ductore, in vastissimum scientiarum campum, & inextricabilem labyrinthum, citra Ariadnæ filum, (quo remeare possent) ingredi, Græcæque literas, unde omnis scientiæ, tum præsertim medicæ rei cognitio, & rerum & vocum proprietas ortum duxerat, à primo certe limine insalutatas deferere; quo sit ut necesse illis sit, in reliquo medicinæ curriculo, cacutire; Propterea tantæ temporis calamitati consulens, nullique meo labori parcens, annis superioribus id oneris assumpsi, ut scholares meæ fidei & doctrinæ commissos, primum medicinæ elementa, rudimenta, principia, & voces edocerem, tum demum ad supremum eiusdem facultatis apicem virtute cōnixos deducerem, ut hinc & medicarum vocum, & uniuersæ artis cognitio illis facile pateret, nec esset quod in re exigua, ac vo

cum

cum significatione illis immorandum esset,
sed ultro ad altiora, eiusdē facultatis axio-
mata, cognitivis vocibus, possint asurgere,
quamvis Græcarum literarum essent prorsus
ignari. Nec ignoro, id laboris à Do-
ctissimo Manardo, Ioanne Gorreæ, ceteris-
que assumptum fuisse; ab illo tamen intem-
pesta morte intermedia, inexpletum; ab hoc
completum quidem, sed literis Græcis sca-
tens, non omnibus, aditum ad apertum de-
relictum, nisi Græci idiomatis peritissimis,
qui non nisi paucissimi reperiuntur, intelli-
go. Neuter adhuc ex Galeni Hippocratis-
que autoritatibus (ut mei instituti est) vo-
cū significationē haustam, adduxit, sed sua
sponte ut quisque interpretatur, intellexit.
Nec in eorum ego sum genere, qui ne olus
quidem in foro empturi sunt citra definitio-
nem, nec alicuius vocis significationem ad-
mittunt, quin illius essentiam, quidditativa

(ut vocant) definitione perscrutati fuerint;
 Mihi solum satis superque fuit, et ymon, et
 vocis cuiusque significatum ex Hippocra-
 te vel Galena desumptum, succincto sermo-
 ne explicare, ut ij qui acutius vocis intelli-
 gentiam introspicere voluerint, ex ijsdem
 autoribus, ad quos Lectorem remittimus,
 eam facile consequantur. Monitum adhuc
 te cupio Lector, (ne quid in hoc opusculo de-
 siderari existimes) me hic simplicium, & sponte
 nascentium terra corporum, significationem
 non allaturum, cum eorum omnium, ab ex-
 ercitatissimo Matthiolo, iuxta singularium
 nationum voces singulares, quae in usu apud
 eas sunt, in suo de Simplicibus volumine,
 maximo, nomina recensita, & declarata
 fuerint. Quin & forte invidia stimulis
 actus, ad hoc opus elaborandum deductus
 sum, cum suarum propriarum vocum, &
 terminorum, (quos logici vocant) significa-
 tiones,

tiones, suo quaque scientia Lexicon profi-
teatur, ut hinc Lexicon Iuris, hinc Lexicō
Theologicum, in utraque facultate celebra-
tissima habeantur; aqua igitur ratione, &
Lexicon Medicum institui fas erat, ne tan-
to bono, ars medica spoliaretur. Nostro igi-
tur labore, in tuam gratiam suscepto, stu-
diosè Lector, vivere. Vale.

Messana 1598. Idibus Septembris.

IN CASTELLIANVM
LEXICON.

N. Antonini Colossi Carmen.

D Edalus haud tantū fert nominis, implicuisse;
Stamine quā cecas explicuisse domos.

Non laus Aetē seruasse penatibus aurum

Phryxum; Aesonida sed retulisse datur.

Atlas Hesperidum vigili pomaria clausit

Angue, sed Alcides aurea mala tulit.

Ille quidem summo me iudice dignus honore est;

Qui, quid habent vsus optima quæque, docet.

Scilicet inuentum primus qui cuderit aurum:

Murice qui tinxit veller a purpureo:

Quique in Erythæo proiectis littore baccis,

Instituit torques excoluisse nurus.

Quātum igitur laudis diues CASTELLE, mereris.

Qui tot primus opes, tot bona prima doces.

Non etenim herbarū, et lapidū quod munus, et vsus,

Sed quæ uerborum est vis, ratioq; doces.

Dedaleos nexus filo, ambagesq; resoluis,

Auratos villos, aurea poma refers.

Dædalus, Alcides, tibi cedant, cedat Iason:

Te magis his etenim laus diuturna manet.

Ad Lectorem.

Transtulit in Zāclem veteres CASTELLVS Athenat,

Lector habes Phrygiā hūc Pergamō, atq; Rhodō.

AN-

ANNIBALIS BVFALI
art. med. doct. ad Lectorem
Carmen.

Quæ Galenus habet, quæcūq; vocabula magn'
Continet Hippocrates, & bene nosse iuvat.
Nomina morborum, symptomata, multa; lucem
Quæ præstant medicis non sine fruge libris.
Hæc tibi CASTELLI ingenium, doctusq; libellus
Edocet, & cuius commoda multa parit.
Cui studiosa cohors pro tanto munere grates
Reddat, ut impressis nobiliora parer.

MVTII FERRARA
Art. Med. Doct. Epigramma.

Hippocrati debet, debet Medicina Galeno,
Vni CASTELLO debet at illa magis.
Nam ueluti Alcidem ducentia fila sequuntur
Fama est ambiguas, isse redisse vias.
Sic dubia is Veterum, perplexaq; dogmata seruans,
Explicat hæc, claris nominibusq; refert.
Cæcas ambages, labyrinthos arte resoluit,
Et verum ex vero verius ipse legit,
Quantum quisq; potens medica re, debeat isti,
Si nosset, meritum prosequeretur opus.
Continuo edocuit, dignatus Apollinis artes
Altior humana mente, honor vnde sibi est.

LEXICON

MEDICVM,

HIPPOCRATIS, GALENI,
ET AVICENNÆ.

Autore

BARTHOLOMÆO CASTELLO

Theologo, Philosopho, & Medi-
co Messanensi.



A



BAPTISTA, terebella est,
qua in fracturis capitis, quæ vsq;
ad Cerebri membranam perue-
nerunt, quādo id quod contusum
est, excidi debet, vtimur, Cui
terebella, ne dum Medici eam
audacius tractātes duram mem-

branam quæ ossi substernitur, violent, supra eius
acutā cuspīdem, circulum quendam, siue labrum,
siue supercilium, parum extans efformant, quem ab
argumento abaptistam, vocant, 6. meth. cap. 6.

Abarticulatio, idem est, q̄ dearticulatio, idest ea
naturalis ossium coniunctio, quæ euidentem motum

A habet

habet, sicut coarticulatio, est ea naturalis ossium commissio, quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præferret, 2. de artic. 8.

Abdomen, sunt duo muscoli recti, & carnosissimi, qui à pectore, ad ipsa pubis ossa perueniunt, qui sibi cohererent, coalescuntque, & quod conflatum ex ipsis est, Græci Epigastrium idest abdomē nominarunt, 6. meth. 4. quod & Hypogastrium vocant, 6. de usu par. cap. 4. estq; commune omnium viscerum operimentum 1. de semine, cap. 15. quod abdomen his tribus partibus constat, hypochondrys, locis ad umbilicum attinentibus, & imo ventre, 2. aphor. 35.

Abductiones, quæ & abruptiones, apagmata, & apoclasmata dicuntur, fracturæ sunt, quæ propè articulum, per totam ossium crassitudinem fiunt, ita ut à se plurimum distent, quas recentiores caulatim fractas fracturas nuncupant, co. 3. in lib. Hipp. de his quæ in medicatrina fiunt, 31.

Ablatio totum illud tempus, paroxysmi febrilis est, quod post statum est, qualicunque natura prædictum, sine id ad integritatem veniat, siue non, quod & remissio, internallum, declinatio, & submissio dici solet, lib. de morb. tempor. cap. 6.

Abluentia, & abstergentia medicamenta sunt, quæ succum mordicationem facientem, leniendo euacuant, 1. de simpl. med. fac. cap. 37. & lib. 2. cap. 14.

Abolitionem pulsus vocamus, cum eleuatis, & mox applicatis digitis inuenimus in singulis applica-
tioni.

tionibus motum deficientem, longe enim abest pulsus abolitio, à pulsu deficiente, illa enim est veluti defectus, ut sensus quidem indicat totius functionis, hic dimidiata amissio, 2. de caus. puls. cap. 3.

Aborsus est imperfecta fetuum emissio, ut cumque facta fuerit, quam Hipp. nunc amblosin, nunc perditionem, nunc apophthoram vocat, & medicamenta id præstantia amblotica, id est, abortiva, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Abrasa sunt, quæ aposyrmata Græci vocant, suntque ulcera quæ mollem & suspensam habent cuticulam, 1. de compos. med. per gen. cap. 12.

Abrasio intestinorum, est ulceratio partium quæ in superficie intestinorum constat, quæ earundem partium eliciamenta solent, 3. de ratione vict. in morb. acut. 33.

Abruptio, vide Abductio.

Abscedentia corpora, siue quæ absceſerunt, vocat Hipp. omnia quæ cum corpus secundum naturam se se habet, vel unita aliquibus alijs partibus sunt vel eas attingunt, cum præter naturam affectum est unionem vel contactum non amplius servant, Expansa autem vocat quæ plurimo intervallo inter se distant, id quod duobus modis fit, vel in toto, vel in labris tantum, 2. de his quæ in medic. fiunt, 25. vide apofleſis.

Abscessio apud Hippoc. id est, quod ego soled continuitatis solutionem appellare, & membra quæ ita affecta sunt, abscedentia vocat, tamen si una quædã

species huius generis sit, quam proprie abscissionem
& abscessum, idest, apostasin & apostema nuncupāt,
lib. de his quæ in medic. fiunt in argumento operis.

Abscessus, tumor est præter naturam suppuratus,
non consueto & bono pure, sed in corruptionem quā-
dam aliam tendente, lib. de tumor. cap. 3. aliquando
Hippoc. nō eos solos abscessus vocat, qui per effluxio-
nem fiunt, sed etiam cū alius transit morbus in aliū,
com. 2. in 1. de morb. vulg. 21. *Abscessus* est corpo-
rum ex phlegmone in pus trāsmutatio, lib. finit. med.
fol. 97. *Abscessus* etiam appellat Hippoc. qui excre-
tione noxiorum humorum sunt facti, ne dum qui de-
cubitu, com. 1. in 3. de morb. vulg. 4. vide Sinus.

Abscissio quæ & *Apocope* dicitur, siue mor-
bus ex abscissione est, qui citra declinationem solui-
tur, & terminatur, vel propter ægrotantium imbe-
cillitatem, vel propter morborum fortitudinem, tan-
dem cum morbus supra vires existit, quod mortaliū
morborum est proprium, de totius morb. tempor.
cap. 1. & 5.

Abstergentia, vide *Abluentia*.

Abuacuatio, euacuatio est, aut corpori plus æquo
plethorico conueniens, quæ hypercrisis seu superua-
cuatio dici solet, aut quæ perpatiētem particulam fit.

In arte parua, cap. 95.

Acamatos media est omnium simpliciter mem-
brorum figura, quasi sine fatigatione dixeris, 2. de
motu muscul. cap. 1.

Acan-

Acantha est spina seu spinæ apex, quem natura in spondylis dorsi est machinata, ex medijs partibus postremis, quæ esset velut vallum quoddam ante spinæ totam oppositum, quod prius ipsum contunderetur, ac comminueretur, modisque omnibus afficeretur quam ad vllum spondylum noxa perueniret, 12. de vsupar. cap. 15.

Accessio est deterius tempus totius circuitus, quod est à primo insultu morbi, vsque ad tempus consistendi, siue per tertium, siue per quartum, siue quotidie fiat, 1. aph. 12. quæ & paroxysmus dicitur.

Accidens aliquando passionē significat, id est, ipsæ operationis læsionem, de different. morb. cap. 7. quæ constitutionem vnde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, egrotantibus symptomata dicunt, 1. meth. c. 9. Non accidentia verò vocat recetiores Medici ea quæ non existunt, vt dolore vacare, & huiusmodi, com. 1. prognost. 27.

Accommodatum in corpore dicitur, id quod quando vnicuique rei seruatur, iuste quodlibet se se habet ac disponitur, 1. de fractur. 2.

Acerbum id omne dicitur, quod lingue nostræ admotum, valde deficcet contrahit, & in multam profunditatem vsque, illam exasperat, sicut pyra sylvestria immatura, ab austeris sola intentione duntaxat, diuersum, 1. de simplic. med. fac. cap. 37.

Acetabulum, est illud cauum ossis extremi quod capita alterius ossis altius excipit, quod & *Cotyle*

dicitur, lib. de ossib. in probemio, *Acetabula* ad huc sunt, vasorum & venarum quæ ad matrices perveniunt orificia, quæ & *Cotylidones* dicuntur, quibus fetus matri alligatur, per quæ velut per truncos quosdam fetus ex matrice trahit spiritum & sanguinem, 15. de usu par. cap. 5. non secus ac *Polypi* acetabulis quicquid attigerint; corpora enim vasorum sunt polyporum acetabulis per quam similia, ut nomine etiam non alio appellentur, lib. de Semin. cap. 7. per quæ etiam vasa singulis quibusque mensibus excrementitius sanguis in vulvam derivatur, ibidem, quamvis nonnulli homines vulvam acetabulis carere dicant, lib. de vulvæ dissect. cap. 10. plerunque profundos sinus, magnis superciliis circumdatos, tum *Hippoc.* tum alij, acetabula nūcupare consueverunt, 1. de articul. 21.

Acetabulares vulvæ eminentiæ, sunt tumores vasorum uteri, quos prægnationis tempore adnatos habet, quales etiam recto intestino esse in hæmorrhoidibus solent, lib. de vulvæ dissect. cap. 10.

Achinesia est media quies, quæ inter systolem & diastolem pulsus, intercedit, 1. de differ. puls. cap. 7.

Achlys est circa totum nigrum oculi à superficiali ulceratione cicatricula tenuissima, aëri caliginoso assimilis, lib. Introd. cap. 5.

Achures sunt manācia ulcera cutis capitis, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa effluit sanies; huic morbo affinis est *Fauus*, seu *Cerion*,

Cerion, in quo foramina sunt, quam in illis maiora, melleum humorem continentia, lib. de remed. parat. facil. cap. 5. lib. de tumorib. cap. 15. 1. de comp. med. loc. cap. 8. quæ uulgus uocat Tigna, Arabes sahafati. Achrous, idest, decolores homines, 4. de ratione vict. 115.

Aciam vocat Hippoc. filum per foramen acus traiectum, quo vel partes corporis dissectas inter se committere, vel caput fasciæ subiectis partibus, assuere consueuimus; Nodum verò vinctiōem, quæ ex fasciis inter se connexis fit, com. 2. in lib. de his quæ in medic. fiunt 7.

Acida bilis, quid sit exemplo ostendit Galenus, vinum quidem dulce (inquit) quod non dum ab uuis sit expressum feruens & alterascens ex eo quem in se habet, calore, intelligimus, ex cuius mutatione duo proueniunt excrementa, alterum leuius magisque aëreū, quod florem, alterum grauius, ac magis terreum, quod facem vocant, horum alteri flauam bilem, alteri nigram assimilamus, quando non eandem habent bi succi speciem, cum animans naturæ opera regitur, qualem cum præter naturam se habet, sæpe exhibent, quippe flaua quæ est, efficitur vitellina, ita enim nominant, quoniam ouorum vitellis tum colore, tum crassitudine sit assimilis, nigra vero longè malignior, ea quoque quam quæ naturalis est redditur, nomen tali succo nullum est insitum, nisi quod aliqui vel rudentem eum, vel acidum appellarunt, quoniam acris

in morem aceti fit, & corpus animalis radit, & terram si supra eam sit effusus, quandamq; cum bullis, veluti fermentationem ebullitioneq; excitat, vbi aduentitia putredo nigro illi succo naturaliter se habenti accessit; plerique autem id quod è tali succo naturaliter se habet quod & infra deijcitur, & sæpe supra fluitat, atrum vocant succum, non atram bilem, quod vero ex vstione quapiam in acidam migravit qualitatem, id atram nuncupant bilem, 2. de natur. facult. cap. 9.

Acida pituita est quæ omnino cruda est, omnimoda autem cruditas intelligenda est, quæ in ea concoctione incidit quæ in venis agit; non aut in ea quæ primæ est quæq; in vetriculo perficit, 2. de natur. facult. c. 9.

Acinosa tunica oculi, vide Rhagois tunica.

Acinus, vide Staphyle.

Acmaistica febris est quæ continuo crescendo præcedit ut Epacmaistica quæ decrescendo, Homotena vero quæ simile seruando calorem ad finem usque terminatur, 9. meth. 4.

Acmem, idest, maximam exercitationis & motus intentionem Græci vocant, 2. de sanit. tuenda, cap. 2. sic etiam etatem integram, & summum corporis robur significat, inde translata est vox tum ad alia omnia, tum ad morbos, sic enim medici tertium totius morbi tempus appellant, in quo summum habet vigorem, 1. aph. 13. quam mediam etatem Leonice nus vocat eodem aph. Constitutam, alij constantem, alij subsistentem, quæ media est inter senes et iuuenes 1. de sanit. tuenda, cap. 2. & 6. de sanit. tuen. cap. 6.

Acopa

Acopa medicamēta quæ copon. idest lassitudinem ex multo vehementiq; motu corporibus vel toti, vel particulis obortā tollunt appellamus, ceterum postea à medicis in usu fuit et si non ad lassitudines medicamen ab ipsis sit cōpositū, sed vel ad dolorē diuturnum in alto corporis latentem, vel motū difficilē, vel sensum stupidū, vel particulæ duritiē, vel tensionē, vel tumore scirrhosum, appellare similiter Acopa, modo huiusmodi consistentiam Acopis similem habeant, 7. de compos. med. per gen. cap. 11. etiā si gratia vehementer calfaciendi assumatur, 7. de cōpos. med. local. c. 1.

Acor est ructus quidam acidus ex præsencia ciborum corruptorum in vētriculo, 5. de usu part. c. 4.

Acordius homo, idest, secors quod apud eos duntaxat intelligas qui principatum animæ in corde statuunt, 3. de placit. Hippocr. & Plat. cap. 4.

Acosmia, vide Ataxia.

Acrisiæ vocabulum ab Hippoc. dupliciter usurpatur, vel cū omnino iudicium nullum futurum sit, aut prauum, com. 2. in 1. de morb. vulg. 46.

Acrochordō verrucarū gen^o dolēs estq; exort^o orbicularis, angustam obtinēs basim lib. introd. fol. 57. Quam vocat pensilem verrucam, 2. meth. 2.

Acromion ea est cōpactio, qua os scapulæ à spina tenuē inchoatū, paulatimq; plenius effectū, ad Acromij locum peruenit, ibiq; iugulo cōnectitur, Alij præter hæc ambo quæ coniunguntur tertium os esse inquirunt, quod in hominibus solum deprehenditur, idque

idque Cataclida & Acromion appellant; lib. de ossibus, cap. 14. quod etiam summum humerum vocat, 13. de usu part. cap. 10.

Actiões Prisci omnes actiuos motus nomināt, sicuti omnes motus qui naturaliter se habent nisi actiui sint pathemata, idest; passiones Græci vocant, 2. meth. cap. 3.

Actu aliquid tale esse, ex aduerso est ei quod est facultate, vel potentia, 1. de simpl. medic. facult. cap. 9. at quod energia siue actu calidorum, frigidorum, humidorum, siccorum, vnum quodque tale esse dicitur; uel quod summam habet eiusmodi qualitatem, vel vincit in eo id genus qualitatū aliqua, vel quod ad cognati generis mediocre aliquid, vel quod ad vñ quodlibet à nobis est collatum, 3. de temp. cap. 5.

Acuta exercitatio est cuius celerēs motus sunt, 5. de sanit. tuen. cap. 3.

Acutus morbus est qui ob sui magnitudinem, & casuum vehementiam ad summum vigorem celeriter properat, 2. aphor. 23.

Acutus simpliciter morbus est, qui intra quartum decimum diem integrè indicatur, Acutus vero ex decidentia vsque ad quadragesimū terminatur, 2. aph. 23. Per acutus vero morbus qui ad septimum vsque diem extenditur, qui longius procedit simpliciter acutus. Exactè peracutus, est qui quartum diem attingit, non exactè qui septimum; Exactè acutus qui decimum quartum, non exactè qui vigesimum, quod au-

tem

dem ex delapsu acutum ad quadragesimū, 2. de dieb. decret. cap. 12. quem acutum ex delapsu, siue ex decidentia vocat Hippoc. acutum adauctum, & acutū ex conuersione, 3. progn. 10. & 1. progn. 25. acutas etiam simpliciter vocat eas febres quæ maxima ex parte continuæ sunt, 2. de cris. 12.

Acutus ex decidentia, vide Acutus simpliciter.

Acutus adauctus, vide Acutus simpliciter.

Acutus ex conuersione, vide Acutus simpliciter.

Acuta febris, vide Acutus simpliciter.

Adedētes, 1. phagedenæ, lib. de aër. aq. & loc. cap. 2. vide Phagedenæ.

Aden, 1. glandula, cōuolutio quedā est sicca, et carnosā, vel carnosā conglomeratio, lib. finit. medic. fol. 97. eundem adenem corpus carnisforme vocat quod utique velut cuneus quidam, vasorum diuisionibus incubans fulcimentum ipsis tutum suggerit, vt à nullo violento casu afficiantur, 4. de usu part. cap. 20. quem adenem Thymū uocat, 6. de usu part. cap. 4. adhuc & adenam, seu glandulas vocat carnosas partes raras, & spongiosas quæ in alis, inguine, & collo sunt, 13. meth. cap. 5.

Adeps, qui & axungia dicitur, differt à pinguedine, quod ille crassior sit, animantibusq; totam naturam terrosiorem habentibus prouenit, velut humidioribus pinguedo; At tu si uoles oleosam & pingue in animalibus substantiam omnem, adipem appellato, vt plerique medici, sed & pinguedinem appella-
re to-

re totum hoc genus licet, 11. de simpl. med. fac.

Adiapneusia, idest impedita perspiratio, 11. metho. 10.

Adiunctio, vide Appositio.

Adintorij os, idest, os humeri, quod maximū omnium est, femore excepto, lib. de ossib. cap. 16.

Adnata tunica, quæ & agnata, vide Rhagois.

Adstringens, vide Attrahens.

Aegilops, siue Anchilops, arabibus algaras, abscessus quidā est ad angulū oculi qui naribus propior est, pus continēs quod erumpens aut os exedit aut ad angulū, vel vsq; ad nares destillat, lib. qui introd. dicitur, cap. 15. & 5. de cōpos. medic. loc. cap. 2. & lib. de remed. paratu facil. cap. 12. quod vlcus si neglectum fuerit in fistulam desinit, lib. de oculis, cap. 9.

Aequalis ad pondus temperatura est in omnibus animalibus, & stirpibus ea quæ ex pari elementorum commixtorū spectatur mole, non quæ tum animalis tum stirpis naturæ conuenit, conuenit enim alijs ut humidum sicco, & frigidum calido præponderet, sicquæ æqualis temperatura ad iustitiam est, non quæ pondere, & mensura, sed quæ eo quod pro dignitate cōuenit, æqualitatem, explorat; animalia enim, & stirpes, optimam, mediamque habere in suo genere temperiem dicemus, non utique absoluto sermone, cum paritas exacta contrariorum in ijs non sit, sed cum ea mediocritas, quæ ad potestatem refertur, his adsit, 5. de temp. cap. 6.

Aequa-

Aequalis inaequalitas dicitur, non in pulsibus modo sed alijs prope omnibus quae pristinam naturam immutabilia siue magnitudine, siue qualitate aequalia vel inaequalia capiunt incrementa, nam quatenus aequalitatem commutant vocentur inaequalia, sed quatenus aequam semper mutationem assequuntur aequaliter dicantur mutari, sed quae ut pristino constant statu, nec accipiunt parem mutationem, haec semel inaequalia vocantur, 1. de differ. puls. cap. 11.

Aequalis morbus est, qui aequales habet motus, cum non ut inaequales morbi aliquot diebus uehementiores fuerint postea sine aliqua significatione torpescunt, deinde rursus adaucti continuitatem accipiunt, sed perpetuo sibi constant quo argumento ab Hippoc. dictum est continuorum morborum & aequalium acutiem non posse ultra diem decimum quartum protendi, 2. apho. 23.

Aequalis pulsus est, cum omnes ictus aequalem inter se seruant proportionem, ita ut secundus respondeat primo, & tertius secundo, & contra dicitur inaequalis, 1. de differ. puls. cap. 10.

Aequiuoca sunt quae non sunt unius generis, quaecumque enim nomina unam speciem in multis singularibus significant, uniuocè de ipsis dicuntur, quae uerò de multis diuersis specie ea aequiuocè nuncupantur, & res quae ipsis subiunguntur ab ipsisque significantur aequiuoca sunt, comm. 3. in lib. de his quae in medic. fiunt 24.

Acro-

Aëroſis quaſi *Aeratio*, vel ſanguinis attenuatio, vel inhalitum ſolutio, eſt cuſtodia vel conſervatio, vel reſtauratio ſpiritus deperditi ex reſpiratione & tranſpiratione, & qui ex ſanguine attollitur, vapore, II. metho. 3.

Aëruſinoſa bilis, quæ ærugini ſimilatur, vide *Bilis pallida*.

Æthiologica ſive *pathologica medicina* pars eſt in qua ea quæ præter naturam ſunt inquirimus, morborum cauſas, accidentium concurſus, affectuum ſtatum, lib. introd. cap. 7.

Affectio ſanguiflua eſt, in qua vehemēter multum ſanguinis profunditur, com. 2. in 6. de morb. vulg. 14.

Affectus præcordialis, vide *Affectus flatuoſus*.

Affectus melancholicus, vide *Affectus flatuoſus*.

Affectus grauis dicitur, aut propter præcellētiam partis, aut propter affectus magnitudinē, aut propter ipſius cacoëthiam, 4. meth. cap. 6. ſpectatur autē affectus magnitudo tripliciter ex laſe actionis præſtātia, ex propria affectus eſſentia, & ex facultate quæ læſum corpus gubernat, 7. meth. cap. 12.

Affectus flatuoſus præcordialis et *melancholicus* eſt, quo ijs qui inclinante ætate plurima venere vñtur, inflatur, & tumefcit venter, com. 3. in 6. de morb. vulg. 12.

Affectus implicatus eſt, in quo multæ ſunt affectæ partes, nam poteſt idem homo non ſolum laborare ex thorace ſed etiam ex pulmone, ex capite, ex imo vē-

re, et ex iecinore, co. 2. in 3. de morb. vulg. in argum.

Affectus qui & *schesis* dicitur est dubia & non certa, aut firma corporis dispositio, is vero qui firmus & certus est, & quasi habitus *Exis* dicitur, 8. meth. cap. 3.

Affectus quos Græci pathemata vocant, *passiones* omnes sunt quæ in corporibus nostris sunt præter naturam, com. 2. in 1. de morb. vulg. 23. *affectus* verò siue affectionis vocabulum ab afficiendo dictum, de multis effertur rebus, sed nunc recessus in statum præter naturam significatur quales cumque ii fuerint *affectus* siue affectiones, lib. de cur. rat. per sang. missionem, cap. 3.

Affectus puerilis, vide *Comitialis morbus*.

Affusio quæ Græcè *parenchyma* nutrimenti dicitur, lib. introd. cap. 9. vide *parenchyma*.

Agathon significat apud Hippoc. idem quod idoneum, certum, stabilem, verum, & perpetuum, ut auctor est Gal. com. 2. in lib. de fractu. idem verò testatum reliquit in com. lib. 2. de articulis, *agathon* apud veteres id omne dici solere quod in suo genere primum est.

Agerasia, i. *in senescentia*, lib. de marcore, cap. 2.

Agglutinatio, vide *Prosthesis*.

Agitatio, vide *Vibratio*.

Agnata tunica, siue *adnata*, vide *Ophthalmia*.

Agnea, vide *Fatuitas*.

Agonia est inequalis motus ex timore & ira compositus,

positus, timore intro & ad principium tum sanguinē,
tum spiritum vnā cum refrigeratione eorum quæ in
summo corpore sunt abducente, & contrahente, ira
vero foras agente, & fundente calorem, 2. de sympt.
cau. cap. 5.

Agrestis lichene, idest, *impetigo*, 6. de compos.
medic. per genera, cap. 2. vide *Impetigo*.

Agrypnia, idest, *vigilia*, 2. meth. 2.

Aipathia, perpetua passibilitas, lib. art. med. c. 8.

Alæ narium sunt tenuia chartilagineaq; corpuscu-
la vtrique nasi lateri à parte inferiori adnata, lib. de
ossibus, cap. 4. quæ etiam *pinnulas* vocant, lib. introd.
cap. 10. vocant adhuc & *pinnas*, 2. de loc. affect. c. 2.

Alæ aurium, vide *Aures*; uide etiam lib. Introd.
cap. 10.

Alaria ossa, vide *Sphenois*?

Ala quid sit hinc patet, brachiū appellatur, quod
inter du. ts iuncturas humeri, & cubiti intercedit, to-
tius brachii pars, super humeralis verò idest superior
superior humeri pars quæ ad collum uergit, nam hu-
merus totum id, quod in dearticulatione hac apparet,
vocatur, nam quod non apparet à posteriori parte est
os scapulæ, ab inferiore est id quod dum totum bra-
chium attollitur, manifestum fit, quæ ala nuncupa-
tur, 1. de artic. 4.

Alba uiriligo, uide *Leuce*, & *Vitiliginum*.

Albam pituitam consueuere medici, quandam
aquæ inter cutem speciem, *leucophlegmatiam*, idest,
albana

albam pituitam nominare, uel quod sit etiam aliqua pituita liuida, uel quod sibi quidē ratione sit semper alba, sed propter mixtionem quorundam aliorum humorum, uerum mutet colorem, 7. aph. 29.

Albaras, vide Aegilops.

Albugineus oculi humor, similis albumini oui, opposita parte uitrei humoris exterius, ante crystallinum positus, non cōcretus, ut alij humores, sed liquidus, in foramine tunice vuae collocat⁹, supfluitas est crystallini humoris, ad ipsum defendendū sua humiditate, lib. de anat. uiuor. uide Hyaloides, et Crystallinus.

Albugo cicatrix est crassa, & profunda, ulceri induc^{ta}, lib. finit. med. non quacunque corporis parte, sed solum in Iride oculi, lib. Introd. cap. 17.

Albula, uocant aquas aluminosas, 8. meth. 2.

Alexipharmaca medicamēta sunt, quę deleteria, idest, lethalia uenena, intus assumpta euacuant, 5. de simpl. med. fac. cap. 18. & 1. de semin. cap. 16.

Alexiteria medicamenta sunt, quae uenenatarum bestiarum ictus, aut uenena sanant, 5. de simpl. med. fac. cap. 18.

Alhacab est illud ligamentum, quod ad musculū, non extenditur, sed cōtinuatur inter duo extrema ossium, aut inter alia duo membra, annectendo unum alteri, firmiter ab osse natum, lib. de anat. uiu.

Alica ex genere tritici est, 1. de aliment. fac. c. 6.

Alienam caliditatem uocat Aristoteles, externā nō insitā, neq; natiuā in quocūq; rerū genere, nā hec

coquere apta est, extrema autem corrumpere, quod est putrefacere, 2. de differ. feb. cap. 9.

• Allantoides, vide Chorion.

Alopecia, capillorum defluuium est, propter vitia-
tos humores, sic appellata, quod vulpibus frequen-
ter accidit, 1. de comp. med. loc. cap. 2. qua locus affe-
ctus apparet colore prorsus exangui. de remed. par.
fac. cap. 6. quam etiam areas vocant, 2. meth. cap. 2.

• Alphi, idest, vitilignes, ex humorum vitiosita-
te, quæ in cute sunt, quemadmodum etiam de Lepra
planum est, oriuntur, lib. de humor. com. 3. vide
Vitiliginum.

• Alteratio est alimenti concoctio, vsque quo in si-
militudinem partis quæ nutritur, transmutatur, 8. de
comp. med. loc. cap. 6.

• Alteratrix, vide Attractrix.

• Altus pulsus, vide Pulsus latus.

• Alueoli, vide Pathnia.

• Alius liquida appellatur, in qua liquida deijciun-
tur, com. 2. in 1. prorrh. 3.

Amarabilis, ea & pallida, & flaua dicitur, 2. de
differ. feb. cap. 1. vide Bilis pallida, & Picra.

Amaurosis est totius in oculo lucis impedimentum,
acutis morbis accidens quæ est imbecillis facultatis
animalis signum, com. 2. in 1. prorrh. 11. 20.

Ambas, vide Ambone.

• Amblotica medicamenta, vide Aborsus.

• Amblyopia est uisus hebetudo, in qua oculi nec
phlegmo-

phlegmone tenentur, nec influxu torquentur, nec ulcerati sunt, nec aliud quiduis mali perpeffi, 5. de simplic. med. fac. cap. 23.

Ambonæ sunt margines, siue labra, siue supercilia cotylarum, & cavitatum, 2. de usup. cap. 17. quas quidam masculino, quidam fœminino, ambas appellant, 1. de artic. 10.

Ambusta sunt, quæ igne vel ardenti aqua comburuntur, ita ut bullas aliquando excitent, 9. de simplic. med. facul. quæ etiam ambustiones vocantur, 11. de simpl. med. fac. constat autem si quis in aqua feruenti ustus fuerit, hunc etiam affectum Pyricauton, idest ambustum igne, nominari, 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Amentia, vide Anea.

Ametria est à iusta tēperie recessus, 2. meth. c. 4.

Amiculum, vide Chorion.

Ammata, fascias Græci uocant, quibus uenter petus, costæ, lumbique alligantur 3. de sanit. tue. c. 2.

Amnium, vide Chorion.

Amolynta, idest, non inquinantia medicamenta, similia his quæ propriè epithemata dicuntur, 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Amphiblestroide seu retiformis, idest, uerrucalis tunica, quæ à cerebro ad oculos profecta, uitreum, & crystallinum humorem ambit. cuius tunica figura in latum diffusi, atque expansi nerui verriculo similis apparet, de placit. cap. 5. uocant ipsum non nul-

li propriè tunicam retiformem, quod figura quidem reti sit similis, ceterum nullo pacto est tunica, neque colore, neq; substantia, sed si exemptum ipsum reposueris, in unum acervum coniiciens, tibi plane uideri uidere Cerebri portionem quādam exemptam, 10. de usup. cap. 2. uide Choroide.

Amphimerina febris est, quae singulis diebus accenditur, atq; intermissione finitur, idem enim est ac quotidiana simpliciter, nulla alia sermoni adiectione facta, eam uerò quae intermissionem non habet, non *Cathemerinā*, ut quidam, sed quotidianam continuā, uoco, 2. de differ. feb. cap. 7.

Amphismela, est instrumenti genus, quo anatomici secant corpora, 6. de anatom. adm. cap. 10.

Amuleta medicamenta, quae Graeci *Periatta* uocant, sic appellantur, quod de collo suspendantur aut alicui corporis parti alligentur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. quae qualitatis familiaritate attrahunt, idest, totius essentiae similitudine, 5. de simplic. cap. 17.

Amygdalæ, uide *Paristhmia*.

Amylum, ex tritico cibus, 1. de alim. fac. cap. 8.

Anabatica, uide *Continua*, & *Epacmastica*.

Anabrosis quae & *Diabrosis* dicitur, est solutio continuitatis in osse, uel uase aliquo, ex erosione, 5. loc. aff. 5. uide *Diabrosis*.

Anacolle mata medicamēta sunt restringentia fluxiones oculorū, de remed. par. fac. c. 10. quæ frōti, & temporibus imponuntur, 11. de simplic. med. fac.

Ana-

Anadiplosis, est accessionum reduplicatio, lib. de Typis, cap. 4.

Anadosis, est nutrimenti per uenas transitus, quod idem est ac digestio, seu distributio, differens à *Diadosi*, quod sit translatio, traditio, uel porrectio in singula simplicium & inuisibilium neruorum, & arteriarum, nutrimento à lateribus illorum uasorum attracto & translato, 2. de nat. fac. 6.

Anæa, siue amentia, est ratiocinatricis functionis ueluti paralyssis, lib. de sympt. differ. cap. 3.

Analeptice est renutritoria refectoriaq; uocata, uictus ratio, 7. meth. 6. inde *analepsis*, idest resumptio, lib. de marcore, cap. 9.

Analogismus, est comparatio, & perceptio causarum inuicem per similitudines, ad *Thrasib.* cap. 11. siue *Analogismus* est ratio, quæ ab euidenti auspiciatur, rei obscure faciens cognitionem, 1. prognost. 6.

Anaplerotica medicamenta sunt, quæ cicatrices crassant, quæq; alta vulnera complent, & lymphidant, lib. de Dynamid.

Anasarca, quæ, & *Catasarca*, *Hyposarcidium*, et *Episarcidium* dicitur, *Hydropis* species est, in qua humidi substantia tenuis copia, in tota inferiore thoracis regione aceruat, habitusq; totus pituitæ plenus redditur, 4. de rat. uict. 111. diciturque *anasarca*, quod per carnem ille humor fluat. lib. finit.

Anastoechiosis, quasi reelementationem dixeris, est colliquatio, seu resolutio, seu dissolutio, aliquando

totius corporis, aliquando succorum, qui in uenis sūt, duntaxat, quod autem ex ea colliquatione prouenit, aliās ad uentrem confluit, aliās ad urinas, aliās ad sudores pellitur, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Anastomatica, idest, aperientia medicamenta, quæcunque uasorum oscula aperire apta sunt, extergendo, incidendo, obstructions tollendo & diuidendo: differuntque à rarefacientibus, quæ cutis tantum meatus referant, 5. de simpl. med. fac. cap. 14.

Anastomosis, vide *Osculorum apertio*.

Anatasis, vide *Catataxis*.

Anatome est humani corporis, abditarumque eius partium dissectio, & speculatio, lib. finit. med.

Anatrypsin, idest, refriktionem ueteres Græci solent appellare, non eam frictionem, quæ ab inferiori parte sursum ducitur, sicut compositio uidetur significare, sed absolute omnem quomodocunque factam. Nos autem *Trypsin* frictionem, seu fricationem uocamus, com. 3. in lib. de his quæ in medic. 25.

Anchylops, vide *Aegilops*.

Anchoralis processus, vide *Ancyroides*.

Anchyle, vide *Ancyle*.

Ancon, est gibbi cubitus, uel gibberi medium cui innitimur, diciturque *Ancon*, alterum maius ossum cubiti, quod et *Olecranon* uocat Hippoc. 2. de usurp. cap. 2. vide *Brachium*.

Ancos, siue *Galianconas*, eos uocat Hippoc. quibus cum augerentur eorum corpora, ex luxatione
bra-

brachij in alam, os brachij breuius euasit, 3. de artic. 88.

Ancyle seu poplites sunt partes retrorsum post genua spectantes, lib. Introd. cap. 10. unde ancylas, siue ancylas uocat difficiles artuum motus, & ligationem neruorum, & articulorum contractiones, 7. de comp. med. per gen. cap. 6. uide Poples.

Ancyroides, processus acutus exiguusq; est in inferiori parte ossis ceruicis scapulae, qui cum anchora, uel Coruini rostri similitudinem referat, Ancyroides à non nullis, Coracoides ab alijs nuncupatur, quandoquidem extrema eius pars uti Corniculæ rostrum exterius inclinatur, lib. de ossib. cap. 14. quem etiam Anchoralē & Cornicularem nominat, 1. de artic. 2.

Aneurisma est affectio, qua os in arteria fit, vulnerata ea cum ad cicatricem peruenerit, quae ei adiacet cuti, manente uerò arteriae ulcere, ea neq; conglutinata neque ad cicatricem simul perducta, neque à carne obstructa; quo fit ut arteria sanguinem iaculetur, qui contineri non potest, lib. de tumor. cap. 11.

Angina siue Synanche, est phlegmone alijs extra collum, ut partes tumescant, alijs intra tonsillas, ut simul partes quoque afficiantur respirationis & egræ spiratio sequatur, lib. finit. uel breuius est abscessus ad uenas iugulares siue à glutinosa, frigidaq; fluxione, quam pituitosam uocant, siue à calida & acri, quam picrocholam biliosamq; appellaueris, quae, et Synanche dicitur, 4. de rat. viſſ. 30. Tandem Hippo.

omnes affectus gutturi accidentes, si spirationē quoquo modo reddant deteriorem Synāchen uocat, alijs paracynāche, alijs parasynanche dicitur, 4. loc. aff. 3.

Angor est natiui caloris cordis contractio, ad quā sequitur eiusdem Cordis dolor, & palpitatio, & tristitia, pessimumque est signum si in principio acutarum febrium aduenerit, lib. de humor. com. 1. 4. de differ. puls. cap. 3. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Anguli oculi sunt interiores oculi termini, ubi palpebrae coalescunt alter iuxta nasum, iuxta tempora alter, hic paruus, ille magnus dicitur, uterque autem Canthus, dicitur, idest, angulus, lib. Introd. cap. 10. dicuntur & Hirquæ oculorum, lib. de uenæ sect. contra Erasistratum, cap. 6.

Angustus pulsus, uide pulsus latus.

Anhelosi sunt qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt, quod contingit in affectionibus, multa inspiratione indigentibus, ut à cursu aut uehementi exercitatione, & ardentibus febribus, 3. de diffic. respir. cap. 11. nunc etiam anhelationes asthmata uocat, 8. de simpl. Clarius autem inquit, qui citra febrem dense respirant, qualiter faciunt, qui uelociter cucurrerunt, ab accessione hac medicis Graecis Asthmatici, Latinis anhelosi appellatur; eosdem etiam ab alia accessione, orthopnoicos uocant, quod thoracis corpus rectum habere coguntur ob timorē suffocationis, quin, & stratum circa supernas partes, ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectius

erectius faciunt, ne dormientes strangulentur, 7. de compos. medic. loc. cap. 6. & 3. aphor. 26. & com. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Anima (apud Galenum) aut temperamentum actiuarum qualitatum est, aut ab ipsarum, temperamento alteratur, 3. loc. aff. 7. & com. 5. in 6. de morb. vulg. 5. vide calor natiuus.

Animalis motus est, qui animantium corporibus cum sana sunt arbitrio, uoluntate, ac impetu neruorum, musculorumque ministerio fit, quem medici uoluntariam actionem siue animalem appellare solent, lib. de trem. palp. cap. 2.

Animalis uirtus est, quæ ex Cerebro originem ducit, quæque ex motuum uoluntariorum imbecillitate deprehenditur, ut uirtus quam ex corde prodeuntem agnoscimus, quam uitalem nuncupamus, ex pulsuum debilitate, atque ex hepate oritur ac naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio aquosis atq; tenuibus, postmodum uerò crassis ad modum fecis, 1. ad Glau. 14.

Annotatio, quæ Epifemasiâ uocant, est accessionis principium, 2. aph. 1. dicitur et annotatio, siue significatio, siue simiosis, morborum dignotio ex similium ac dissimilium consideratione, ante alia artis opera, 1. de his quæ in medicat. fiunt 1.

Annotatio incoppressa quæ hefticarum febrium proprium est indicium, est cum pulsus maior statim, ac uelocior à cibo efficitur, sine aliquo horrore, dormitatione, pigritia, frigore.

frigefactione extremorum, inaequalitate pulsus, aut frigiditatis, aut caliditatis, 1. de differ. feb. c. 9. vide Febris significatio.

Annotina medicamenta sunt, quae ad sedandos dolores sensum stupefaciendo parantur, 12. meth. 1.

Anodyna, idest, Sopiētia medicamēta, 12. meth. 1. eadem anodyna dicuntur, idest, indolentia quoniam dolores sedant, non tamen dispositiones penitus sanant, sed uim sentiendi obtorpescere faciunt, 2. ad Glau. 6. sed rectius anodyna dolorem sedantia sunt, sed facultas anodyna alia re uera est, alia tantum dicitur, tanquam si quispiam hominem mortuum dicat anodynou, quia dolore vacet, ceterum uera anodyna facultas est eorum quae primo ordine calefaciunt, si utiq; in essentia tenui contineantur, at facultas eorum quae dicuntur anodyna, sed non sunt, frigidorum est, quae absoluto utentia frigore partem obstupefaciunt, unde, & Narcotica, idest stupefacientia dicuntur, 5. de simpl. med. facult. cap. 9.

Anomæomeres membrum est quod ex dissimilibus partibus est conflatum, 7. meth. 6.

Anorexia, idest inappetentia idem significat quod Apositia, idest, abstinētia à cibo, 4. aphor. 17. vide Apositia.

Antecedens, vide Antegressa.

Antegressa causa quae & procatarchon dicitur est quae extra corpus posita quicquam in corpore alterat, quae & procatartica anticipans, & antecedens dicitur,

tur, quod eas quae in corpore dispositiones sunt antecedunt, 5. de caus. puls. cap. 1. quascunque dispositiones uel motus in ipso animali præter naturam, morborum præcedentes causas nominant, quae uero extrinsecus adueniunt & alterant corpus atque naturam uehementer transmutant, præincipientes appellant. in lib. de caus. morb. cap. 2. eadem primitiua, & initiatrix dicitur, 6. de loc. affect. 4. eadem prophasis et occasio dicitur co. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Antheridae, idest, floridæ appellatae compositiones, 5. de compos. med. loc.

Antiade, sunt glandulae quae sibi ex aduerso in oris termino utrinque iacent, cum exfluxione in tumorem attolluntur, 3. de caus. sympt. cap. 4.

Anticardion, sic dicitur cauum illud quod sub pectore est carneum molleque ad os uentris, uocatur etiam sphage, Rufus uero cauitatem eam pectoris quae est ad clauiculas, tradit ab Homero dici Leucaricon, à medicis uero *Anticardion* & sphagen.

Anticipans morbus est, qui cum diuersis oris semper accedat, & remittat, præuenit quidem continuò citiusq; horas persoluit, unde anticipans dicitur, siue prolepticus, qui uero tardat hystericus siue posterius ueniens nuncupatur, lib. de Typis, cap. 3.

Anticipans, vide antegressa.

Anticnemion, vide Gastrocnemion, & Sura & Tibia.

Anticbir est magnus digitus manus, qui & pollex & Pro-

& promanus dicitur, lib. de muscul. dissect. cap. 22.

Antidixis, & endixis, sunt contradictiones indicationum, & indicationes quae sunt auxiliorum inuentiones, 9. meth. cap. 7. uide Endixis.

Antidotus, medicamentum est, quod non extrinsecus impositum, sed intus assumptum malas corporis affectiones sanat. 1. de antidotis, cap. 1. mos est iunioribus medicis, antidotos appellare, non modo quae aduersus mortifera medicamenta quaeque ad morsus ictusque uenenosos exhibent, sed etiam quae contra malas corporis affectiones, praesertimque diutinas ualent ex aliquo uiscere aut abscessu consurgentes, 2. de antid. cap. 6.

Antispasis, idest, ad contrarium reuulsio, auertitur enim sanguis, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, illud Parocheteus in hoc Antispasin Graeci uocant, 5. meth. cap. 3. uide reuulsio.

Antispatichon, idest, auxilium in diuersa reuellens, 13. meth. 11.

Anthrax. i. carbo, seu ulcus escarosum, cui adiungitur multum partium circumstantium inflam. 6. aph. 45.

Antitasis est, cum quae dissident ossa ad hoc ut è directo admoueantur, prius retrorsum trahuntur, haec ad oppositum tractio Antitatis dicitur, 6. meth. 5.

Anulus est recti intestini orificium per sedem prodies, quo extretionem cum lubet retinemus, sic dictus à figura, ab officio uero strictor dicitur, lib. Introd. cap. 10.

Anus seu uetula, uide umbilicus, dicitur etiā anus inferior corporis pars, qua excrementa redduntur, 3. de usu part.

Apagma medicorū appellatio propria est, quoties ossis finis qua parte maximè cum alio committatur, abruptus est, 6. meth. 5. uide abductiones.

Apanthismos est subtilissima lineā, quæ agrè uide ri potest, quasi tu exolefcentem lineolam diceret, cui simillimæ sunt uenarum quædam propagines filorū araneæ aut capillorum modo angustæ, & extensæ quæ uenæ capillares dicuntur, lib. de dissect. uenarum, & arter. cap. 8.

Aparachyton uinum, idest, originale cui marina aqua non est admixta, 4. de compos. medic. per genera, cap. 7.

Apechema, diremptio est ossis superficialia uel etiam profunda in partibus ictui oppositis, lib. finit. medic.

Apepsia, idest cruditas, 2. meth. 2. uide Cōcoctio.

Apeptaphymata solitus est Hipp. nominare cruda tubera seu tumores præter naturam nervosa corpora uertebri ipsi atque spinali medullæ insita extendentes, 4. de loc. aff. cap. 3.

Aperientia, uide Anastomatica.

Aperistaron, idest cauum ulcus apertum, 2. de compos. medic. per gen. cap. 1.

Aphonia, idest, uocis carētia quæ agris solet accidere lesi dūtaxat ijs quæ uoci efformandæ subseruiunt
instru-

instrumentis, uel etiam ijs quae respirationi deputa-
uit natura, uel ob recentem quandam exolutionē &
afflictionem uirtutis, 4. de ratione uict. 23.

Aphorismus est oratio, quae omnes rei propieta-
tes breuissimis uerbis circumscribit, 1. apho. 1. quin
& aphorismos definitiones appellat, 3. de his quae in
medicatrina, 32.

Aphthae sunt ulcera puerorum, summam oris par-
tem occupantia, ob mollitiem maximè facta instrumē-
torum, quae neque tactum neque qualitatem lactis
sustinent, quod non paruam in se serosam contineat
partem, 3. aphor. 24. ex quo habent aliquid ignee ca-
liditatis, uel ad huc quod infans lac non probè conco-
xerit, 6. de compos. medic. loc. cap. 4. & com. 3. in 3.
de morb. vulg. 12.

Apices matricis sunt processus quidam mamilla-
res utrinque ad latera matricis ad ilia inclinantes, à
Graecis cornua matricis appellantur, per quae cor-
nua semen à proprijs testiculis uulua attrahit, ut ui-
rile per collum, lib. de consect. uuluae, & 2. de semi.

Apios, cibus est omnis qualitatis quae sensu de-
prehendi potest, expers, qui neque adstrictionem, neq;
acrimoniam, aut aliam insignem facultatem obtinet,
qualis inter humiditas substantias, est aqua, 1. ali-
ment. facult. 8.

Apnoea, idest, ablata spiratio, 2. rat. uict. 43.

Apoclasinata, vide Abductiones.

Apocope, vide Abscissio.

Apo-

Apocrustica, idest, reprimētia & repellētia medicamēta, quę adstringēdi uim obtinēt, 11. meth. 15.

Apodacrytica, idest, delacrimatiua, & repercussoria lacrimarum, 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Apoplepsis, vide interceptiones uenarum.

Apomeli, mellis decoctum intelligo, quod nos cōficimus, aceto cum melle commisto, tantisper tamen simul decocto, quoad utrorumque qualitates inter se uniantur, & aceti uis retundatur, 3. fraēt. 49.

Aponeurosis, sunt tendones quos musculi generāt, qui ad arctuum fines pertinent, 3. aliment. facul. 5. dicuntur autem aponeurosis quasi deneruationes, & nerueae musculorum tenuitates, 1. de anat. adm. cap. 5. quoniam musculi in eos desinunt, 1. de motu musc. cap. 1. uide Nerus, Tendones, Deneruationes.

Apophlegmatismus; medicamenta quae ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia una nomenclatura comprehendentes apophlegmatizōta nominant, ac eorum facultates, apophlegmaticas, 5. de simplic. 20. rectius autem apophlegmatismus est medicamentum quod pituitam per os educit, 6. sanit. tuen. cap. 10.

Apophthora, vide Aborsus.

Apophysis est extrema ossis pars, seu adnata appendix, lib. de ossib. in proœmio.

Apoplexia est ablatio sensus, & motus in toto animalis corpore, 3. loc. aff. 10. & 2. aph. 42. vide Caros, & Paraplegia.

Apo-

Apoplectice uenæ quæ & Sphagitides, & Iugulares externæ, seu superficiarie Arabib⁹ Guidex manifeste uocantur, sunt quæ infernè ad aures utrinque singulæ feruntur, à quibus superficiariæ ferè omnes tum colli tum capitis partes nutriuntur, 6. de usup. & initio secundi de rat. uict.

Aposcemata, idest decubitus uocantur, illæ dispositiones, cum qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto ad alterum transeunt, 2. Glauc. 7.

Aposceparnismus abscissio est ossis, cū eius pars decussa uulnerando fuerit, fracturæ species, lib. finit.

Apositi, more antiquorum Græcorum, u^o appellantur, qui appetentia carent, com. 3. in 3. de morb. vulg. 72.

Apositia, uide Anorexia.

Apospasmata, auulsa omnia nominantur, de constit. art. cap. 6. quæ uerò continui solutiones, apospasmata, idest, auulsiones uocantur, instrumentariarum tantummodo partium, propriæ sunt passionis, de differ. morb. cap. 11. uide Rhegma.

Aposphagma, uide Vnionis solutio.

*Apostasis, fracturæ species est, quæ sub generalem affectionem subiicitur, quæ est continuitatis dissolutio, ita enim ego totum hoc genus soleo appellare, at Hippoc. abscedentia corpora, quæ ita affecta sunt, uocat, ut et affectio ipsa abscessio merito nominetur, tamet si una quedam species generis huius sit, quam proprie abscessionem, & abscessum, idest, Apostasin
-092
& apo-*

et apostema nuncupent, 3. de his quę in med. initio.
 Apostasis, et Metastasis differunt, quod Apostasis
 idest abscessus, iudicationem infert, ægrumq; à mor-
 lestijs omnibus liberat; metastasis autem idest com-
 mutatio aliarum habet principium accessionum, &
 aliud exigat tempus ad coctionem mali, corporis
 locus, ad quem infestantium humorum facta sit com-
 mutatio, 4. rat. vict. 68.

Apostema, vide Apostasis, & Sinus.

Aposyrmata, vide Abrasa.

Apothepia, nunc pro prostrema parte omnis pro-
 be peractę exercitationis sumitur, nunc pro ea me-
 dicinę parte, quę lassitudinem ex immodico exerci-
 tio succedentem, submouet, 3. sanit. tuen. cap. 2.

Apothermus; Sapa, Siræon, Hepsema, no-
 mina Synonima sunt, significantia mustum pluri-
 mum coctum, 1. aliment. fac. cap. 13. de attenuā-
 te vict. rat. 12.

Appetitus caninus, vehemens est comedendi de-
 siderium, quo & plurima edunt, & maxime grava-
 ti paulo post reuomant, 7. de comp. med. loc. cap. 2. et
 1. de sympt. caus. cap. 7.

Appositio, quę & adiunctio et Prosthesis dicitur,
 finis est actionis quę ab attrahente vi perficitur, at-
 tractum enim, & adductum nutrimentum singulis
 partibus apponit assimilandum, 3. de natur. fac. c. 1.
 vide Prosthesis.

Apsychia. i. animi deliquiū, com. 2. in 1. prorrhet.

20. & 1. aph. 23.

Aptistus, idest, morbus sine sputo, præsertim morbus lateralis cum pars dolens exquisite angusta fuerit, & veluti alligans in se ipsa, uniuersum fluxum cohibuerit, 2. cris. cap. 10.

Aqua inter cutem, idest, hydrops, uel hyderos, 5. loc. aff. 7. 4. aph. 11.

Aquaticulus, qui & Pubes dicitur, & Epision, est ea pectoris pars in quem Thorax finit, ubi & musculorum pudenda constituta sunt, tum fœminarum, ad femoris utriusque exortum, ut sub hoc occultentur, lib. Introd. cap. 10.

Aqueus humor, qui & Albugineus, uide Crystallinus.

Aquosa urina, quæ & cruda dicitur, est ea quæ est alba, & tenuis, 1. cris. cap. 5.

Aquosus humor, hydropis species ea est, quam *Asciten* vocant, cuius proxima causa, aquosus humor est partim à iecinore manans, partim à tota carne corporis veluti in aquam resoluta, à quo aquoso humore totum abdomen distenditur, qui colligitur inter Peritoneum & intestina, ueluti in utre quodam, unde illi nomen dedit, opposita alteri hydropis speciei, quam Hippoc. uocat siccum hydropem, qui & Tympanias dicitur, uide Ascites, Hydrops.

Aquila, uide Hydatidis.

Arachnoides pulsus, araneæ speciem referens, siue aranealis paruus est, ac breuis auræ agitata mo-
netur

metur, lib. finit. med.

Aræotica, id est rarefacientia, 5. simplic. cap. 14.
vide *Anastomatica*, & *Rarefacientia*.

Aranea tela, est oculi tunica, quæ cum Rhetina, perfectam sphaeram efficit, circundantem crystallinum humorem, diciturque aranea, quia ad modum telæ araneæ subtilis est, ne impediatur lumen ingrediens ad crystallinum & albugineum, lib. de anatom. vna
vide *Rhagois*.

Arcuatus morbus, vide *Arquatus*.

Ardens febris, vide *Synocha*.

Aree, vide *Alopecia*.

Argemon, est ulceratio, quæ in nigro oculi alba apparet, in albo autem subrubra, lib. finit. med.

Argyrite terra est, quæ ex metallis sumpta, pluribus parvis terre particulis, plures parvas argenti mistas habet, 9. simpl.

Ariditas est summorum pilorum lanuginosa superficies, pulvere conspersis, adsimilis, lib. finit. med.

Arithena, vide *Aritenoide*.

Aritenoide est cartilago laryngis, tum ordine, tum positione, tum magnitudine tertia, in supremâ innominatæ cartilaginis parte, sita, gutturnus, in fundibulisq; quas *Arithenas* appellant non absimilis lib. vocal. instr. diff. cap. 4. unde aliqui eam *Aritenam* vocant, 7. de usup. 11. vide *Cricoide*.

Armatura conceptus; ab Arabibus *Abgas*, tunica est postrema tenuis toti fœtui, undique circumiecta.

Etia, ipsius velut sudorem excipiens; quasi *agninum* à mollitie deducto nomine *Amnion* Græcis appellata, 15. de vsup.

Arquatus morbus qui & *Regius* & *Icteros* & *Auriginosus*, & *Arcuatus* dicitur, est bilis in summam cutim redundantia, interim cum febre acuta, interim sine illa, cum interiorum adustione, & stomachi vitio, lib. Introd. 5. loc. aff. 7. *Clarius*, *Flaua bilis*, quando sui seruans naturam, vna cum sanguine per totum corpus defertur; morbum facit, qui *Icteros*, idest, *Regius* appellatur, sola verò quando secreta est, & in aliquo membro consistit, herpes, 2. ad *Glauc.* 1.

Arteria, est membrum ortum habēs à Corde, concanum, ut per eius concanitatem spiritus vitalis, ad omnes corporis partes deferatur, lib. de anat. uiu. differt autem à uena, quod uena sit uas sanguinem continens, non pulsans, sed arteria vas est pulsans, lib. de caus. morb. cap. 3. quondam non dum eas quæ similiter ut Cor, pulsant, arterias nominabant (in solā eam quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriā, arteriæ nomen inferentes) venas appellabant in totū velut alias quæ non pulsant, sic etiam pulsantes, postea verò consuetudine obtinente, arteriæ appellationem in pulsantibus dici propter equiuocationem asperæ nomen apponentes, eam quæ ex larynge in pulmonem descendit arteriam, asperam arteriam appellarunt, vnā cum hoc, quod ipsam etiam Bron-

chum

chum vocant, quoniam cartilaginosa corpuscula, quae plurima eius pars sunt, bronchia appellant, 7. de comp. med. loc. cap. 1. *Asperæ* autem arteriæ dicuntur, quae in pulmones diuisæ sunt, quae verò toto insunt corpore, quaeque ex asperis arterijs contracto Corde, spiritum trāsumūt, laues, 7. de anat. adm. 4. & 7. de vsup. cap. 9. vide *Aspera arteria*.

Arteria crassa, vide *Arteria aorta*.

Arteria magna, vide *Arteria aorta*.

Arteria aorta, magna, maxima, crassa, homonyma sunt, significantia vnum omnium ipsarum arteriarum tanquam caudicem, à sinistro Cordis ventriculo propagatum, quae omnes tum sibi inuicem, tum eorum pulsandi modo respondent, 7. de anat. adm. cap. 1.

Arteria venosa est vas à sinistro Cordis ventriculo ad pulmonem procedens, ut arteria vocetur, quia pulsat, venosa autē quia uenæ tunica vestitur; quae verò ex dextro Cordis ventriculo est, vena arteriosa dicitur, uena quidem ab usu, arteriosa autem quoniam arteriæ corpus est duplici tectum tunica, 7. de anat. adm. 4.

Arteriæ emulgentes, sunt duæ propagines magnæ, à maxima arteria quae spinæ incumbit, profectæ, non aliter quam duæ venæ magnæ quæ in renes inseruntur, quibus renes urinam à sanguine secernūt & trahunt, quā ratione venæ & arteriæ emulgentes appellantur, lib. de dissect. uen. 5. 14. & 16. de vsup.

Arteria aspera, uide Arteria.

Arteriæ leues, uide Arteria.

*Arteriæ carotides, quæ & soporariæ & apople-
tice & subeticæ dicuntur, sunt quæ inferne à Corde
ad iugulum rectè tendunt, atque ad partes collo su-
periores distribuuntur, de dissect. art. et 16. de usup.*

*Arteriam coniugem vocant, non eam arteriam,
quæ venæ est per membranas coniuncta, aut quæ se
tangant, sed eam quæ cum alteri adiuncta sit, ad eun-
dem usum extiterit, 16. de usup. cap. 13. nusquàm enim
uena ab arteria relinquitur, sed ubi uas arteriosum
uideris, ibi necesse est uenam etiam esse, 16. de usup.
cap. 14.*

*Arteriæ, & Venæ Umbilicales sũt, quæ acetabu-
lis vteri adhærescunt, quibus fœtus in vtero alliga-
tur, & alimentum trahit, 14. & 15. de usup.*

*Arteriaca, Mos est recentioribus medicis arteriæ
pharmaca, arteriacas appellare, non apponentibus,
num antidotos dicant, an iuxta aliud significatum,
quidam uerò Eclecta nominant ipsa, non apponentes
pharmaca, at quidam penitus nullum discrimen ipsis
adscripserunt, aliqui uerò rarò addiderunt, alij ad uo-
cem interceptam, alij ad huc generalius ad uocem le-
sam, sunt qui & ad exasperatam arteriam, et ad ex-
ulceratam scripserunt, 7. de comp. med. loc. cap. 1.*

Arteria trachea, uide Aspera arteria.

Arteria coronalis, uide Stephanicæ.

Arteriosa uena, uide Arteria uenosa.

Arthri-

Arthritis siue morbus articularis, & artuum uisum, 11. meth. 20 sunt et ex genere Arthritidis, Ischias & Podagra, quod enim in omnibus articulis Arthritis est, hoc in vno, iuxta coxendicum quidē Ischiada, hoc est coxendicum morbum appellant, iuxta pedem autem podagram, 10. de comp. med. loc. cap. 2. Vnde Arthriticos vocant, qui hoc articulari uitio laborant 11. meth. 20.

Arthrodia, per sui oppositam Enarthrosin, clarius intelligitur; utraque enim est species Diarthroseos, idest dearticulationis; sed Enarthrosis est cum excipiens cauum admodum altum est, caputq; quod in id inseritur, ob longum, arthrodia uerò, quæ cauum leniter, & in superficie & capitulum etiam depressum habet, lib. de ossibus in præmio.

Articulus est naturalis ossium compositio, uel per diastrosin, idest, dearticulationem quæ est ossium structura, quorum motus est euident, uel per Synarthrosin, quæ est ossium manifestum motum non habentium compositio, lib. de ossib. in præmio. Sed rectius. Articulus est, cum duo ossa, ita inuicem coeunt, ut alterum quidem ipsorum sit quod mouetur, alterum uelut sedes quædam ei quod mouetur, & firmamentum, ut ostiorum cardinibus apparet, unde manenti cauitas, glene, idest, pupilla & Cotyle, ei quod mouetur conuexitas & condylus dicitur, inest, 1. de motu musc. cap. 9.

Articularis morbus, vide Arthritis.

Artomel, idest, iusculum ex pane, & melle, 10. meth. 6.

Artas, extremæ corporis partes sunt, crura scilicet, & manus.

Arythmus pulsus est, non is qui absolutam abolitionem significat, omniq; rythmo orbatu est, sed is qui natio rythmo caret, cui opponitur pulsus, qui *Eurythmus* dicitur, 1. de differ. puls. cap. 9.

Asaphya est uocis obscuritas, vel propter nocem explanantium organorum offensam, quam ex nervorum vitio contraxerunt, vel propter mētis lēSIONem, com. 2. in 1. prorrhēt. 3.

Ascarides, & *Elminthes* sunt tennes lumbrici, in parte præcipuè inferiore crassi intestini progeniti, rotundi verò siue teretes lumbrici sunt, uermes qui in superioribus magis intestinis generatur, adeo quod ad ipsum quoque ventriculum quandoq; ascendunt; latus est, qui & longissimus est, & per tota sæpe extenditur intestina, 3. aph. 26.

Ascensus morbi, augmentum, incrementum, homonyma sunt, significantia totius morbi, siue paroxismi secundum tempus, 1. cris 3. ubicunque accenditur, atque augetur caliditas præter naturam, istuc ab alijs partibus sanguinem solere confluere, quo verò tempore confluit, illis quidem refrigerari priuatis sanguine est necessarium; quod verò patitur membrum grauari, ac distendi, ac sanguinem ipsum confluentem alterari, tum quia alijs quæ iam putruerunt

runt superfluitatibus permiscetur, tum quia intrusum difflari non potest, atque hoc tempus accessionis principium nuncupatur, Cum verò iam caliditas materiam conuicerit, tunc hoc tempus, & ascensus & augmentum vocatur; in hoc uerò usque adeò calor augetur, ut non modo locum exurat, qui est quodammodo putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur, ac cum iam ad summum feruoris deuenerint humores accensi, id accessionis tempus consistentia appellatur, tunc uerò vniuersum laborantis corpus igneum videtur, extensa per totum aequaliter caliditate, 2. differ. feb. II.

Ascia est reuolutio fasciæ, quæ cum parum à recto declinet, in obliquum tamen non dum euadit; à fabrorum ascia, quæ paululum à recto abiens, in summitate decurruatur, dicta 3. de fract. 21.

Ascites hydropis species est, in qua in membrana abdominis interiore peritoneo Græcè dicta, humor ueluti in utre quodam continetur, vnde eā vocat Hipp. aquosum hydropem, Contra Tympanias quam siccum hydropem vocat, in qua addomen percussus talem sonum edit qualem tympana, quoniam in illis percutem extentam subiectus aër percutitur, quem admodum aër in hoc morbi genere qui in profundo locatur, 4. aphor. 11. quem etiam vtricularium hydropem vocant lib. finit.

Asellos, vide Axes.

Asema

Asema, crisis est quęcunq; à nullo dierum indicatium antea fuerit indicata, unde sine signo dicitur, 3. de Cris. 10.

Asitia, idest, ciborum abstinentia, aliquādo etiam uasorum inanitio asitia dicitur tanquam nomine generis in speciem uti liceat, 2. de rat. victus, 47.

Aspera arteria est particula simplex in animalis corpore quae aliarum omnium est durissima, solo osse mollior, quam Gręci Chondron, idest, Chartilaginem uocāt, quam totam in exactam naturā circuli circumferentiam contorsit, circulatorum multa serie continua in longitudine interiore cōpositorum, à pharynge ad pulmonem vsq; pertingens, sanguine uacua, 7. de usu part. cap. 3. eademque prout corpus est ex chartilaginibus ut instrumentis vocis & ex vinctulis membranosis ut instrumentis respirationis compositum, trachea arteria dicitur, ibidem, cap. 6. quam bronchon nominant, ibidem, cap. 11.

Asperæ arteriæ dicuntur cum euersæ sanguinolentiores apparent & magis asperę carnosęque & fici acinis similes, lib. Introd. cap. 15.

Asphyxia, idest, pulsus priuatio, cum non percipitur nostro tactui motus, atque hoc per totum animal accidat ut nulla usquam arteria moueri videatur, quod si ad ueritatem exigas in corpus uinum nunquā cadit, 1. de præsag. ex puls. cap. 3. quam Hipp. vocat spirituum interceptionem, 4. de rat. victus, 26.

Aspreo oculi est durtia & asperitas inęqualis
que

que intra genas oritur, lib. finit.

Assa, idest, stomachi fastidium, 4. de sanit. tuen. cap. 4.

Assidentia signa quæ & mox apparentia dicuntur, distinguuntur à pathognomonicis seu passionis significatiuis signis, exemplo morbi lateralis in quo acuta febris, spirandi difficultas, tussis, pungens dolor lateris, passionis significatiua sunt, quod autem dolor ad hypochondrium, aut ad clauim perueniat, aut quod facilius in latus patiens quam in alterum aeger decumbat assidentia signa sunt, 1. aphor. 12.

Assimilatio, & assimilatrix facultas est, quæ ab actione ipsa generaliter alteratrix, mēbratim assimilatrix dicitur, qua id quod nutritur alteratur & ei quod nutritur simile fit, 3. de natur. facult. cap. 1. naturalium actionum prima ac propemodum maximè necessaria nutritio est, quæ alteratricis actionis quædam est species, est enim & concoctio quæ in uentre agitur, alteratio, non secus autem & quæ in venis quibus accedit ea quæ in quaq; est particula, postquã quarta est quam assimilationem vocant, nomine quidem à nutritione dissidens, re autem non dissidens, 3. de caus. sympt. cap. 2.

Afsistētes siue astites glandulosi, vide Glādulosi.

Asthma, idest, anhelatio, affectus est in quo propter angustiam organorum spiritus, apparet summum moueri usque ad operta scoptula thoracem, etiam ci-
tra

tra febrem, quam etiam ū qui velociter cucurrerunt habent, quiq; respirando pinnaſ nariū mouent, quas inſpirando contrahunt, expirando dilatant, com. 2. in 3. de morb. vulg. 4. vide Anhelofi.

Aſtites, vide Glanduloſi aſſiſtentes, & Paraſtate.

Aſtragalus, ideſt, talus (os balliſtæ vulgo) 3. de uſu part. cap. 6. eſt principaliffimum oſſium quæ ad pedes mouendos pertinent, in circunferētias quaſdam deſinens, magnum quidem & maximis ſupernis oſſibus dearticulatum, in medio tibiæ & calcanei locatum, ibidem, cap. 8. eſt Aſtragalus fruticellus exiguus, 6. de ſimpl. med. facult.

Aſtriſctio eſt denſitas, & neceſſariorum excrementorum ſuppreſſio, ad Traſibulum, cap. 27.

Ataxia & Acoſmia eſt ordo decretorius dierum febrilium, 3. progn. 7.

Ater ſuccus eſt quartus naturalis humor in ordine frigidus, & ſiccus, (cui humori nullum aliud proprium nomen eſt inditum) ſanguinis ſex, qui humor cum ex uſtione quapiam ac putreſcētia in acidam migrat qualitatem, id atram bilem nuncupāt, ſiue rudentem, 2. de natur. facult. cap. 9. vide Acida bilis & melancholicus humor.

Atheromata, Steatomata, & Melicerides, alij quidem inter abſceſſus reponunt, alij vero ad aliud genus referunt; omnes tamen tumores præter naturā ſunt, quorum natura ex ipsis nominibus patet, pulticula

cula enim aliquid simile ipsis atheromatis inuenitur, melli vero in ipsis meliceridibus, scavo autem in ipsis steatomatis, lib. de tum. cap. 5. ipsum vero atheroma Græci atheran vocant, 14. meth. cap. 14.

Athera, vide Atheromata.

Athymia, idest, animi deiection, 6. de loc. affect. cap. 1.

Atrabilis, vide Acida bilis, & Ater succus.

Athroos, est secretio in ipso diuidentium genere, videturq; in omnibus sensibus commune. infestantem passionem ex secretionem ac diuisione continui, vnitique corporis tum excitari, cum ea vel vniuersa vel magnis portionibus, & celeriter quod Græce Athroos voco, incidit, 1. de sympt. caus. cap. 6.

Atrophia est, cum particula aliqua corporis vel diminute alimentum attrahat, vel non trahat, uel perperam trahat, vnde corpus non nutritur, siue id quidem quod nutrit, & quantum & quale esse oportet, suppeditatur, ceterum symptoma aliquod in retentrice facultate incidit, simile his quæ in ventre sunt dicta, atrophia sic quoque tentabitur, excretoris quoque vitio id accidit, cum plus quam opus est vacuat, de sympt. differ. cap. 4. & 1. meth. 9. Est adhuc atrophia in oculo, cum ex longa imbecillitate, vel alia quadam latente causa, paululum quasi propulsus deinde cauatus ad radicem, cum dolore minor euadit, obscureque aut nihil omnino videt, lib. Introd. cap. 15.

Atro-

Atrophuse, idest, corporis particulae, quae ex nutrimento fructum non sentiunt, 2. meth. cap. 7.

Attonitus morbus, idest, *Apoplexia*, 2. aph. 19. quem & morbum stupidum uocant, 8. de placit. c. 6.

Attrahens uirtus est, quae peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere & attrahere potest, altera quae generatim alteratrix dicitur, quae succus attractus similis euadit parti quae alitur, quae membratim in hepate, sanguificatio dicitur, *Retentrix* qua pars attractum succum coquit, donec in suam ipsius naturam eum mutauerit, *Expultrix* quae à Coctione quod inutile est secernit, idque excrementum vocatur, 5. loc. aff. cap. 7.

Attrahens, siue *Attrahens*, siue *Epispastica* facultas est, quae ex alto uehementius attrahit, propter essentiam calidam, & tenuium partium, siue talis essentia sponte nata sit, siue ex putrefactione accedente generationem sortita, directe opposita reperiuntur & adstringenti uirtuti, quae in altum occurrentes sibi succos repellit, 5. de simpl. cap. 17.

Auditorius meatus est, rotundum foramen, quod ad aures pertinens non solum usque ad Cerebri membranam pertinet, sed etiam neruum contingit, qui in ipsum à Cerebro descendit, 6. meth. 6. quod & cecum foramen dicitur, lib. de neruor. dissect. cap. 6. Græce *αὐδὶτὸν τρύμα*, vide *Aures*.

Auditus grauitas, vide *Obanditus*.

Augmentum morbi, vide *Ascensus*.

Aures,

Aures, qua frons ad tempora porrigitur, in ipsius terminis site sunt; quarum pars aperta *Ala* dicitur, refracta ab interiori in posterius ipsis summitatibus inflexis *Cubiformis*, sub qua semicirculus rotundus in mucronem exurgens, Graece *Xyster* appellatur, huius acumini concavum quod subiacet *Conchula*, in cuius medio rotundum foramen, meatus auditorius nuncupatur, lib. *Introd. cap. 10.*

Aures Cordis, sunt duo sinus Cordis, concavi, nigriores, nervosiores & magis cuticulares Corde, utraq; Cordis parte, sinistra & dextera collocatae, ad similitudinem aurium sitae, 7. de anatom. adm. cap. 9. nominatae autem porro ita sunt, non ab utilitate, aut actione aliqua, sed à parva similitudine, quod utrinque Cordi ipsi, ut animalis capiti, aures adiaceant, 6. de vsup. cap. 15.

Aurigo, & *Auriginosus*, vide *Arquatus*.

Autopsia, est eorum observatio & memoria, quae proprio intuitu unusquisque inspexit, de part. art. med. cap. 2.

Autopyrus, qui & *Syngomistus* dicitur, panis genus est, quod ex farina vniuersa comportata, non discussis furfuribus, constat, lib. de ren. aff. dignot. cap. 6. *Syngomistum* panem vocant, qui medius est inter exquisite purum, & furfuraceum, vocant aut non nulli eundem panem *Autopyrum*, quoniam in puro farinam, non qualis natura est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes furfur ex-
cernunt,

cernunt , contra autem in fursuraceo prius adi-
munt eam farinae partem , quæ purissima est , panis
autem qui Autopyrus appellatur , qualem habet ex
natura farinam , triticum , talem etiam seruat , 2. ad
Glauc. 7.

Auulsa, vide *Auulsio*, & *Apospasmata*.

Auulsio, est cum ossa , quæ membrum colligant ,
diuulsa primum à se mutuo secesserint , quæ , & au-
ulsa dicuntur , com. 3. in lib. Hippoc. de his quæ in
medicat. 31. vide *Vnionis solutio*.

Axes ipsas, *Asinos* appellare consuevit Hippocra-
tes , & paruos axes , *Asellos* , quas etiam succulas
vocant , 2. de fract. 48.

Axillaris vena est , quæ per axillam percurrentes ,
maior humerali per totum brachium in ramos scindi-
tur , diciturque hepatica , 3. de anat. adm. cap. 5. ea-
demque subularis , basilica , vena cubiti interna ap-
pellatur , lib. de anat. viii. & contra Erasistratũ , c. 6.

Axiomata propositiones indemonstrabiles uocant ,
1. metho. 4.

Axungiam, omnes soliti sunt vocare , adipẽ suil-
lum veterem , 1. de compos. med. per gen. cap. 4.
vide *Adeps*.

Azygos vena , est propago vna ex venæ cauæ su-
perioris trunca exorients , parte dextra , & octo costis
inferioribus inserta , quam sub Corde oriri semper
à se obseruatum fuisse testatur Galenus , 5. loc. aff. 2.
& initio secundi de vict. rat. & 3. de v. sup. in iis ui-

delices

delicet corporibus, in quibus thorax longior erat, nostro verò seculo propter thoracis breuitatem, supra Cor, & pericardium exoritur, ad quintam plerunque thoracis vertebram.

Azymus panis, idest fermenti expers, I. aliment. facul. cap. 2.



B



B *ALLISTAE os, vide Astragalus.*

*Barycoia, siue Obauditus, siue Obauditio, est auditus grauitas & difficultas, proportionem respondens Amblyopiae, quae est visus hebetudo, siue dimi-
nute uidere, I. de caus. sympt. cap. 4.*

Basilare os, quod & os palati, os Cunei, os Sphenoidis dicitur, est os quod toti Caluariae subternitur, quod à non nullis inter Capitis, ab alijs inter maxillae superioris ossa, cum inter utrumque sit medium, numeratur, cap. I. lib. de ossib. & in fine, II. de usup.

Basilica uena, uide Axillaris.

Basis Cordis, quam alij caput nisceris appellant, est uertex Cordis figura turbinatus, quae & circulus est, 7. de anat. adm. cap. 3. quam & mucronem appellant, 2. de placit. cap. 4.

Bathmides sunt brachij concanitates, quas extendentibus totam manum, & flectentibus, Cubiti ipsius Coronae ingrediuntur, 2. de usup. cap. 15..

Bechica medicamenta sunt, quae tussim sedant, uel cient, I. de simpl. cap. I.

Belenoides os, uide Graphioides, & Lithoides.

B

Beneq.

Beneolentia dicuntur, quorum vapores à corporibus defluentes ambienti permisti, ac deinde per narium inspirationem in Cerebrum delati, familiares sunt Cerebri spiritui, pro portione quadam ad ea quę linguae sunt dulcia, è cõtra, graueolentia, 4. de simp. 22.

Berenicium, quod est nitrum, uel spuma nitri, 6. de compos. med. loc. cap. 1.

Bilis simpliciter si pferatur, siue biliosus humor, audimus pallidam & amaram, non acidam et nigrã, hanc enim semper cum adiectione nominamus, appellationi humoris colorem adiungentes, lib. de tumor. cap. 9. Bilis, adiectione flauam & amaram significat, sed cum adiectione bilis atra, humorem melancholicum, 7. apho. 32. & 1. de nat. hum. 27. & com. 5. in 6. de morb. vulg. 14.

Bilis acida, vide Acida bilis.

Bilis æruginosa, vide Bilis pallida.

Bilis amara, vide Bilis simpliciter,

Bilis atra, vide Bilis simpliciter.

Bilis flaua, vide Bilis pallida,

Bilis isatodes, vide Bilis pallida.

Bilis nigra, vide Nigra bilis.

Bilis pallida est, quæ ex bili syncera, & tenui aquosa, serosaq; humiditate quibus vrina, sudor quæ prouenit, constat, Flaua verò quæ & Vitellina dicitur colore pallidior, tenui humiditate constans, sed crassiori quam pallida, crudo vitello ouorum & colore & consistentia similis, in vasis genita. Porracea ve-

cea verò in ventriculo genita, porrorum colori similis, Aeruginosa, quæ ærugini assimilatur, Isatodes autem bilis, quæ ab Isatide cæsum colorem referente, dicta est; sic etiam & rubram non nulli bilē nominarunt, quæ consistentia ad tenuem sanguinē proxime accedit, sed quoniam non concrescit, idcirco bilem eam nominant, lib. de atra bile, cap. 2..

Bilis porracea, vide Bilis pallida.

Bilis radens, vide Acida bilis.

Bilis rubra, vide bilis pallida,

Bilis vitellina, vide bilis pallida.

Bis feriens pulsus, vide Dicrotus pulsus.

Blæsum corpus est, cuius pectus pronum in partē anteriorem redditur, Rhebum autem cum posteriores partes, quæ ad spinam pertinent, gibbæ redduntur, lib. de caus. morb. cap. 7.

Blena, siue mucus, est humor per palatum & nares defluens, cum concoctus est, ueluti cum crassior minus acris, & modicus descendit, propterea, & crassior pituita ab Hipp. vocatur, lib. de totius morb. temp. cap. 3. & 2. de sem. cap. 6. vide phlegma.

Borborignus, est sonus, vel murmur, in crassis intestinis factum, cum excrementorum sunt vacua, humidum excrementum denuncians, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide Physis.

Bothor, vide Exanthemata.

Bothrion, est ulcus cauū oculi, purū, angustū, puncturis rotundis simile, vlcusculo altius, lib. Introd. c. 15.

Bothria, vide *Phathnia*.

Brachiale, quod Græci *Carpon* dicunt, Arabici *Rascetta*, est prima pars palmæ manus, octo constās ossibus, in superficie leniter gibbis, sinuatis intrinsecus, lib. de ossib. ca. 18. cuius inferior pars quatuor ipsis ossibus, quæ quasi post brachiale, uel metacarpium dixeris, colligatur, ibidem, cap. 16.

Brachichonius, uide *Polychronius*.

Brachium, totius manus pars maxima, cuius termini inferne sunt articulus, qui in curuatura cubiti est, quem *Anchona*, siue *Cubitus* cui innitimur, uocamus, supernè autem rursus, humeri articulus, lib. 2. de motu musc. cap. 2. *Brachium* appellatur, quod inter duas iuncturas humeri & cubiti intercedit, totius brachij pars, super humeralis uerò idest *Epomis*, superior humeri pars quæ ad collum uergit, nam humerus totum id, quod in dearticulatione hac apparet, uocatur, nam quod non apparet à posteriori parte est os scapulæ, ab inferiori est id, quod dum totum brachium attollitur, manifestum fit, quæ ala nominatur, 1. de artic. 4.

Bradypepsia, vide *Concoctio*.

Branchos, quos *raucedines*, *destillationes*, & *Coryzas* nominant, 5. de sanit. tuen. cap. 8. Qualis in uentre, diarrhæa passio ex mala concoctione fit, tale est in Cerebro *Catarrhus* et *Coryza*, *Catarrhum*, scilicet nominantibus nobis, cum quod supernacuum est in os diffluit, *Coryzam* cum in nares, *Branchos* autem si-

nerau-

ne raucitas catarrhis superueniens, faucibus scilicet humore imbutis, quod si in Gargarionem fluxio procumbit, aut quam ex similitudine Græci Staphylem idest acinum uocant in ea gignit, aut alias eam in tumorem attollit; at si in glandulas quæ sibi ex aduerso in oris termino utrinque iacent, antiadas, si autem in ea quæ ijs proxima sunt, paristhmia, 3. de sympt. caus. cap. 4.

Bregmata Latini sinciput, sunt duo syncipitis ossa utrinque quatuor rectis lineis circumscripta, una quidem per suturam in longum porrectam, utrique ossi communem, posterius autem lambdoidis suturæ lateribus, anterius uero coronariæ uocatæ, utraq; autem parte, squamosis commissuris, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1. quæ vulgo parietalia appellantur, uide Prgmatiss ossa.

Brenis pulsus, uide pulsus latus.

Bronchia, sunt asperæ arteriæ chartilagines, Sigma literæ figuram referentes, 4. loc. affect. cap. 8. uide Arteria.

Bronchocele, idest gutturis tumor, 2. de cōp. med. loc. cap. 17. pocn.

Bronchon, idest, trachea arteria, 7. de usupar. cap. 11. uide Aspera arteria.

Bubo est tumor, præter naturam, in collo, & secus aures, uel inguina, ijs quibus in collo Capite, uel aliqua uicina parte uel prope magnam arteriā aut uenā ulcus est natum, ortus, 1 3. meth. cap. 5. uide Struma.

Bubonecele, est tumor mollis in inguine factus, peritonæo vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, dicitur quæ ramex in inguine, quod si Umbilico hoc accadat, dicitur *Exophalos*, lib. de tumor. c. 16.

Bulimos est uehemens esuritio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta, 1. de caus. sympt. cap. 7. differt autem *Bulimos* à canina appetentia, quod ille sit casus potentiæ ex frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoauit, sed non habeat eam amplius adiunctam, Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores acidos, quos exorbuīt os ventriculi, 2. aph. 21.

Bulla, i. pustula oculis nata, 9. de simplic. med. fac.

Bursa testium, est communis tunicarum, utriusque testem cooperientium rugosus sinus, utriusque testiculo circumdatus, *Oscleon* Græcis, Latinis *Scortum*, alijs *Scrotum*, dicitur, lib. de consecr. vuluæ, et in Introd.

CACHEXIA, præter corporis habitus est, 1. meth. 9. inde *Cachecticus*, id est, mali habitus homo, lib. de cur. rat. p. sang. c. 19. uide *Habitus*.

Cacoehymia, vitiosus succus, vide *Plethora*.

Cacoethe ulcera ex *dyssepulotis* clariùs intelliguntur, quæ enim ex humorum confluxu, uel multorum uel acrium oriuntur, sine eo quod locus affectus hanc dispositionem habuerit, ut licet bonum sit, quod influit, tamen ipsum corrumpat, *Dyssepulota* nomino, quæ

quæ verò dictam dispositionem iam obtinent, præcipuo vocabulo cacoëthe, idest maligna, appello, 1. de compos. med. per gen. cap. 18. sed generalius, quæ ulcera omnibus ritè decenterq; factis non sanantur, ea medici cacoëthe, idest maligna, contumacia, rebelliaq; dicimus, 4. meth. 5. Adhuc generalius. Cacoëthes morbos, idest malignos appellamus, quicunque periculum minantes spem salutis non adimunt, nam quod summe perniciosum existit symptoma, non cacoëthe sed mortiferū dicitur, co. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacophonia, idest, vitiosa vox, de sympt. diff. c. 3.

Cacosphyxia, idest vitiosus succus, ibid. cap. 4.

Cacotrophia, idest, vitiosa nutritio, ibidem.

Calchoidea ossa, sunt tria ossa parua circa calcaneum posita, quæ certis nominibus carēt, inferiori naui formis parti per synarthrosin copulata, cum quibus etiam exteriore ex parte Cyboides pariter porrigitur, 3. de vsup. & de ossib. cap. 24.

Calcaneus, seu os Calcis, quod Græci Pterim vocant, maximum, & principalissimum est pedis os, quæ ad firmationem pertinent, quod Astragalo subest, 3. de vsup. & de ossib. cap. 24.

Calcis os, vide Calcaneus.

Calculus, siue Calculosus morbus est, vbi in renibus collecta cum proportionali febre crassorum humorum copia, à qua superassati, ad calculi generationem transeunt, lib. finit.

Calescere, & Calesfactum esse, non parum refert

dicere, exemplo lebetis, & aque calida, feruens enim aqua in frigidam lebetem iniecta, uel feruens lebes aquam frigidam excipiens, illic aqua calfacta est, lebes calefit, iuxta Typum putridarum februm, hic lebes calefactus, aqua calefit, ad morem februm hecticarum, 1. de differ. feb. cap. 1.

Calicreon siue Pancreon, caro glandulosa est, substrata arterijs, uenisque quae ea parte in ramos capillares finduntur, lib. de uen. & art. dissect. cap. 1. uide Pancreas.

Calidum hoc ipsum uerbum aliquando transferimus ad qualitatem, cuius proprium nomen est caliditas, aliquando denominatiue totum corpus dicimus calidum à caliditate, estq; hic modus loquendi plurimus in omni uita, 1. aph. 14. Saepè etiam Hipp. à qualitatibus nominat elementa, calidum quidem appellans, neque solam qualitatem, neque quod ab eius exuperantia dicitur, sed corpus quod summam participat qualitatem, ut ignem, 1. de element. cap. 8.

Callosum corpus, idest, calli naturam referens, regio quaedam in Cerebro est, in qua naturalis concauitas esse uidetur, quae exsuperiacentibus, & circumdatis corporibus, portionem alimenti non perfecte elaborati, perittoma, siue recrementum uocant, recipit, 9. de anatom. adm. cap. 3. quod recrementum ab Arist. excrementum dicitur, lib. de instrum. odor.

Callus, idem quod Clauus Graece Pylus, 6. simpl. diciturq; etiam Tophus, ex crudo humore qui crassus est

fus est ad similitudinem puris crassioris, 10. de comp. med. loc. cap. 2. vide Myrmecie & Tylosis.

Caluaria, siue Cranium, os Capitis appellatur, lib. de ossib. cap. 1. vide Cranium.

Caluata, ferramenta appellat Hippoc. quæ rotunditatem quãdam leuem in extremis partibus habet, cuiusmodi sunt, specillorum capitula, & quæ Nucleata appellantur, & spatularia. Oblonga uerò his contraria nuncupat, quorum extrema minime sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionum interpunctiones accommodatis instrumentis quodammodo semilia, 1. de artic. 43.

Caluities est capillorum defluuium, propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt, inopiam; si uerò propter eorundem humorum uitium, corrumpantur, & cadant, non caluities, sed Alopecia, & Ophiasis dicitur, 1. de comp. med. loc. cap. 2. vide Madarosis. Capitis sane cutis, pueris mulieribus, et Eunuchis humida est, sed Caluis immodice arida, Cerebrum quidem in iuuenibus molle cum sit atque humidum, Caluariam tangere, omnemque interiorem inanitatem complere, in Senibus uerò siccessens subsidensque ab ea distare sepius in animalium dissectionibus conspexitis, in quibus caluescentibus syncipitis ossa, fistulosiora alijs, & molliora ac super incumbentia ob Cerebri defectus exarescunt, cum ad ipsa usque non pertineat, neque ea attingere possit, subsidet enim in suamque, ac ipsius basim depressum cadat, conse-

consequenter igitur, ossibus istis resiccatis, & ipsis obtenta cutis inarescit, atque ipsi sensui valde sicca in Calvis apparet, vt rationali demonstratione non egeat, com. 3. in 6. de morb. vulg. 2.

Calx, est totius pedis posterior pars, lib. Introd. c. 10. Clarius. Calx est os pedis maximū, ossi scaphoïdi subiectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos quos habet excessus, in sinum eius inserit, parte qua ingredimur leniter rotunda et latiuscula, lib. de ossib. 24.

Camarion, siue Psallioides corpus est, pars Cerebri, quæ supra communem cavitatem est (qua Cerebrum Cerebello sua perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in spheræ superficiem concuam circumacta, ad similitudinem testudinū, & Fornicum, quibus Architectores vtuntur, 8. de vsup. cap. 11. vide Fornices.

Camarosis, est ossis perruptio; cum ex alterutra refractum parte, similem Cameræ figuram acceperit, lib. finit. vnde recentiorum non nulli vehementissimas fracturas Camaromata, & Engosomata vocant; Engosomata quidem, quæ in medio sui membranæ innituntur, Camaromata verò, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent; Caterum, qua primum ab integris fracture partibus diduci egra cepit, intro magis recedunt, ac membranæ innituntur, 6. meth. 6.

Camisia fœtus, vide Chorion.

Campylon, vide *Helosis*.

Cancer, est tumor præter naturam fusci & liuidi coloris, in quo uenulæ quædam exaltatæ primò occultæ (quando et *Cancrum* latentē vocant, lib. de atrab. cap. 4.) deinde manifestæ à crasso & nigriore sanguine feci vini assimilēs sunt, 14. meth. 9.

Canina cupiditas, est praua qualitas oris ventriculi multa impetuosè ingerentis, nec potentis deuoratorum pondus suslinere, quare, ea supernè vel infernè excernere cogitur, ita in renibus quoque, & diabetica passione accidit, serosæ humiditatis cupiditas, vñdæ cum virium imbecillitate, vñdæ & humiditatem asfatim attrahere, ac eam deinde in nesciam impellere coguntur, 6. loc. aff. cap. 3. vide *Bulimos*.

Canini dentes, quos Græci *Cynodontes* vocant, sunt duo utrinque vtrique mandibulæ superiori, & inferiori hærentes dentes, qui Canum dentibus quam simillimi sunt, inferiore basi, lati, parte superna acuti, quibus singulæ quoque radices longissimæ insunt, vt si quid propter duritiem ab incisioribus dentibus scindi minus potuit, id frangere possint, lib. de ossib. cap. 5. vide *dentes*.

Canities, est pilorum ante legitimam ætatem, in album commutatio, lib. finit.

Canthus oculi, vide *Anguli ocu'i*.

Capillaris vena, vide *Apanthismus*.

Capillitium, vide *Trichiasis*.

Capistratio, vide *Phymosis*.

Capi-

Capitis uena, quae & Cephalica, & humeraria, & externa dicitur, est quae ex iugularibus externis iam diuaticatis, quibuscum radicem habet communem, utrinque extra thoracem ascendit, & per humerum in externam brachij regionem decliuus excurret; initio secundi de ration. vi.

Capreolaris, siue hederarius anfractus, est artiarum & uenarum ad utrunq; testium descendentium non recto itinere instar Capreoli aut hederuaris modis inuolutarum, connexus, 1. de semin. cap. 12. uide Glandulosi assistentes.

Caprizans pulsus est, ubi motum arteria interpellat quapiam in parte, ita ut motus à quiete alter celerior primo, et uehemētior sit, 1. de differ. puls. c. 29.

Capsula Cordis, idest Pericardium, uide Membrana Pericardios.

Caput, est ea corporis pars, quam non nulli uentrē superiorem nominant, collo terminatur, et partes animales continet.

Caput Cordis, est ampla & orbicularis superna eius basis, 6. de usup. cap. 7.

Caput ossis, est extrema tenuis processus ossium pars, crassior, & orbiculata, lib. de ossib. in proem.

Caput purgia sunt medicamenta omnia, quae capitis purgandi gratia infunduntur, siue naribus, & dicuntur Errhina, siue ori, ut colluendo, uel mandendo per sputum caput purgent, & uocantur apophlegmatizonta, 5. de simpl. cap. 20.

Carbo (qui & *Carbunculus*) dicitur, cum *melancholicus* humor, in cutem decubens simul cum febre, exanthemata per cutem crassescere, siccescereque; oriri facit, asatum sanguinem indicans, lib. de atrab. c. 4. *Carbunculus* ulcus est, crusta cito cum inflammatione totius partis circumdata ualida facies, ut et febres uehementes et extrema pericula inferat, 5. de comp. med. per gen. c. 15. cuius crusta nigra est, et cinerulenta, aliter quam quæ sanguine suffusa sunt, aut quæ algore frigent, non. n. uehementer liuidus, ut in illis tumor est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen et pix, talis autem est exacta atra bilis, lib. de tum. c. 6.

Carbunculus, uide *Carbo*.

Carcharaonta, dicuntur animalia, quæ serratis sunt dentibus, ut *Vrsus*, *Leo*, 9. de anatom. adm. ca. 1.

Carcinoma in utero est tumor sine ulceratione inæqualis, & uerrucosus, lib. finit. quem etiam à Cancro animali *Carcinon* uocant, ibidem.

Carcinos, uide *Carcinoma*.

Cardia hoc est *Cor*, quod non solum ei uisceri, quod sui natura palpitat, nomen fuit apud antiquos, sed et ori uentriculi, pro confesso habetur, apud oēs, 4. aph. 65.

Cardiaca dispositio est innati roboris labefactatio et languor, fit plerumque; conflictate ore uentriculi et stomacho cum sudorū immodica uis; sunt qui *Cardia*, idest. *Corde phlegmone laborante fieri affectum* putauerint, atque; ab hac uirium exolutione, quod euenit malum, *cardiacam*, uel dispositionem, uel syncopim nominarint, 1. de caus. sympt. cap. 7. & lib. finit.

Cardiacus morbus, vide Cardialgia.

Cardialgia, idest Cordis, seu oris ventriculi dolor, & morsus, qui & Cardiogmos dicitur, à forti ventriculi æstu, flaua bile in ipsius tunicis ebulliente, genitus 4. aph. 65. dicitur etiam Cardiacus morbus, lib. Introd. cap. 13. & 8. de comp. med. loc. cap. 1.

Cardiogmos, vide Cardialgia.

Carnosa cutis, vide Musculus cuticulosus.

Caro vocatur tantum ea, quæ in musculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquã admodum pauci, sed quæ in visceribus, ceu iecinore, renibus, liene, pulmone visuntur, eas parenchymata, quasi affusiones dixeris, Græci vocant; quæ in intestinis, ventriculo, stomacho, & vtero sunt, sine nomine relinquunt, 11. meth. 11. parenchymata autem eas partes vocant, non carnes, propterea quod ex uenis effusus sanguis circum vasa omnia concreascit, 11. de simpl. in initio.

Caros siue Sopor, est deperditio sensus, & motus, in toto animalis corpore, illæsa manente spirandi facultate, læsa autem anteriore Cerebri parte, & temporum musculis; si verò spirationem adeò uehementer opprimat, ut quis vel magno conatu vix spirare possit, eorum exēplo qui per grauem somnum stertere solent, Apoplexia nominatur, 4. loc. aff. cap. 2. & 13. meth. 21. & com. 2. in 1. prorrh. 29.

Carotides, idest soporariæ arteriæ sunt, duæ illæ quæ ab arteria magna, à sinistro Cordis ventriculo emer-

emergentes, rectè ad caput feruntur, tanquam vasorum propagines, omnibus quæ sunt supra Cor, partibus distributæ, 16. de vsup. cap. 12. & 1. de placit. cap. 7. sed has non rectè Carotidas & Soporarias, et esse & dici censendum est, sed iam obtinet nomen ex multa omnium qui post Hippocratem fuerunt Philosophorum, & Medicorum ignoratione, censentium, Soporem affectionem esse, dictarum arteriarum, 1. de placit. cap. 7. vide Soporariæ.

Carpon, & Carpos, vide Brachiale.

Caruncule, nunc partes sunt substantiæ intestinorum, quæ in difficultate intestinorum excernuntur, adeò magnæ, ut possimus eas carnes nominare, 4. aph. 26. nunc uerò carnosam quandam particulam, in summo ore pendentem, quam & Columellam vocant, significant, 6. de comp. med. loc. cap. 3. vide Gargareon, & Difficultas intestinorum.

Casus, qui & signa, & symptomata mox apparentia dicuntur, 1. aph. 12. vide Indicatoria signa.

Cataclida, siue Subclauium dixeris, primam Thoracis costam paruum, significat, lib. de muscul. dissect. cap. 12.

Catagma, idest ossis fractura, 2. meth. cap. 2.

Catagmatica emplastra, quæ et Cephalica vocant, sunt quæ Caluariæ fracturis accommodantur, habentq; abstergerendi, digerendi & siccandi potestatem, 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur, & Catagmatica ligamenta, quæ fasciarum instar ossis rupturæ deli-

deligantur, 1. de compos. med. per gen. cap. 4. uide Cephalica emplastra.

Catalepsis, est deperditio sensus uisus, apertis palpebris, seruata tamen secundum naturam spiratione, in qua posteriora Cerebri potius afficiuntur, 4. loc. aff. cap. 2. licet alibi Catalepsim dicat esse spiritus cohibitionē, lib. de musc. diff. cap. 26. & alibi dicat Catalepsim fieri, refrigerata prima parte sensitua, idest Cerebro ipso, quæ refrigeratio cum fortis fuerit mixta humiditati, facit lethargicas passiones, cum siccitate uerò eas quæ à Græcis Catalepsis dicuntur, idest Deprehensiones, 2. apho. 3. eundem affectum Catoche & Catochon vocant, 4. de caus. puls. cap. 16. uide Catoche.

Catalotica medicamenta sunt, quæ cicatrices grossas, comedendo æquāt, & limpidāt, lib. de Dynamid.

Cataphora, idest, ueternosa ad somnum delatio, 1. prorrhæ, 1. quæ egris sopori graui similis quid obuenit, fiunt quæ tum omnis sensus, tum vocis expertes, 1. de dieb. decret. cap. 4.

Cataplasmata, compositio est, ex aliquo farinæ genere, & aliquo humido, siue unctuofo, 3. de comp. med. per gen. cap. 2. (de Pilulæ.

Catapotia, idest pilulæ, de remed. part. fac. c. 6. vi.

Cataptosis morbus non est, sed symptoma Comitium, attonitam concidentiam sine temporis spatio factam, significans, lib. de tot. morb. temp. cap. 4.

Cataracta, siue suffusio, est aqua inter uueam & cry-

crystallinum humorem coagulata, prohibens spiritum visibilem ab oculo exire, lib. de ocul. par. 4. cap. 12. vel suffusio est, cum cernendi facultas, vel in partem deperditur, apparente, siue non apparente in oculis malo aliquo, propriaq; affectione non molestatis, sed aut oris uentriculi, aut Cerebri cognatione, 4. loc. aff. c. 2. quā vocāt Græci Hypochyma, 10. de vsup. c. 1.

Catasarca, vide Anasarca.

Cataschesin, dispositio est, quæ facile discutitur, quæ opponitur hecticæ dispositioni, idest illi, quæ, tenaciter inhaeret, 3. loc. aff. cap. 2.

Catastasis, uide Constitutio.

Catatafis est ad inferna loca, corporum tractus, quæ ubitur partim principijs quæ tentionis causæ sūt, è regione oppositis, partim transumptione in contrarium, nempe transmissis per rotulas principijs, quæ tentionem moliuntur, ac superius adnexis; opposita huic est Anatafis, quæ est tentio ad loca superna per traductionem, lib. finit. vide Anatafis.

Catarrhus, seu defluxus, est multorum humorum delatio per palati foramina & nares, quæ in exitu vnà cum flatu egrediente, strepitum quendam faciūt lib. finit. vide Coryza.

Cathartica, seu purgans facultas uel medicamenta, duo significant, alterū cōmune omnium, quæ quouis modo, animalis excremēta expurgāt; alterū quod per excellentiā de ijs tm̄ dicitur, quæ aut per uomitū, aut per ventris deiectionem purgāt, neq; quod eiusdē est

generis, tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ vuluæ, admota, expurgant, 5. de simpl. med. fac. cap. 20.

m. Cathemerina febris, idest quotidiana, ita enim cōsueuerunt vocare eam febrem, quæ singulis diebus accenditur, neque ullam habet intermissionem; ego uerò solitus sum eandem febrem Amphimerinam continuam appellare; nam Cathemerinon vocabulū, nusquam apud Græcos scriptum inuenitur, omnem verò rem quæ quotidie, eodem modo fiat, amphimerinam vocant; vocetur itaque quæ singulis diebus accenditur & finitur Amphimerina, idest, quotidiana simpliciter, quæ verò non intermittit quotidiana cōtinua, 2. de diff. feb. cap. 7.

m. Catheterica medicamenta sunt, quæ ex crescentiâ carnis vlceribus detrahunt, 5. de simplic. cap. 2. eisdemq; cicatricē inducunt, ibid. cap. 15. uide Septa.

m. Catheter, est fistula urinaria, cuius extremum aliquo cataplasmate illinimus, ad remouendam vrinæ suppressionem, & Virgæ immittimus; ad Thrasib. cap. 23. uide Syphones.

m. Catixin, seu secundum rectitudinem, eruptio sanguinis est, cum sanguis è directo loci affecti, effluit, vel mittitur, lib. de cur. rat. per sang. miss. 15.

m. Catoche, qui & Catochus, vigilans sopor est, 3. loc. aff. cap. 5. est quæ solius Cerebri affectus, ueluti & per totum corpus conuulsiones, co. 3. in 1. prorrh. 69. est quoque Catochus fascia longior, quæ in orbem faciei & capiti circumdatur, ut operculum comprehēdat,

dat, lib. de fasciis, vide Catalepsis.

Catotherica medicamenta, quae & Hypelata Græce dicuntur, sunt medicamenta deiectionaria, quibus renes, vesica, & gibba hepatis cum multo vitioso succo sunt referta, expurgantur, ut Caua iocinoris et intestina, deiectione, 7. meth. 13.

Caua uena (sic appellata, quod uenarum omnium quae per corpus animalis disseminantur, latissima sit 4. rat. viñt. 27.) est uena magna à gibbis hepatis orta lib. de uen. & arte. diss. cap. 2. per quam hepar ex particulis quae ad ventriculum attinent, attractum alimentum, et in ipsa hepatis substantia elaboratum, in omnes superiores corporis partes distribuit, 4. de usup. cap. 13. quae à conuexis iecoris partibus orsa, tum caua propter sui magnitudinem, tum iecoraria, à viscere unde egreditur nominatur, 8. de placit. cap. 1. Nec solum hæc uena quæ à gibbis hepatis egreditur, sed alia etiam quæ à simis & concava ipsius parte, quam portas vocant (vnde et uena porta appellatur) promanat, Caua dicitur quae fertur obliqua deorsum atque in ventrem & intestina propagatur, tanquam truncus venarum omnium quae corpore inferiore sparguntur, per quam hepar ex particulis quae ad ventriculum attinent, alimentum attrahit, 4. de usup. c. 13.

Cauda, vide Coccyx.

Cauernosa ossa foraminulenta, Ithmoidea, & spongiosa, seu spongoidea, sunt ossa quedam parua ante meningas in meatu olfactorio posita à Cribri, vel

spongiæ similitudine sic dicta, 8. de vsup. cap. 7. vide Ossa Ichmoidea.

Cauernosum neruum appellat Penis colem, à quo & Penem, & ipsum totum neruosum dicunt; Coles. n. in mariu genitalibus & vteri ceruix, quoniã extēdi, & in seipsas rursus retrahi, & subsidere uidetur, neruosos dicunt, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. dicitur que flatuosus, & fistulosus, 6. de loc. aff. 6.

Cauledon, est curatio fracti ossis que per transuersum fit, in qua fracti ossis partes ita à se dissident, vt è directio non iaceant, 6. meth. 5. vide schidacedon.

Caulos, idest, pudendum virile, 14. de vsup. cap. 12..

Causa morbi, est id quo tangente afficimur, & quo separato statim cessat affectus, 1. loc. aff. cap. 2.

Causa præincipientes, uide Febres putridæ.

Causæ præcedentes, uide Febres putridæ.

Causodes febres, idest incendētes, 1. aph. 12. quas etiam Causon, vocat, idest febres ardentes, 1. de cris. cap. 4. uide Continua febris.

Causon, vide Causodes, Continua, & Synocha.

Causon legitimus, qui ex redundante flaua bile fit, verò qui ex putrescente crassa pituita, 4. rat.

cauteria, hoc est vrentia medicamenta sunt, quæ calida sunt, et consistentia crassa, quæ corpus colliquant, & sæpe escharas, ritu cauterij efficiunt, 5. de simpl. c. 15. inde.

inde, & affectiones caustice, & caustica excrementa, idest vrentia appellantur, quarum virtus est morbum & acutum & periculosum, & velocis iudicationis reddere, com. 2. in 1. prorrh. 60.

Cedmata uocat Hippoc. fluxiones in crura decumbentes, & ex ipsis eas maximè quae primum articulum, vbi coxendix est, occupant, com. 5. in 6. de morb. vulg. 22.

Celas, Hernias, Ramices, Circocelas medicorum iuniorum nomina sunt, significantia omnes testiculorum tumores, lib. de tumor. cap. 15. barbaram sectantes medicinam, rupturam uocant; hæc varijs secundum modis, per quæ adiectiones rerum opplentium, varias etiam appellationes accipit; si enim peritonæo rupto intestina in scrotum descendunt, Enterocoele Græcis, Ramex intestinorum Latinis appellatur, ubi uerò intestina supra in inguinibus hærent, Bubonocoele, hoc est Ramex inguinalis uocatur, si humor aliquis lætus in Scrotum colligitur Hydrocele, idest Ramex aquosus nuncupatur. Quum autem caro dura intra testium tunicas increscit, Sarcocoele, hoc est Ramex carnosus dicitur. In summa nomen semper à rebus opplentibus, accipiunt. Troinde si Omentum in Scrotum deuoluatur, Epiplocele hoc est Ramex Omēti nominatur; sic vbi venæ ultra modum repletæ ac dilatæ glomerantur, Cirsocoele, idest varicosus Ramex vocatur, vide Hernias.

Celer pulsus est, qui cum modico tempore arteria

distenditur, fit, 1. de differ. puls. cap. 7.

Cenchria, alterum est herpetum genus, quod à similitudine quam habet cum milio *Cenchrian* vocat, mistæ simul facultatis bilem scilicet, & pituitam continens, quæ non protinus ulcus faciunt, quemadmodum alter, sed admodum exiguas pustulas ad speciem milij, quæ ipsæ interposito spatio, in ulcus transeunt, dicitur quæ etiam herpes miliaris, 14. meth. 17. vide *Herpes*.

Ceneangia propriè & primum vasorum inanitionem significat, atque ob id *Asitia*, idest ciborum abstinentia, *Ceneangia*, idest, vasorum inanitio sæpius dicitur, tanquam nomine generis etiam in specie homines omnes uti consueuerunt, 2. rat. vict. 47.

Ceneon, vide *Ile*.

Cephalæa Cerebri morbus, est Capitis diuturnus dolor, difficulter solubilis, qui à parua occasione, vehementes habet accessiones, ut neque voces aut motum tollerare possit infirmus, sed tranquillitatem, obscurumque cubiculum quaerat, ob doloris vehementiâ; cū nō nulli veluti malleo se percuti, alij caput sibi contundi distendi quæ sentiant, non paucis ad oculorum radices dolor extendatur, suis intermissionibus circumacti, non secus ac qui *Cephalalgia* laborant, sed in *Cephalæa* affectæ partes redduntur multo debiliores quam in *Cephalalgia*, 3. loc. aff. cap. 9.

Cephalalgia, vide *Cephalæa*, 2. de comp. med. loc. cap. 2.

Cepha-

Cephalica vena, quæ & Humeralis, sine humeraria dicitur, ramus est vene caue ad iugulum ascendens, ibique ad furculas diuisa, altera pars humero superposita ad manum tendit, vnde & Cephalica dicitur, lib. de anatom. viii. vide Humeraria.

Cephalica emplastra capitis fracturarum sunt, quæ usque ad crassam meningis duplicaturam perueniunt, quorum uirtus est, ut ossium squamam sursum attrahant, & in pristinum locum reuocent, & fragmenta tum in Capite, tum in alijs corporis ossibus, educant; Non nulli comuni genere hæc etiã vocant Catagmatica, propriè uero nuncupatis fortiora sunt, si quidem ex alto insuperficiem extimam non ossa modo, sed his multo quoque magis, humorem aliquem crassum, et viscosum, uel omnino deprauatum sua acrimonia attrahunt, 2. de comp. med. per gen. cap. 18. Similiter adhuc medicamentum siccum, quod carnem producat, Cephalicon vocant, 3. meth. 2.

Cerææ, mulieres sunt, quarum uterus proprijs morbis, tum qui in processibus eius supernis et lateribus consistunt (Ceræas Græci vocant) tum qui in collo tum etiam qui in toto eius tergo, laborans, aliquando quidem uel plura quam prius, uel pauciora, uel nulla, uel mala emittat menstrua, 3. de sympt. caus. cap. 4.

Ceratoide, cornea, seu corniformis tunica oculi est à dura meninge orsa (tunicam choroidem completens) crassa admodum, sed parte eius media tenuis-

fima & densissima, splendida ad splendorem recipiendum, & transmittendum, cornibus admodum extenuatis similis, unde eam à cornu similitudine Ceratoidem, Corneam & Corniformem appellant, 10. de vsup. cap. 3. vide Rhagois tunica.

Ceratomalagmata, non nulli medicorum, nomine à sola consistentia desumpto, vocant medicamenta, quæ corpori imponuntur, non etiam quidem humida, duritiem verò tantam, nec dum consequuta, quantum emplastra possident, 7. de comp. med. loc. cap. 11.

Cerchis, vide Cubitus.

Cerchnòs est exiguus quidam ad tussendum impetus, non tussis, sed veluti nausæe uomitiones præcedunt, ita tussim hoc symptoma; Atq; ut non nulli nausæarunt quidem, non tamen vomuerunt, ita non nullis Cerchnòs incidit, nec tamen tussis propter causæ paruitatem est sequuta, 2. de sympt. caus. cap. 4.

Cerealium appellatio, in toto eorū genere est vsitatior, quod legumina vocant, lib. de attenuan. vic. rat. cap. 6.

Cerebellum, posterior est Cerebri pars, quæ à non nullis Encranion, uel Parancephalis, vel posterius Cerebrum dicitur, 9. de anat. adm. cap. 2. estq; spinalis medullæ principium, & eius ratione nervorum omnium, qui in toto animali, sunt actiui, lib. tegn. cap. 11. vide Pàrencephalis.

Cerebrum, quòd Græci à situ Encephalon appellant (nam nominatur ita quod ἐν τῇ κεφαλῇ hoc est in capite se-

te situm habet) animæ ratiocinatricis est domiciliū,
neruorum & sensus omnis, motus. q; voluntarij prin-
cipium, substantia neruis simillimum, nisi quod mol-
lius ; nam id illi conueniebat, vt quod sensus quidem
omnes recipit, omnes autem imaginationes, atque in-
tellectus complectitur, 9. meth. et 8. de vsup. substan-
tia ipsius alba veluti è spuma quadam concreta, &
humida, lib. finit.

Cerelæon, compositio est, ex cera, & oleo, 7. de
comp. med. per gen. cap. 2.

Cerion, idest Fauus, ulcus paruum in capite est cū
tumore, ex cuius foraminibus crassior sanies, & qua-
si mellitus humor profluit, lib. de tumor. cap. 15. &
1. de comp. med. loc. cap. 8. vide Helminthes.

Certatorie, hoc est agonistice aqua frigida uti, di-
cere solent quidam, cum ea & affatim & frigidissi-
ma exhibetur, lib. de marcore, cap. 8.

Ceruix, uide Spina, dicitur, & Ceruix tenuis os-
sium processus, lib. de ossib. in proæmio.

Chalastica, idest, relaxantia, seu remittentia vo-
camus, quæ modice calefaciunt, quorum vsus est, ut
conniuentia corporis laxet, flatuosum spiritū tenuet,
& quod phlegmones iam conflatum est, digerat, 13.
meth. 6. medicamina igitur induratorum corporum,
quæ ipsorum soluūt duritiem, Malaistica hoc est emol-
licentia dicuntur, quæ autem tensioni medentur, Cha-
lastica, 7. de comp. med. per gen. ca. 9. uide relaxatia.

Chalazia, idest tubercula instar grandinis in pal-
pebris,

pebris, quæque Posthias Græci, 4. de comp. med. loc. cap. 7. estque morbus ex vitijis quæ oculos infestant, unum, cum toto genere à natura, alienum sit, 14. meth. 19.

Chartilago, quam Græci Chondron uocant, est particula simplex in animalis corpore, quæ aliarum quidem omnium est durissima, solo autem osse est mollior, 7. de usup. cap. 3.

Chartilago ensiformis, est extrema ora ossis mediij pectoris, quæ est propter os uentriculi, cui alligatur, Græcè dicitur Chondròs Xiphoides, 6. de usup. cap. 3. eadem dicitur mucronata, lib. de ven. & art. diss. cap. 5. aliqui sunt qui ensiformem chartilaginem dicunt esse, totam pectoralis ossis figuram (non eam tantum quæ in imo eius est) quia gladij similitudinem representat, lib. de ossib. cap. 13. vulgus malum punicum, seu granatum uocat.

Chartilago innominata, est secunda laryngis chartilago, quæ nomine caret, internis partibus, quæ Oesophagus est, positionem habens, 7. de usup.

Chartilago peltalis est imperfectus circulus in principio asperæ arteriæ collocatus, ad modum pelte, cuius gibbositas extra apparet in gutture, eius uerò defectus est uersus gulam, unde chartilago peltalis dicitur; cuius defectum supplet quaedam chartilago supposita isti inferius, faciens etiam circulum imperfectum, sed contrario situ cum superiori, quia eius gibbositas interius est uersus gulam, defectus exterius uersus

uersus guttur, diciturque *Chartilago Cymbalaris*, uel *Coopertoria*. Estque ibidem tertia *Chartilago* nomē non habens, cum modo uersus partem exteriorē nunc uersus interiorem collocetur, nunc cum cibus deglutitur, ut os trachēe arteriē, nunc cum uox formatur, ut os gulę tegat, lib. de anat. iiii.

Chemosis morbus oculi est, quando album oculi tumefactum superat circulum *Iridis*, ut & nigrum oculi concavum uideatur, lib. de anat. ocul. alibi, *Chemosis* ex uehementi inflammatione, utrasque palpebras in exteriorē partem detorquet, ne totum oculum cōtegant, lib. *Introd. cap. 15.*

Chenicias, instrumenta quēdam uocant, quibus in *Caluarie* fracturis, utimur, 6. meth. 6.

Cherōs, idest, tempus, seu etas morborum, quae temporum vicissitudine immutatur, lib. de morb. temp. cap. 1.

Chion, uide *Cion*, & *Staphyle*.

Chironia, & *Telephia*, species ulcerum sunt malignorum, lib. de tumor. cap. 13. Tria tantum ulcera propriam habuere appellationem, *Anthrax*, *Phagedēna*, *Herpes*; cētera omnia ipsa per se ipsa solebant antiqui ulcera tantum nominare, quae in longum tēpus protrahuntur, cum non post multum tempus fuerint ad cicatricem producta, rursusq; influente *Ichore*, ex osse corrupto, in parte penitiorē inflammantur, & pus generatur, à quo cicatrix eroditur, & caro exulceratur, 6. aph. 45. Inueterata ulcera, & dyspulota

pulota, hoc est cicatricē egre ducentia, *chironia* nomināt, 4. de cōp. med. per gen. in ultimis verbis; Dicuntur autē *Chironia*, ab eo qui primū ea sanauit, partim ab ipsis, qui iisdē sunt affecti, vt *Telephium*, 2. meth. 2.

Chirurgia, idest manualis operatio, 6. meth. 6. Inde *Chirurgice* ea est medicina pars, quæ manu medetur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Chloron. i. pallidus, et eruginosus color, 2. progn. 20.

Choana, *Infundibulum*, *Scypho*, *Peluis*, *Pyelos* idem sunt, significantia cavitatem quandam, in quā meatus Cerebrum expurgantes in palatum desinunt, vsque ad adenis ventriculum, 9. de vsup. cap. 3. quæ vulgo *lacuna* dicitur.

Chæras, idest, *Struma*, sæpe enim propter vlcus quod in manus aut pedis digito sit, glandula in inguinibus, & alis, tum intumescunt, tum phlegmone occupantur, quin etiam in collo, & secus aures, sæpe glandule ijs quibus in collo capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natum, intumescunt; nominant autē ipsos adenas, cum sic intumuerunt *Bubones*, quod se scirrhusior earum partium phlegmone aliquādo fuerit, hæc & egre sanabilis redditur, & *Chæras*, idest, *Struma* dicitur, 13. meth. 5.

Cholagoga. i. bilis educitiua medicamēta, 4. aph. 2.

Choledocos, idest, vesica bilis receptiua, quā etiā *Iecoris vesicam* nomināt, lib. 6. de anatom. adm. c. 2. quam etiam *Cystim bilis*, idest, vesicam bilis susceptricem vocant, 4. de vsup. cap. 12. eandem vocāt *fel-*
lis fol-

lis folliculum, 5. loc. aff. cap. 7.

Cholera, idest, bilaris, 1. progn. 25. est acutus affectus, cū vomitibus biliosis multis, aluiq; deiectionibus, Suris quoque se contrahentibus, ac frigescentibus extremitatibus, fiuntq; in his ægris pulsus minores, & obscuriores. Cholera duplex est apud Hippocratem, altera humida in qua, uti omnes norunt vehemens est excretio, bilis supra infraq; erūpit, intestina grauitur torquentur, accedūt conuulsiones, sepe etiam crurum sure contrahuntur, alteram siccam Cholera vocat Hippoc. ab eadem prouenientē causa, ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluxum & vomitum, lib. finit.

Chondros, idest, Chartilago, 7. de vsup. cap. 3.

Chondrosyndesmus, idest Chartilagineum ligamentum, 1. de temp. cap. 9.

Choræ, idest, regiones oculorum, seu cavitates, quæ supercilij subiacent, 8. de vsup. cap. 6.

Chorion, idest, secunda, est membrana vuluæ pregnantis mulieris adherens, multarum venarum, & arteriarum contextu, interualla membranis obducta habēs, cui duæ aliæ membranæ interius adnascuntur, altera quæ Amniū, idest, Amiculū dicitur, toti fœtui circumiecta, altera quæ Allantoides, idest Intestinalis eminentibus tantū partibus, Capiti, natibus, pedibus, duplex superiecta, lib. de vuluæ diss. cap. 10. quæ Arā bicis Abgas, Camisia fœtus, & profundatio sudoris dicitur, lib. de anatom. vii.

Choroi-

Choroides plexus (qui & *Retiformes*, & *Reticulares*, dicuntur, uide *plexus retiformis*) sunt conuolutiones membranarum Cerebri, ex multis uenis, & arterijs, secundarum instar effigiata, nomine à *Chorijs* idest membranis diducto, quae factus extrinsecus in orbem ambiunt, 9. de anat. adm. cap. 3. Constituitur autem prope medium Cerebri uentriculum, 9. de usup. cap. 7. dicitur ad huc & tenuis Cerebri membrana *Choroides*, idest, secundiformis meninx, 8. de usup. cap. 9. Dicitur, & *Choroides oculi tunica*, corpus quoddam retiforme quasi tunica, (*Amphiblestroide dicta*) humorem uitreum oculi ambiens, quod ex portione Cerebri superne descendente, atque amplificata, est conflatum, reti simile, quod retiforme corpus à choroide, idest tenui tunica cerebri, quae illi superne dimittitur, continetur, unde tunica oculi choroide dicitur, 10. de usup. cap. 2.

Chorda est membrum, ab extremitatibus musculi ortum habens, ad similitudinem chordae arcus effecta, est autem *Chorda* idem quod *Tendo*, non quod ligamentum, 6. aph. 49. & lib. de anat. uiu.

Chordapsus, *Ileos*, seu *Voluulus* est, tumor emnens, in tenuium intestinorum parte, ut uideatur intestinum ad similitudinem chordae obuolutum, uel ab inflammatione, uel obstructione aridi stercoris, grauiter egros uomitionibus crucians, adeo, ut non nulli stercus quoque euomere conspiciantur, 6. loc. aff. 2. uide *Ileos*.

Chronice egritudines, idest lōge, de part. art. med. cap. 7. uide Polichronius.

Chrysite terra est aurea, in qua paruis terre partibus immiste sunt parue auri partes, 5. de simpl.

Chylus, est cibi liquamen, quod ex uentriculo, atque intestinis in iecur transmittitur, partim tenuioribus portionibus, partim crassioribus consistens, lib. de atrabile, cap. 3.

Chymethla, idest Perniones, 6. simpl. uide Perniones.

Chymosis, (quae & Chemosis) est utriusque palpebre distortio, ex inflammatione oborta, 4. de cōp. med. loc. ca. 4. Est item Chymosis, rubra, carnosaque; corneae oculi pelliculae inflammatio, lib. de remed. par. fac. uide Chemosis.

Chymus est nutrimentum, seu humor ad nutrimentum animalis in hepate preparatum, depositis excrementis, 4. de usup. 4. Atqui antiqui saporem uocauerunt Chymum, idest, liquorem, lib. de ocul. par. 2. cap. 1. Chymi autem appellatio apud Hipp. semper humoribus corporis destinata est, ex quibus nos constituimur, sanguine inquam pituita & duplici bile flaua & nigra; Apud Platonem uero & Aristotele, gustabilis qualitas quacuis nobis insita, Chymus idest Sapor, nominatur, lib. finit.

Chyphosis, idest, gibberositas, (quā etiam Chyrtosin idest incuruationem dicunt) est distortio spine in posteriorem partem, prout in anteriorem Lordosis, idest,

ideſt ſicca friſtio, vel ſolis manibus, uel cum manica,
vel ſolo linteo adminiſtrata, citra omne pingue, vel
cum eo plane exiguo, 3. ſanit. tuen. 13.

Chyrtoſis, vide Chyphoſis.

Cicatrix ab Hipp. nunc ſumitur pro ipſis ulcerib⁹,
nunc pro inductione cōſolidationis ulcerū, 1. de artic.
56. particulatim autem cicatrix oculi appellatur, ubi
nigro oculi ex alto vlcere, membrana crasſities ſu-
peruenit, & color albior apparet, quæ cicatrix ſi ſit
& maior & crasſior ex vlcere Iridis nata, dicitur
Albugo, lib. Introd. cap. 15. vide *Albugo*.

Cilia extremæ illæ palpebrarum partes ſunt, quæ in
ſomnis clauſis oculis ſimul cōmittuntur, quæ & *Tar*
ſi nominantur, & qua ratione pilos procreant, *Cilia*,
lib. Introd.

Cingentes membrana ſimplices quædam tunica
ſunt, tele arancorum ſimiles, quæ totam vtramque
thoracis regionem internam ſubcingunt, vocanturq;
in coſtis *Cingentes*, Græcè *Hypezochotes*, ubi verò
reſtæ ad ingulum perferuntur, *Intercipientes*, Græcè
diaphrattontes, ubi pulmōni circumherēſcunt, huius
operimentum ſunt; quarum baſis ſupernis partibus
ſepti obūcitur; inferioribus autem, alia quædam mē-
brana, huic perſimilis ſubſtrata, quæ *Peritonæi* uer-
tex, iure optimo nuncupatur, 6. de anat. adm. cap. 8.

Cicumenus morbus eſt, qui diuerſis horis ſemper
accedit, ac remittit, cuius ille qui præuenit, citiusq;
horas perſoluit prolepticus, ſine *Anticipans* dicitur,
qui

qui tardat Hystericus, idest posterius inuadens, lib. de Typis, cap. 3.

Cion, vide Gargareon, & Staphyle.

Cionides, vide Staphyle.

Circuitus, siue Periodus est tempus intentionum, & remissionum in morbis factum, vt Typus est ordo earundem intentionum & remissionum, lib. de Typis cap. 2. uel circuitus siue Periodus, est similis ad idem reditus, 1. apho. 12.

Circūcisio, vel circumsectio, est ablatio cutis glādem contegentis virilis pudendi, quæ præputium dicitur, lib. finit.

Circumnuens, vide Innuens.

Circumocularis tunica oculi est, quæ à crassa meningē orta, toti oculo subternitur, circumtangens, et circum induens os, vt oculus non applicetur nudis cavitatibus, lib. de anatom. viii.

Circumossalis membrana est, quasi ossium inuolucrum dixeris, quæ singulis ossibus in longitudine inditur, 1. de sem. cap. 10. quam in capite, Pericranion dicimus, lib. de anat. oculi, in costis autē Perioſtion, 8. de anatom. adm. cap. 10.

Cirros, vide Cornua vuluæ.

Cirsocele, vide Celas.

Cirfos, idest, varices, alias quoque venas omnes dilatatas antiqui sic nominabant, lib. de tumor. c. 16. vide Varices.

Citta, vide Cittosa.

Citta-

Cintosa, idest, vitiosi cibi appetentia, qualis grauidis contingit, 6. de sanit. tuen. cap. 9. dicitur etiam *Citta*, *Pice*, & *Picatio*, 1. de sympt. caus. c. 3. et c. 7.

Claues siue *Iugulum* sunt duæ primæ costæ propè guttur, inter os pectoris, ac spinæ finem, quæ ad scapulas est à natura constitutæ, 13. de usup. cap. 11. *clauiculis* etiam uocat, lib. de musc. diff. cap. 12. quæ vulgo *furcula* superior, ut *Diaphragma* *furcula* inferior nuncupatur. Recentioribus autem, elatior finis anteriori parte *Claues* existunt, sic dictæ quod *Sterno Omoplatas*, idest, humerum firment; is autem finis vulgo, *furcula* superior dicitur, *Cavitates* sub his *Clauibus*, appellantur *Sphage*, idest, *inguli*, ut sint duæ *claues* & *inguli* totidem, dexter & sinister.

Clauus siue *Gomphos*, est oculi morbus, cum *Puea* locum suum egrediens, pelliculas superficie tenus operit, vnde eius forma fit quasi *Clauus*, lib. de ocul. cap. 11. vide *Gomphos* & *Myrmecia*.

Clunes, vide *Coxa*.

Clydones, *Symptoma* est retentricis facultatis uentriculi; cibos, uel non complectentis, uel diminute, uel uitiose, vnde *flatulentia*, & *fluctuationes* cum sonitu succedunt; *flatulentia* quidem, ubi & cibi flatuosi sunt, & uentriculus non admodum frigidus; *fluctuationes* cum sonitu, cum uel nihil in eo continetur; quod uerti in flatum possit, uel ualenter sit refrigeratus, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Clyster, κλύστρος, *Lutinis* idem est quod *lauamen*, seu

seu ablutio, à uerbo *αβύω* quod & lauare significat; Alio nomine Græcis *ἐνίημα*, dicitur quæ vox latinis iniectionem significat; Medici huius temporis, Clysteris, & enematis Græcis uocibus quam Latinis malunt uti; Dicitur adhuc, & Clyisma, unde Diaclyisma, idest lauatio ad vlcera; & dentes titubantes, infirmos; Dicitur adhuc & Clysmus, de medic. fac. par. cap. 16.

Cnimi, idest, Tibia, seu alterum ex duobus ossibus tibiæ, eodem cum toto membro nomine, alterum uero Perone, seu fibula dicitur, 3. de usup. cap. 9.

Coadiutrix causa est; quæ sua uirtute morbum efficere non potest, sed alteri auxiliatur, ut libido articulare morbum promouet, & sanguinis eruptionem remigatio, lib. Introd. cap. 8.

(latio.

Coarticulatio; uide Abarticulatio & Dearticulatio.

Coccyx (vulgo Cauda) idest Cuculus, est os quod subest in imolati ossis, lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 104.

Coctio, quid sit hinc nosces, Cum facultates quatuor sint, atque inter eas non minime ualeat alteratrix, per quam dispensatis ab ea corporibus, natura alimentum assimilât, coctio nuncupatur nutritiue substantiæ permutatio, secundum qualitatem existens, 4. rat. uict. 44. Perfecta Urine coctio est, quando in urinis subsederit aliquid albū, & læue & æquale & continuum; Debilis autem coctio est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, et qui-

dem si turbulenta apparuerit, & talis permanserit, hæc quoque occulta, & debilis coctionis est signum, & rufa etiam ac tenuis, ex eodem genere est, 1. de cris. cap. 17.

Coctionis signa sunt, quæ hominis salutem, non tamen per crisim, futuram ostendunt; quò distinguuntur à Decretorijs, quæ salutem hominis futuram, per crisim ostendunt; coctionis autem quæ in spirandi sisti instrumentis, sputa; cuius quæ in venis, vrinas; illius, quæ in ventre, alui excrementa statuere oportet; in febribus (quoniam venosi generis sunt passionēs, nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad vrinas præcipuè attendere oportet, 1. de cris. cap. 7.

Cecum foramen, est angustius illud foramen, quod ex duobus inæqualibus foraminibus, quibus quinta nervorum coniugatio à Cerebro excipitur, propè aures est collocatum, cui subditur labyrinthus quidam quem natura effecit, musculis temporalibus consulēs, nervum eis durum, & labijs immittens, 9. de vsup. cap. 13. vide Meatus auditorius.

Cæcum intestinum siue Orbum, siue Monoculum, est quartum intestinum in ordine, primum locum inter crassa obtinens, lib. de anat. viii. Quidam illud saccum nominant.

Celi status, idest, ambientis nos aëris temperies, 9. meth. 5.

Cælia apud Græcos, sine adiectione omnem ventrem

trem significat, 6. aph. 20. Apud Aristotelem tamen dicitur Cœlia, illa tantum corporis partis cavitas, in quam cibus deuoratur, et prima cōcoctiō peragitur, sed apud Hippocr. nunc cum adiectione superior, & inferior venter significantur, vt superior sit ventriculus, inferior, omne quod sub diaphragmate est spatium latius.

Cœliaca, idest, Ventralis dispositio, communis morbus est ventriculo, & intestinis, in quo materiae, non mordaces, intestinorum imbecillitatem sequuntur, quae retinere contenta, ne exiguo quidem tempore possunt, sed ea illico excernunt, perinde ac si graue aliquod onus deponerent, haud secus quam in stranguria, in qua ob acrimoniam & vellicationem vesica iugiter, quicquid ad eam peruenerit, secernit, modo ob id quod molem ipsius vel exiguam sustinere nequit, 6. loc. aff. cap. 2. vide Lientheria.

Cœlomata sunt rotunda, & caua vlcera, bothrijs latiora, quæ in oculis circa Irim nascuntur, lib. Introd. cap. 15.

Cælum more vulgi, appellat Hippoc. aërem, 1. de morb. vulg. 1. qui supra nos est, vsque ad nubium regionem, com. 1. in 1. de morb. vulg. 4. quamquam eo nomine cavitas omnis designari potest, tamen specia liter Cælum vocatur superioris palpebræ superficies, sicut Hypocælum pars inferior, quae ei respondet, illud tum in aqua intercutem, tum in alterius

generis malo habitu, tum in diuturnis hæmorrhoidibus, longis mulierum profluuijs, atque inchoantibus ophthalmijs intumescit. Sunt qui cælum oculorum interpretantur, cavitates quae sub oculis, utraq; nasi parte cernuntur, quae tamen Canthus dicuntur.

Carulea oculi tunica, eadem est cum Rhagoide, Vnea, & Vniformi, 10. de usup. cap. 4. uide Rhagois.

Coincidentia, siue Intercidentia, quâ Paremp-tosim Graeci vocât, est cum aliunde in aliud uas humor fluit, 7. de anat. adm. cap. 16. In oculo autem coincidentia est, ubi in meatum qui à basi Cerebri ueniens, oculo videndi facultatem tribuit, humor adaperto, uel rupto uase incidit, obturatque eum, unde cum dolore uisus offenditur, lib. Introd. cap. 15.

Coindicantia sunt, quae praeter proprias cuiusq; morbi indicationes, adhuc uirtutem, naturam, etatē, anni tempus, regionem & consuetudinem, & si quae sunt id genus alia, considerant, 13. meth. 16.

Cola, dicuntur in homine longiora, maioraq; mēbra à Thorace separata, & quasi dependentia, ut brachia & manus, Latinis dicuntur artus, 3. de usup. c. 1. dicuntur & Cola, ossa narium, uide Ithmoidea.

Colatoria ossa sunt narium foraminulenta & canernosa ossa, quae à cribri similitudine Ithmoidea, uel à spongia spongoidea appellantur, varia enim habent foramina, quo modo, & spongiae; neque ea habent recta ut cribra, quod inde superflua Cerebri excrementa transcolent, 8. de usup.

Coles

Coles est particula quaedam corporis insignis, ad extremū collū uesticae sita, quam ares feminas exuperant, quā Græci *Caulon* *Ῥεγισαλον* Latini *penem*, *Colem*, *mentulam*, *uirgam*, & *puendum* uirile nominant, 5. de vsup. cap. 15.

Colica dispositio est, constitutio plenioris intestini. *Colon diuturna*, in qua spacijs temporis interiectis, cruciatus intollerabiles, difficultates spirandi, sudores, perfrictiones quæ suboriuntur, lib. finit. suntq; *Colicus* et *Voluulus* intestinorū inflammationes, quorū alter tenuioris intestini, affect' est, alter plenioris, quare deiectiones includuntur, et flatus intestinis inuoluti, eò q' exitū nō habeāt, dolores uehementes, et tormina concitāt, lib. Introd. c. 13. et 2. de loc. aff. 5. Inde *Colica* medicamēta sunt, quæ ad sedandū Coli dolorē sūt comparata, quæ quidem & si *anodyna* sunt, à comuni tamen *anodynorum* forma, differunt, quod quæ propriè *Colica* appellantur, aromatis, odoratis, ac uirinam cientibus seminibus permiscentur, & quamquā *Colica* uocentur, non tamen ad *Colicos* tantum, sed ad omnem dolorem in quacumque corporis parte factum, sedandum ad mouentur, quo factum est, inquit Gal. initio libri sexti de locis affectis, ut antidotos omnes dolorem sedantes, ueteres *Colicos* nuncupauerint, uide *Narcotica*.

Collectica medicamento faciltas est, quæ ulcera, & vulnera glutinet, 5. de simplic. cap. 2.

Collectina inæqualitas pulsuum est, quæ ex inæqualitate

litate plurium pulsum est conflata, 1. de differ. puls. cap. 30. quae & Systematica dicitur, vide Systematica.

Colliculum idem est quod Nympha, caruncula est ad fissuram colli matricis exorta, quae dum virgo defloratur scinditur, quam quod multo promineat, Aegyptii in Virginibus excidere consueverunt, lib. Introd. cap. 10. Atqui plures ex antiquis Anatomicis, tum praesertim Auicenna, dicunt ijs quae non dum venerem sunt expertae circa medium colli vteri, panniculum virginalem dictum, esse, qui hymen, alijs hymenaeon vocatur, & ut aiunt in prima coitione rumpitur; quod verisimile non videtur, nam in dissectione virginum non apparet, nec usquam quod legerim meminit Galenus, sed potius credendum est, collum ipsum, quod musculosum sit, & nervosum, ex ipsa textura tantummodo connuere, & angustum esse, Nympha vero est adnata Epiphysis, & appendix cutanea, lata intra pudendum muliebri supra alarum commissuram, ad urinarium meatum sita, gemina autem est, utrinque scilicet una, data est a natura tum ornamenti causa, (nam quod peni virili praeputium est & Vva Pharingi id Nympha vtero) tum etiam, ut Vterum a pulvere frigore, & alijs externis iniurijs tueatur, 15. de vsup.

Colliquatio, vide Anastachiosis.

Colli-

Collisio, & Contusio est, cum exterior superficies percussæ corporis continuitatem seruat, multae verò exiguae diuisiones in profundo constiterint; at cum cavitās aliqua apparet, quam rei collisæ percussor impreſſerit, tunc illisio dicitur, lib. de sympt. caus. cap. 11. quae Graecè θλάσμα Thlasma dicitur.

Collum vteri, siue os vteri, est illud quod intus est, ubi vterus desinit, collum verò incipit; quod magis propriè os vteri diceretur; nam altera colli extremitas, quae mulieris pudendis coniungitur, non vteri, sed ipsius colli os non sine ratione diceretur, 5. aph. 46.

Collum, vide Spina.

Collyria Latinis medicamenta vocantur, quæ oculis admoventur, Græci κολλύγια nominant, hæc verò diuſum generum sunt, quædam enim liquida sunt & passim collyria nominantur, quædam arida, & hæc barbarā voce dicuntur sief; Græci hæc uocant ὑγρονόσγρια, illa verò ὑγρονόσγρια, 9. simplic. & 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Colobomata Græci vocant partes, quæ in labijs aut narium alis, aut aure deficiunt, & decurtantur, 14. meth. cap. 16. quæ propriè curta vocantur.

Colon intestinum quintum in ordine, secundum aetatem in crassis, 6. de anat. adm. cap. 9. dicitur verò Colon, idest Laxius intestinum, quod excrementa ex distributione segregata, suscipit, lib. Introd. cap. 11. quod & pingue intestinum appellat

Gale.

Galenus, 2. de sympt. cau. cap. 5. Vnde propter sui latitudinem, ipsum solum quidam uentrem inferiorem appellant, 4. rat. uiff. 112.

Columella κίον κίον, et Colūna siue Gargareon, caruncula est à faucibus dependens, uocis instrumentum; lib. finit. uide Gargareon, & Staphyle.

Coma, idest, Sopor, siue propensio & delatio in somnum, est, cum uigilare aegri nequeant non apertos habentes oculos, sed conuiuentes, uel altis somnis uel tenuibus, uel uigilijs detineantur, com. 1. in 3. de morb. vulg. 7. uide Caros. Hippocrates uerò Cataphoram omnem idest ad somnum propensionem Coma appellat, est enim in somnum delatio, nequeuntibus infirmis uigilantium munia obire, sed tum palpebras claudere cupiētibus, tum dormire sperātibus; cum autem aegri clausis palpebris dormire nequeūt, sed plurimum uigilant, Coma non somniculosum uocat, com. 1. in 1. prorrhēt. 1. aliquādo Coma pro marcore sumitur, 4. sanit. tuen. cap. 4. Marcere enim torpere significat, atque languore & inertia teneri, praesertim cum Celsus de Lethargo, in hoc (dicat) marcor & inexpugnabilis dormiendi necessitas, & comatosos, somnolentos, & inertes appellet, uide Sopor.

Comitialis morbus, est omnium corporis partium, ex temporum interuallis facta conuulsio, tum mentis ac sensuum oblesione, qui & Epilepsia dicitur, 3. loc. aff. 7. & de differ. morb. cap. 5. qui adhuc morbus magnus, morbus sacer, affectus puerilis, & Herculeus

leus dicitur; puerilis quidem, quoniam pueritię tempore abundat, Herculeus, non quod Hercules eo vexaretur, sed quidam morbi sauitiem exprimere uolentes, nomen hoc magnitudinem significans Herculeam, effinxerunt, com. 6. in 6. de morb. vulg. 7. dicitur adhuc puerilis, ut qui à pueritia incipiens, ferè semper consenescat, Latini Comitalem dixerunt, quod in Comitijs, & hominum frequentia maxime egros corripiat.

Commisura, quae & Sutura dicitur, Synarthrosis species est, & ossium cōpositio, ad consutarum rerum similitudinem, quae, & serrata dicitur, cum serrae modo, contrario occurſu congregiuntur, ubi dentatae alterius partes, in alterius sinus comittuntur, lib. de ossib. in proœmio.

Communis morbus, siue uniuersalis est, qui multos in communi inuadit, cui oppositus est morbus, qui dispersus, siue Sporas dicitur, qui aliquos separatim tantum; Inter communes alij sunt publici quos uocāt Endemos, in quo genere pestis est, alij uulgares, seu publice grassantes, quos Epidemos, seu Epidemios uocant, qui morbus si alicuius sit ciuitatis, uel loci proprius, dicitur Vernaculus, com. 1. in 1. de morb. vulg. in argumento, uide fusius, uerbo Pandemus, et Epidemus.

Communis, siue media Cubiti uena est, quae fertur communis ei quae humeralis nominatur, & ei quae per axillam ad manum, 3. loc. aff. cap. 7. quae, et mediana

diana, & corporalis, & purpurea & nigra dicitur, lib. de anatom. viii. vide Media.

Compages, Capitis sunt suturae qua parte ossa capitis inter se mutuo compacta coaptantur; suturae uero ex translatione dici consueuerunt, Caluaria enim ossa adeo exquisitè inter se coniunguntur, & coaptantur, ut ipsorum coniunctio per Harmoniam, idest, ex compage, et coaptatione facta, merito sutura ex panorum qui consuuntur similitudine, dicatur, com. 3. in lib. de ijs quæ in medic. fiunt. 36.

Complexio februm est, quando duæ febres horis differentibus inuaserunt, confusio autem quando eodem tempore incaperint, 2. de differ. feb. cap. 8.

Compositus morbus est, qui ex pluribus accessionibus, & remissionibus, siue eiusdem generis ut duarum, vel plurium tertianarum, quotidianarum, vel quartanarum, siue diuersi, ut vnius tertianæ cum quotidiana, vel cum quartana, constat; cui oppositus est morbus simplex, vnam genere intensionem, & remissionem faciens, lib. de Typis, cap. 3.

Compressio, est laterum cuiusque vasis astrictio, & angustatio per coalitum, 1. de caus. sympt. cap. 5. differens ab obstructione (quæ & oppilatio dicitur, 2. de caus. puls. cap. 1.) quæ est meatuum nostri corporis interclusio, ex aliquo tumore, vel corpore interposito, non per coalitum, lib. de differ. morb. cap. 7. si quidem compresso extrinsecus neruo, angustio

fit meatui eius contingit, 1. de sympt. caus. cap. 5. & de differ. morb. cap. 5.

Compunctio, est perforatio, quæ acu fit suffusis, 10. de v. sup. cap. 6.

Conarium, vide Conoides.

Concaua vena, est vena porta, 5. loc. affect. cap. 3. vide Vena porta.

Concausa, Vide Continentes.

Conceptio, idest, seminis comprehensio, motus est quidam vellicationis & contractionis Vteri dum semen in seipsum eiaculatum, amplectitur, lib. an animal sit id quod, cap. 2.

Conchula κόρυς, vide Aures.

Concoctio est ciborum à ventriculo, in conuenientem animali qualitatem alteratio, quæ concoctio, si tarda, & ægrè Longiorique tempore fiat, Brady-pepsia, si autem in alteram qualitatem, non in eam quæ sit secundum naturam, fiat mutatio, Dys-pepsia, si vero nulla fiat alteratio, sed quales sunt assumpti cibi, tales in omni qualitate manent, & deiciuntur, dicitur Apepsia, lib. de sympt. differ. cap. 4. Alteratio ipsa, vsque quo alimentum in similitudinem partis quæ nutritur, transmutatur, concoctio, ubi vero iam parti apponitur, nutritio dicitur, 8. de compositione medicam. loc. cap. 6. Concoctio eorum quæ præter naturam sunt, est ipsa maturatio morbi; at ipsa concoctio in coquentis substantiam deductio quedam est eius quod

quod concoquitur, com. 2. in 1. de morb. vulg. 44.

Condensantia medicamenta omnia frigida sunt, et aquea, quare poros tenues in unoquoque corpore cōdēfant, & contrahunt; Caterum instrumentum undique totum constringere nequeunt, unde & Pycnotica dicuntur, differuntq; à siccantibus, quod frigida & sicca sint, ab obstruentibus, quod frigida & crasse sint substantiæ, 5. de simpl. cap. 14. uide Obstruentia.

Condyloma, quasi dicas Nodus, est extuberatio, quae cum phlegmone in rugosa contrahenteq; se aniparte, consurgit, lib. finit. quae & Thymus dicitur, 14. meth. cap. 3. Est adhuc carnis excrescentia callosa in digitis manuum & pedum, in seae item ac uteri ore coalescens; sic dicitur, quod prominet in modū articuli, quem Condylon appellant, sed hic affectus in sede precipuè oritur, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac praeter naturam intumescente. Quū enim sinuosus sit anus, rugas coagmetatas habet, ubi uerò amplius intumuerit, tunc fit Condyloma, & aliquando citra inflammationem fit & molle est, quandoque uerò cum inflammatione, tumque durum est & dolorificum.

Condylus, idest tuberculum seu Nodus, est gibba ossium explantatio Radij, & Cubiti, quae Carpo de articulantur, ob id etiam aliquando Capita dicuntur, & Apophysis, 2. de usup. cap. 2. Dicuntur, & Epiphyses, idest, artuum capita, ubi enim os medullam habet, eius finibus utrinque caput instar operculi

cuiusdam

quiusdam, ut plurimum uides adnasci, 10. de usup.
cap. 18. uide Nodi, & Articulus.

Confusio februm, uide Complexio.

Congelationes, passionis omnes dicuntur, quae à
causa frigida, & uehementibus algoribus ortum du-
xerunt, lib. de differ. morb. cap. 5.

Conia stacte, idest, Lixiuum destillatum, 1. ad
Glauc. cap. 3.

Coniectura artificiosa est, quae propè ad ueritatē
accedit, 1. de cris. cap. 9.

Coniunctiua oculi tunica, uide Rhagois,

Coniunctiua causa, uide Continens.

Conoides corpus, siue Turbinatum, quod & Cona-
rium dicitur, Cerebri particula est, ueluti firmamen-
tum quoddā uenis, à magna decliui propagatis adia-
cens, lib. 9. de anat. adm. cap. 3. cuius substantia
glandula est, figura autem Cono per quam similis;
Vnde ei nomen quoque est impositum, utilitatem au-
tem ei eandem esse existimant aliqui, quae est Pylo-
ro uentriculi, nam ut hunc confirmant esse glandulā,
prohibereque ex uentriculo cibum prius, quam is co-
ctus sit, in tenue intestinum transumi, ad eundem
modum & hanc glandulā Conarion in principio mea-
tus constitutam, qui meatus spiritum ex medio uen-
triculo in Parencephalidis uentriculum transmittit,
custodem quendam esse aiunt, & uelut Oeconomum,
quantum spiritus mitti oporteat, 8. de usup. cap. 14.

Connutritus morbus est, qui longinquo tempore
bomi-

hominū corpora infestat, co. 5. in 6. de morb. vulg. 6.

Consistentia urine, idest tenuitas & crassitudo, 9. meth. 4. quam Arabes uocant urine substantiam.

Consistentia, seu status Paroxysmi, est illud tempus accessionis febrilis, cum iam caliditas materiam conuicerit, atque usque adeo calor augetur, ut non modo locum exurat, qui est quodammodo putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur; ac cum iam ad summum feruoris deuenierint humores accensi, id accessionis tempus consistentia appellatur, tunc uerò uniuersum laborantis corpus igneum redditur, extensa per totum animalis corpus equaliter caliditate, 2. de differ. feb. cap. 11.

Constitutio, καταστάσις, est in propriam sedem alicuius luxati corporis collocatio, restitutio & repositio, 3. de fract. 38.

Consistentia, uel status paroxysmi, ἀνὰ, uide Ascensus morbi.

Contenta, ἰχθυήσα, uide Continentia.

Contentiua causa, uide Continens.

Cōtētus pulsus, idē ac uehemēs, 3. de diff. puls. c. 5.

Continentes causæ (quae contentiuae & coniunctae dicuntur) sunt, quae cum presentes sunt, morbi quoque adsunt, cum tolluntur morbi etiam discedunt, ut spina, telum; opponuntur euidentibus, seu procatarctiis, & antegressis causis, quae dum aduersam ualeitudinem crearunt, separantur, ut labor, solis ustio, cruditas. Concausæ sunt, quae affectum
sua

sua uel generare possunt, generant etiam, et alteri coherentes, unde Synœtia dicuntur. ut lapis in uesica, & inflammatio, nam ambe urinæ suppressionis causa sunt, et si per se utraq; illâ generare possit. Coadiutrices causarum partes, quæ sua uirtute morbum efficere non possunt, sed alteri auxiliatur, ut libido articulare morbum promouet. Precedens, siue interna, quæ ab euidentibus, uel præparantur, uel coadiuuantur, ut sanguinis abundantia, nutrimenti soboles est. Introd. cap. 8.

Continens febris, uide Synocha.

Continentia, ὁχοντα, vocat Hippoc. solida corporis membra, ut quæ comprehendant, regantq; humida, contenta autem humores, ut qui à solidis comprehendantur, quæ impetu feruntur spiritus; si quidem in omnem corporis partem momento temporis, & facile, & citra impedimentum perueniunt, lib. de trem palp. cap. 5. Continentes autem partes erunt, ut corpus solidum Cordis, arteriarum, & aliarum partium cavarum, atq; aliquid suo sinu concludentium, quæ sunt bases, radices, & fundamenta aliarum, in ipsis enim singulis triplex adest substantia, uerè ipsa solida, circumfusa alia carnosamuniens, & fouens, & per utranque sparsa spirituosam.

Continua febris συνεχὴς πυρετός, est quæ ad febrecitationem antequam ex toto soluatur, non desinit, & si declinatio aliqua sensibilis appareat; Cum uero declinatio aliqua sensibilis non fiat, sæper uerò à primo principio febris usq; ad crisin similis perseuerauerit.

G erit

erit febris deurens, ardens, Causon, à continuis sol-
la acutie differens (quæ enim idem cum genere no-
men sortiuntur, atque in pluribus particularibus ac-
cessionibus continentur, continuæ appellantur) quæ
& Synocha appellatur, hæc quidem Epacmastica
sive increscens, sive Anabatica, illa homotena, sive
acmastica, in eodem semper vigore & tenore perse-
uerans, vltima paracmastica, sive decrescens, 2. de
cris. 6. & 2. de differ. feb. cap. 2. Bisariam veteres
vti continui nomine, & intermittentis videntur; nam
continuas vocant febres, quandoq; omnes, quæ nul-
lum tempus liberum habent accessione, quandoq; non
omnes quæ accessione nunquam vacent, sed solas præ-
cipuè illas, quæ omni carent, vsque ad iudicium mu-
tatione. Ita intermittentes interdum appellant illas
solas, quæ accessionem perpetuam non habent, inter-
dum eas, quarum non recedit accessio, sed insignes fa-
ciūt mutationes singularum accessionum, in initium,
incrementum, uigorem, & remissionem; At medici
quidam iuniores, quæ non magnam mutationem ha-
bent, non continuas, idest, synochas, ceterum syno-
chos nominant, continuas autem has solas, quæ non
veniunt ad integritatem, & intermittunt singulis ac-
cessionibus, has vocant antiqui, interim continuas,
interim intermittētes, nam sunt recte inter cōtinuas.
& desinentes in integritatem, mediæ, Proinde recte
vbi cum synochis conferuntur, intermittentes appel-
lantur, cum ad integritatem venientibus, continuæ,

com. 3. in 1. de morb. vulg. 2.

Continui solutio, ἀποσπασμα, vide Vnionis solutio.

Contractiones, vide Ganglia.

Contraindicare, vide Endixis.

Contraria apud Hippoc. & medicos sunt, non in corporum modo qualitate, ut calidum frigido, humidum sicco, sed in quātitate etiam vt magnum paruo, laxum denso, plenum vacuo, quæ Arist. opposita vocat, quo sensu dicunt Medici, curationem fieri per contraria, 11. meth. cap. 12.

Cōturbatio, seu Perturbatio, ταράξις, vide Taraxis

Contusio, θλάσμα est cum graue aliquid, supra corpus incidit, ac collidit, ita vt carnea pars disrūpatur; cum verò caro contusa, in locum sub cute cruorē contraxerit, sine vlla cutis diuisione, exuccatio, sugillatio, effusio, nigror, & nigritia dicitur; venas tamē exiguas, simul cū carne rūpi, ac discindi in huiusmodi sugillationibus, est perspicuū, 3. de his quæ in med. 30. lib. de tumor. cap. 10. 5. de compos. med. per gen. cap. 3. vide Collisio, & Vnionis solutio.

Conuexa Hepatis, vide Sima.

Conuulsio, σπασμός; Cum omnes arbitrarij motus musculis obeantur, quando ad sua ipsorum capita retracti, vnāquamque particulam, cui inseruntur, simul attraxerint, si affectus aliquis in tensionem ipsos ducēs, acciderit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali, sed citra voluntatem, & vocatur affectus cōuulsio, lib. de Trem. palp. c. 8. quā Celsus, lib. 2. c. 1.

vocat nervorum distentionem ; quæ convulsio vel universalis est, ut cū totū corpus curvatur aut in priora, et dicitur ἐμπροσθέντος, aut in posteriora, ἐπίσθιόντος, aut in utranque partē æqualiter τέτανος, quibus additur & ἐπιληψία ; vel particularis, aut in musculis oculorū, et dicitur στραβισμός, aut mandibulæ τρισμός, aut oris κυνικός σπασμός, aut penis Σατυριασις, vide Rhegma & Unionis solutio .

Convulsio Canina σπασμός κυνικός, est affectio musculorum maxillarium, per quam os, nasus, oculus, labrum, atque adeò dimidia faciei pars in obliquum torquetur, quæ affectio non nunquam dicitur, convulsio, interdum paralysis, ad musculum latum pertinēs affectio est, quam quidā uocant oris torturam, 4 loc. aff. cap. 2. versus finem .

Convulsio Comitialis, quæ laboranti Epileptico affectu, accidit, 5. loc. aff. 5. & 3. loc. aff. 7.

Convulsiuum affectum uocat Galenus, qui ante mortem necessariò convulsionis habet symptoma, 1. de præsag. ex puls. cap. 4. & co. 3. in 1. prorrhæi. 69.

Convulsiuus & Vibratus pulsus sunt, qui naturali sede relicta, unum locum non tenent, sed sursum atq; deorsum agitantur, In vibratis, arteriæ quedā partes, quasi iacula superiora petere, quædam demitti, uno eodemque tempore conspiciantur, quæ distentio parua est in convulsiuis, 1. de diff. puls. c. 28. Convulsiuus pulsus est, in quo ad utrūq; terminū tēdit arteria, quæ convulsio sequi solet, 2. de caus. puls. c. 12.

Cooper-

Coopertoria Chartilago, uide Cricoide .

Cophosis κώφωσις, idest surditas, est abolita auditus actio, inducta, vel abijs quę ipsam audiendi facultatem, eiusq; primariũ instrumentũ quod est animalis spiritus in aures affluens, aut ipsius organa quę natura ad audiendum comparauit, lædunt .

Copos, idest, lassitudines Gręci homines uocāt affectus, ex multo uehementiue motu corporibus, uel totis, uel particulis quę amplius laborarunt oborientes, unde *Acopa* medicamenta, quę talem lassitudinem tollunt, 7. de compositione medicam. per gen. cap. 11.

Copula Σλωδεσμος, terminus musculi est, sensu omni carens durior, & crassior Nervo, & Tendone, usum eum quem uel nomine ipso præsefert, exhibēs; differens à Nervo, & Tendone, quod Nervus à Cerebro, uel spinali medulla exorsus, sensum aut motũ membris inducit, Tendo uerò finis musculi nervosus est, ex Copula, & Nervo procreatus, 1. de placit. cap. 9. quam quidam homines Nervum nuncupant, com. 1. in 6. de morb. uulg. 2. uide Nervum .

Cor καρδιά, est uiscus, carne dura, fibrosa, caua constans, principiiũ uitalis facultatis: sunt qui musculum esse definierint, uerum & minus rubet quam Musculus, & longe durius, spissius, solidiusque est, multoque aliter fibris intertextum; fibris nanque ualidis, & rectis caro eius circumfusa est (Vnde & *Parenchyma*, nomine quoq; alijs uisceribus cõmuni,

appellantur à basi ipsius in mucronem tendentibus, Arteriarum, & Caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons & domicilium, in medio omnino Thorace situm, præsertim sua basi, quam caput eius nominat, 6. de vsup. & 7. de anatom. adm. vocant adhuc & Cor veteres omnes, os ventriculi, propter affinitatem maximam, quæ illi est cum Corde, & mutuum consensum, vt ostendit Gal. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoide, vide Ancyroide, & Acromion.

Coryphe, vide Vertex.

Cornea siue Corniformis (Κερατοειδὴς χιτὼν ὁ ὀφθαλμοῦ) oculi tunica est, tenuis dura, & densa, quæ à dura Cerebri meninge proficiscitur, & tenuem oculi tunicam choroidem in orbem amplexitur, quæ & Ceratoide dicitur, 10. de vsup. cap. 3. quæ & Cærulea dicitur, est quæ tunicæ secunda oculi, hoc est proxime subiecta adnatæ tunica, quam ἐπιπλεγμα appellat, vide Cærulea, & Ceratoide.

Cornicularis processus, vide Ancyroide.

Corniformis, vide Cornea, & Ceratoide.

Cornua, Κέρατα, numerantur inter affectus præternaturam, sunt autem duæ eminentiæ osseæ, quæ prope tempora nascuntur; dicuntur, & Dionysisci, sunt & Cornua Vulvæ siue sinus, duo processus mamillares, à lateribus vulvæ ad utraque ilia, quos alij vocant Cirros, lib. de vulvæ diff. cap. 3. vide Apices matricis.

Corona oculi, vide Iris et Stephanos, ἱερὸς Στεφάνων.

Coro-

Coronale os, ut Coronalis sutura Στεφανιαία ῥαφή, Στεφανιαίου ὀστέου sunt, sutura anterior Craniū ab uno temporum osse ad alterum trāsuersim perueniēs, sic etiam os frontis coronale dicitur, quoniam ea capitis parte ubi sunt, coronæ gestari soleant, vel quod in orbem frontem cingant, 9. de vsup. 2. de ossib. c. 1. 6. de anatom. adm. cap. 1. Inde, & Coronalis uena, Στεφανιαία φλέψ, propago est veniens à magno trunco venæ causæ sursum ascendentis, cingens cordis basim in modum Coronæ; Est & alia uenæ causæ propago quæ Coronalis stomachica Στεφανιαία στομαχική appellatur, quæ à ramo splenico venæ causæ proficiscitur, & ad stomachum effertur, ibiq; bipartito ramo, maiore ceu corona stomachum totum cingit, minore ad pilwron descendit. Quemadmodum autem à uenæ causæ, coronalis hæc uena proficiscitur, sic à magna arteria statim, ubi à Corde orta est, arteriæ duæ coronariæ, prodeunt, maior sub ualuula dextra, minor sub postica, quæ in Cordis superficiem, & eius partem crassiorem, perinde ac uenæ, distribuuntur, 7. de anat. adm.

Corone, siue Coronon, est extremum ossis quod in mucronē desinit, lib. de ossib. in proœmio, unde omnes apophyses rotundas, appellant coronas, vel Coronus, Κορώνη ἢ Κορώνον, sic autem dicitur, quia τὰς ῥογὰς, hoc est Cornicis rostro similis sit, quæ autem Apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non Corone, sed Anche Græce ἀνχή, nominat, 2. de vsup. c. 14.

Corporalis vena, vide Communis vena.

Corrugatio pupillæ, vide Tabes oculi.

Coryza, grauedo, κορυζα, tenuis, & incoctus humor est, qui per nares secernitur, quasi grauedinem dixeris, quemadmodum talis defluxio, cum per palatum fit, dicitur Catarrhus, 2. progn. 49. est autem hic humor, non qui proprie υαδς, siue crudus dicitur, sed qui αρωτος, hoc est liquidus & tenuis, Celsus autem autor est, & destillationem, & grauedinem κορυζας Hippocratem appellasse. Catarrhum appellamus, cum quod supernacuum est in Cerebro, in os disfluit, Coryzam cum in nares, Bronchos autem siue raucitas catarrhis superuenit, faucibus scilicet humore imbutis, quod si in Gargareonem fluxio procumbit, aut quam ex similitudine Græci staphylen, idest, acinum vocant, in ea gignit, aut aliàs tam in tumorem attollit, at si glandulas, antiadas; si in eas quæ ipsæ proxima, sunt, Paristhmia, 3. de sympt. caus. c. 4.

Costa extrema est, non parua illa re uera spuria, quæ ab alijs discedit, & carnosæ parti septi transuersi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta iam membrana tenuis intus subtenditur, ei continua, quæ omnes costas subcingit, 5. de anatom. adm. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ à Collo toto ad ilia usque ex anteriore parte, ad utrumque latus protenduntur, lib. Introd. cap. 10. & 3. de artic. 37. duodecim ut plurimum numero sunt, ex quibus superiores septem simpliciter αλωγει dicuntur, quinque uero relique

quæ costæ inferiores νόθαι dicuntur, hoc est spurie, et illegitimæ, quia imperfectæ sunt.

Cotyle, κοτύλη, vide Articulus, & Acetabulum.

Cotyledones, κοτυληδόνες, vide Acetabulum.

Coxa, quæ & Ischion, magnum femoris ossis caput est, Græce ισχον, idest Coxa appellatur, veluti cavitatis eius, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. unde affectus fit, qui Ischias & Coxendix appellatur, inde Ischiadici & coxarij, idest, coxæ morbo laborantes, 7. de comp. med. per gen. cap. 16. Ischion aliquando significat ligamentum ipsum, quo semur coxendicis acetabulo colligatur, interdum verò ipsum articulum; sed et Ischia ισχία dicuntur à quibusdam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, quæ & κυφία à Græcis, à Latinis Clunes appellantur, os autem Coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum undique pertinens. Os enim sacrum, qua parte femoris caput ei inseritur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calua, Caluaria κρανίον, est os capitis crassum, rarum, rotundum, ossibus septem compactum, suturisque distinctum, Cerebrum continens, atque utramque meningē ambiens, quod quasi κρανός, idest, galca Cerebro adiaceat, 8. de vsup. cap. 9.

Crasis, Græce κρασις & κρησις, temperiem significat, 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana, vide membrana dura.

Crassa vena, idest, humeralis, 1. de artic. 53.

Crassus pulsus, vide Cracilis.

Crea, vide *Tibia*.

Creber pulsus est, cuius intermediæ quietis est breue tēpus, rarus, cum longum; 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremaſteres, vide *Teſtes*.

Cremor, idem est ac *Chymus* χυμός, 3. de natur. facul. cap. 4.

Cremor ptisanæ est, ubi à decoctione quis ptisanā colauerit, deinde cremorem separauerit, hæc ptisana non dicitur, sed ptisanæ cremor, 1. acutor. 26.

Cricoides chartilago, est laryngis chartilago, basim anuli figuram representantem efficiens; Tribus enim chartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima ex internis partibus collocatur, cuius connexum extra prominet, concavum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, à quo *Anatomici Thyroidem*, idest scutiformem, alii peltalem, quod pelta ferream agat, nominant. Posterior quæ basim Cricoidem, idest anuli figuram imitantem efficit, postremæ ipsius asperæ arteriæ chartilagini, sigmæ literam imitanti, incumbit; Scutiformi verò in priori sui ipsius parte subiacet, (quæ & Cricoides, Cymbalaris, & Coopertoria dicitur) Reliqua ab his Chartilago, quæ tum positione, cum magnitudine tertia est, in suprema Cricoidis, (quæ, & innominata dicitur.) Chartilaginis parte sita est, gutturalis, infundibulisq; quas *Arytenas* vocant similis, unde & *Arytenoides* dicitur; Quæ autem à radice linguæ exoritur, quam *Epiglottida*,
quasi

quasi superligulam dixeris, non est bronchi propria, lib. de vocal. inst. diff. cap. 4. & 7. de vsup. cap. 11. & lib. de anat. uin.

Crimnoides vrina Κρινωδής, cuius sedimenta crimnoidea sunt, idest, quæ speciem furfuris, vel spumæ referunt, significantq; sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationē, si alba, lib. de urinis, cap. 29, uide Hypostasis.

Crisis, siue Iudicium, siue Iudicatio Κρισις apud aliquos est subita in morbo mutatio, apud alios est in meliorem statum inclinatio sola, apud alios est ea quæ antecedit agitatio, apud alios integra totius morbi solutio; apud alios illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit, 1. de cris. cap. 1. Sed ea quæ repente fit, per excellentiam Crisis dicitur, quæ natura, quæ præter naturam sunt, superante, exquisitè perficitur, 3. de cris. cap. 1. Iudicatio per morbos, de foro translatitia appellatione dicta est, significans precipitem in morbo mutationem, cum quadam euidenti euacuatione, vel abscessu, quæ quadrifariam existit, aut enim statim vindicantur à morbis, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multo deteriores euadunt; Itaque duas primas iudicationes, proximas duas magna ex parte cum adiectione, malam aut prauam iudicationem, quandoq; uerò, sine adiectione simpliciter, 3. prognost. 1. Vtitur item Hippoc. Crisi pro λύσις, idest, solutione morbi, ut in progn. optimam eam dicit esse urinam, in qua

in qua per totum morbi curriculum, donec ipse iudicatus sit, subsidet album, leue, & equale. Tertia adhuc est eiusdem κρισις significatio, ad motum uehementem naturae pro cuiuslibet rei molestae depulsione, secundum quam non modo morbi, sed & conceptiones, & abortiones, & partus, & omnino quaecunq; magno conatu naturae indigent, dicuntur Iudicari, lib. de septim. par.

Crisis asima, quae à nullo dierum indicantium fuerit indicata, 3. de cris. 10. periculosa, quae cum grauius symptomatis accidit; Infida seu incerta, cum morbi recidina contingit; Obscura, quae citra excretionem, vel abscessum euidentem euenit; Absoluta, quae in morbo nihil facit reliqui, 1. die. decr. cap. 2.

Crisis imperfecta, quae non omnino à morbo liberat, 3. cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit, 1. dier. decr. cap. 2.

Crisima signa, idest, decernentia & iudicantia, 1. aphor. 12.

Crithe, idest, Hordeum, siue Hordeolum, siue Posthia, & oculorum tuberculum, de remed. par. fac. cap. 10. uid. Hordeolus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, Κροταφοίται, idest, temporales musculi, qui maxillam inferiorem mouent, & sursum trahunt, & intra os siti sunt, lib. de musc. diff. cap. 6. uide Manducatorij.

Cruda Urina, uide Aquosa.

Cruditas quæta est, cum Kenriculus, uel propria morbo

morbo, uel uitiosis humoribus in ipso accumulatis, uel praua alimentorum qualitate, ut nidorosa, acida, fœtori, aut putredini, aut corruptioni obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, ea non amplectitur, sed in ipso corrumpuntur. Differens ab incoctione, quæ est rerum quæ non possunt concoqui, ut acinorum, & omnium quæ omnino imputria, & immutata deijciuntur, 1. loc. aff. cap. 3.

Crudus humor αἷμας χυμὸς est, cum alimentū, suam naturam, in uentriculo, hepate & intestinis quàm diutissime seruat, nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum, est destinata; suscepta; uel cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem, 8. de comp. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, ijs præsertim quæ ex edacitate sedimen multum fabaceæ pultriculæ simile obtinent: quin & corporibus ijs quæ ab exercitatione abstinuere, cibis uerò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos utebatur, sepe eiusmodi humor confertim per aluum descendit, sed & una cum hoc humore, perinde ac cum pituita, decolor quedam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetētes homines efficit, lib. de multitud. cap. 11.

Crura Κνῦμαι, dicuntur extreme corporis partes, quæ thoracem medium, & imum uentrem prætergrediuntur, ut quicquid prominet ultra os sacrum, et carnosos

nosos musculos illi subiectos infernè, usque ad pedes, & id quod superne ultra thoracem, & scapulas usq; ad manus, id crura dicantur, lib. Introd. cap. 10.

Crysoorchis, χρυσορχής, est testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recessio, lib. finit.

Crystallinus humor, χρυσταλλοειδὲς ὕγρον, et Crystalloidis (qui glacialis adhuc dicitur, quod concretam glaciem imitetur 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, in quo fit visio, primumque videndi instrumentum, qui per Diadosin, idest, transumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adharet vitreus oculi humor, qui & Hyeloides dicitur, qui que quanto crassior & albior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate atque albedine relinquitur; subest huic Albugineus, albo oui similis, quem Hydatoidem, quod aquæ sit similis, vocant, 10. de vsup. cap. 1. lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11.

Ctir, κτήγ, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur; quæ sinum ambiunt, περιγύματα, idest, alæ vocantur, 15. de vsup.

Cubitus, (ὀγκὼν, ὀγαστὲς, ἰλέηρανον πῆχυς αἰένη) est os, quod inter Humerum & Carpon, quod brachiale dicitur, situm est; eiusdemque partis os grandius Cubitus item dicitur, qui alteri subest ossi, quod Radium nominant, lib. de ossib. cap. 17. quem cubi-

tum

tum Pechym, idest, vlnam dicunt, 2. de vsup. 2. clarius. Cubitus Pechys πῦχος, seu ulna, Arabibus facile maius, est ea pars totius brachij, quæ superne terminatur, qua brachio quidem continua est, per articulum, qui in curvatura cubiti est, cui innitimur; inferne autem qua Carpo manus; quo spatio, duo ossa recipiuntur, alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine quo pars, idest Cubitus, alterum quod Cerchis, Arabibus facile minus, idest Radius appellatur, 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de de fract. 18.

Cubiforme os, quod κοβειδὲς ὀστέον, siue os Cubiti dicitur, est os quod ab externis pedis partibus firmum in terra statuitur, externis quæ Tarsi partibus, est locatum, & dearticulatur cavitati calcanei ad finem adiacenti, 3. de vsup. 7. est enim os vnum, ex quatuor tarsi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus, est autem os, ut reliqua Tarsi ossa, intus cauum, foris gibbū, est autē os Cubo simile, quod latera sex habeat Cubo cōmunia.

Cuculus, vide Coccyx.

Cucurbitule leues, quæ citra scarificationē adaptantur, 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, quod & ὀστέον ὀπυκειδὲς, os basilare, et os palati appellant, medium inter superiora & inferiora totius capitis ossa, de ossib. cap. 1.

Cunnus, inanitas ea est, quæ inter ossa pubis penetrat, extrinsecus pelliculam quandam habens, vi-

erit febris deurens, ardens, Causon, à continuis sola acutie differens (quæ enim idem cum genere nomen sortiuntur, atque in pluribus particularibus accessionibus continentur, continuæ appellantur) quæ & Synocha appellatur, hæc quidem Epacnastica siue increscens, siue Anabarica, illa homotena, siue acnastica, in eodem semper vigore & tenore perseverans, vltima paracnastica, siue decrescens, 2. de cris. 6. & 2. de differ. feb. cap. 2. Bisariam veteres vti continui nomine, & intermittentis videntur; nam continuas vocant febres, quandoq; omnes, quæ nullum tempus liberum habent accessione, quandoq; non omnes quæ accessione nunquam vacent, sed solas præcipuè illas, quæ omni carent, vsque ad iudicium mutatione. Ita intermittentes interdum appellant illas solas, quæ accessionem perpetuam non habent, interdum eas, quarum non recedit accessio, sed insignes faciunt mutationes singularum accessionum, in initium, incrementum, uigorem, & remissionem; At medici quidam iuniores, quæ non magnam mutationem habent, non continuas, idest, synochas, ceterum synochos nominant, continuas autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt singulis accessionibus, has vocant antiqui, interim continuas, interim intermittentes, nam sunt recte inter cōtinuas. & desinentes in integritatem, mediæ, Proinde recte ubi cum synochis conferuntur, intermittentes appellantur, cum ad integritatem venientibus, continuæ,

com. 3. in 1. de morb. vulg. 2.

Continui solutio, ἀπὸ συνάψεως, vide Unionis solutio.

Contractiones, vide Ganglia.

Contraindicare, vide Endixis.

Contraria apud Hippoc. & medicos sunt, non in corporum modo qualitate, ut calidum frigido, humidum sicco, sed in quantitate etiam ut magnum paruo, laxum denso, plenum vacuo, quæ Arist. opposita vocat, quo sensu dicunt Medici, curationem fieri per contraria, 11. meth. cap. 12.

Cōturbatio, seu Perturbatio, ταραχὴ, vide Taraxis

Contusio, θλάσις est cum graue aliquid, supra corpus incidit, ac collidit, ita ut carnea pars disrumpatur; cum verò caro contusa, in locum sub cute cruorē contraxerit, sine vlla cutis diuisione, exuccatio, sugillatio, effusio, nigror, & nigritia dicitur; venas tamē exiguis. simul cū carne rūpi, ac discindi in huiusmodi sugillationibus, est perspicuū, 3. de his quæ in med. 30. lib. de tumor. cap. 10. 5. de compos. med. per gen. cap. 3. vide Collisio, & Unionis solutio.

Conuexa Hepatis, vide Sima.

Conuulsio, σπασμὸς; Cum omnes arbitrarij motus musculis obeantur, quando ad sua ipsorum capita retracti, vnamquamque particulam, cui inseruntur, simul attraxerint, si affectus aliquis in tensionem ipsos ducēs, acciderit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali, sed citra voluntatem, & vocatur affectus cōuulsio, lib. de Trem. palp. c. 8. quā Celsus, lib. 2. c. 1.

vocat nervorum distentionem ; quæ conuulsio vel universalis est, ut cū totū corpus curuatur aut in priora, et dicitur ἐμπροσθότονος, aut in posteriora, ἐπίσθότονος, aut in vtranque partē æqualiter τέτανος, quibus additur & ἐπιληψία ; vel particularis, aut in musculis oculorū, et dicitur στραβισμός, aut mandibulæ τρισμός, aut oris κυνισμός σπασμός, aut penis Σατυριασις, vide Rhagma & Unionis solutio.

Conuulsio Canina σπασμός κυνισμός, est affectio musculorum maxillarium, per quam os, nasus, oculus, labrum, atque adeò dimidia faciei pars in obliquum torquetur, quæ affectio non nunquam dicitur, conuulsio, interdum paralysis, ad musculum latum pertinēs affectio est, quam quidā uocant oris torturam, 4 loc. aff. cap. 2. versus finem.

Conuulsio Comitialis, quæ laboranti Epileptico affectu, accidit, 5. loc. aff. 5. & 3. loc. aff. 7.

Conuulsiuum affectum uocat Galenus, qui ante mortem necessario conuulsionis habet symptoma, 1. de presag. ex puls. cap. 4. & co. 3. in 1. prorrhoe. 69.

Conuulsiuus & Vibratus pulsus sunt, qui naturali sede relicta, unum locum non tenent, sed sursum atq; deorsum agitantur, In vibratis, arteriæ quedā partes, quasi iacula superiora petere, quædam demitti, uno eodemque tempore conspiciantur, quæ distentio parua est in conuulsiuis, 1. de diff. puls. c. 28. Conuulsiuus pulsus est, in quo ad utrūq; terminū tēdit arteria, quæ conuulsio sequi solet, 2. de caus. puls. c. 12.

Cooper-

Coopertoria Chartilago, uide Cricoidē .

Cophosis κώφωσις, idest surditas, est abolita auditus actio, inducta, vel abijs quę ipsam audiendi facultatem, eiusq; primariū instrumentū quod est animalis spiritus in aures affluens, aut ipsius organa quę natura ad audiendum comparauit, lādunt .

Copos, idest, lassitudines Gręci homines uocāt affectus, ex multo uehementiue motu corporibus, uel totis, uel particulis quę amplius laborarunt oborientes, unde *Acopa* medicamenta, quę talem lassitudinem tollunt, 7. de compositione medicam. per gen. cap. 11.

Copula Σλωδεσμος, terminus musculi est, sensu omni carens durior, & crassior Neruo, & Tendone, usum eum quem uel nomine ipso pręsefert, exhibēs; differens à Neruo, & Tendone, quod Neruus à Cerebro, uel spinali medulla exorsus, sensum aut motū membris inducit, Tendo uerò finis musculi neruosus est, ex Copula, & Neruo procreatus, 1. de placit. cap. 9. quam quidam homines Neruum nūcupant, com. 1. in 6. de morb. uulg. 2. uide Neruum .

Cor καρδιά, est uiscus, carne dura, fibrosa, caua constans, principiū uitalis facultatis: sunt qui musculum esse definierint, uerum & minus rubet quam Musculus, & longe durius, spissius, solidiusque est, multoque aliter fibris intertextum; fibris nanque ualidis, & rectis caro eius circumfusa est (Vnde & *Parenchyma*, nomine quoq; alijs uisceribus cōmuni,

appellantur à basi ipsius in mucronem tendentibus, Arteriarum, & Caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons & domicilium, in medio omnino Thorace situm, præsertim sua basi, quam caput eius nominât, 6. de vsup. & 7. de anatom. adm. vocant adhuc & Cor veteres omnes, os ventriculi, propter affinitatem maximam, quæ illi est cum Corde, & mutuum consensum, vt ostendit Gal. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoide, vide Ancyroide, & Acromion.

Coryphe, vide Vertex.

Cornea siue Corniformis (Κερατοειδὴς χιτὼν ἢ ὀφθαλμοῦ) oculi tunica est, tenuis dura, & densa, quæ à dura Cerebri meninge proficiscitur, & tenuem oculi tunicam choroidem in orbem amplexitur, quæ & Ceratoide dicitur, 10. de vsup. cap. 3. quæ & Cærulea dicitur, est quæ tunica secunda oculi, hoc est proxime subiecta adnatæ tunica, quam ἐπικερῶτα appellant, vide Cærulea, & Ceratoide.

Cornicularis processus, vide Ancyroide.

Corniformis, vide Cornea, & Ceratoide.

Cornua, Κέρατα, numerantur inter affectus præternaturam, sunt autem duæ eminentiæ osseæ, quæ prope tempora nascuntur, dicuntur, & Dionysisci, sunt & Cornua Vulvæ siue sinus, duo processus mamillares, à lateribus vulvæ ad utraque ilia, quos alij vocant Cirros, lib. de vulvæ diff. cap. 3. vide Apices matricis.

Corona oculi, vide Iris et Stephanos, ἰρις Στεφάνον.

Coro-

Coronale os, vt Coronalis sutura Στεφανιαία ραφή, Στεφανιαίου ὀστέου sunt, sutura anterior Cranii ab vno temporum osse ad alterum trāsuersim perueniēs, sic etiam os frontis coronale dicitur, quoniam ea capitis parte vbi sunt, coronæ gestari soleant, vel quod in orbem frontem cingant, 9. de vsup. 2. de ossib. c. 1. 6. de anatom. adm. cap. 1. Inde, & Coronalis vena, Στεφανιαία φλέψ, propago est veniens à magno trunco venæ cauæ sursum ascendētis, cingens cordis basin in modum Coronæ; Est & alia venæ cauæ propago quæ Coronalis stomachica Στεφανιαία στομαχική appellatur, quæ à ramo splenico venæ cauæ proficiscitur, & ad stomachum effertur, ibiq; bipartito ramo, maiore ceu corona stomachum totum cingit, minore ad piloron descendit. Quemadmodum autem à venæ cauæ, coronalis hæc vena proficiscitur, sic à magna arteria statim, vbi à Corde orta est, arteriæ duæ coronariæ, prodeunt, maior sub valvula dextra, minor sub postica, quæ in Cordis superficiem, & eius partem crassiorem, perinde ac venæ, distribuuntur, 7. de anat. adm.

Corone, siue Coronon, est extremum ossis quod in mucronē desinit, lib. de ossib. in proœmio, unde omnes apophyses rotundas, appellant coronas, vel Coronus, Κορώνη ἢ Κορώνιον, sic autem dicitur, quia τῆς Κορώνης, hoc est Cornicis rostro similis sit, quæ autem Apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non Corone, sed Anche Græce ἀνχή, nominat, 2. de vsup. c. 14.

Corporalis vena, vide Communis vena.

Corrugatio pupillæ, vide Tabes oculi.

Coryza, grauedo, κορυζα, tenuis, & incoctus humor est, qui per nares secernitur, quasi grauedinem dixeris, quemadmodum talis defluxio, cum per palatum fit, dicitur Catarrhus, 2. progn. 49. est autem hic humor, non qui proprie υαδς, siue crudus dicitur, sed qui αραιωτος, hoc est liquidus & tenuis, Celsus autem autor est, & destillationem, & grauedinem κορυζας Hippocratem appellasse. Catarrhum appellamus, cum quod superuacuum est in Cerebro, in os diffluit, Coryzam cum in nares, Bronchos autem siue raucitas catarrhis superuenit, faucibus scilicet humore imbutis, quod si in Gargareonem fluxio procumbit, aut quam ex similitudine Græci staphylen, idest, acinum vocant, in ea gignit, aut aliàs tam in tumorem attollit, at si glandulas, antiadas; si in eas quæ ijs proxima, sunt, Paristhmia, 3. de sympt. caus. c. 4.

Costa extrema est, non parua illa re uera spuria, quæ ab alijs discedit, & carnosæ parti septi transuersi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta iam membrana tenuis intus subteneditur, ei continua, quæ omnes costas subcingit, 5. de anatom. adm. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ à Collo toto ad ilia usque ex anteriore parte, ad utrumque latus protenduntur, lib. Introd. cap. 10. & 3. de artic. 37. duodecim ut plurimum numero sunt, ex quibus superiores septem simpliciter ωλογοι dicuntur, quinque uerò relique

quæ costæ inferiores νόθαι dicuntur, hoc est spurig, et illegitimæ, quia imperfectæ sunt.

Cotyle, κοτύλη, vide Articulus, & Acetabulum.

Cotyledones, κοτυληδόνες, vide Acetabulum.

Coxa, quæ & Ischion, magnum femoris ossis caput est, Græce ισχον, idest Coxa appellatur, veluti cavitatis eius, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. unde affectus fit, qui Ischias & Coxendix appellatur, inde Ischiadici & coxarij, idest, coxæ morbo laborantes, 7. de comp. med. per gen. cap. 16. Ischion aliquando significat ligamentum ipsum, quo femur coxendicis acetabulo colligatur, interdum verò ipsum articulum; sed et Ischia ισχία dicuntur à quibusdam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, quæ & οὐσφία à Græcis, à Latinis Clunes appellantur, os aut Coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum undique pertinens. Os enim sacrum, qua parte femoris caput ei inseritur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calua, Caluaria κρανίον, est os capitis crassum, rarum, rotundum, ossibus septem compactum, suturisque distinctum, Cerebrum continens, atque utramque meningē ambiens, quod quasi κράνος, idest, galea Cerebro adiaceat, 8. de vsup. cap. 9.

Crasis, Græce κράσις & κρησις, temperiem significat, 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana, vide membrana dura.

Crassa vena, idest, humeralis, 1. de artic. 53.

Crassus pulsus, vide Gracilis.

Crea, vide *Tibia*.

Creber pulsus est, cuius intermedia quietis est breue tēpus, rarus, cum longum; 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremaſteres, vide *Testes*.

Cremor, idem est ac *Chymus* χυμός, 3. de natur. facul. cap. 4.

Cremor ptisanæ est, ubi à decoctione quis ptisanā colauerit, deinde cremorem separauerit, hæc ptisana non dicitur, sed ptisanæ cremor, 1. acutor. 26.

Cricoides chartilago, est laryngis chartilago, basim anuli figuram representantem efficiens; Tribus enim chartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima ex internis partibus collocatur, cuius conuexum extra prominet, concuum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, à quo *Anatomici Thyroidem*, idest scutiformem, alij *peltalem*, quod *peltæ* formam agat, nominant. Posterior quæ basim *Cricoidem*, idest anuli figuram imitantem efficit, postremæ ipsius asperæ arteriæ chartilagini, sigmæ literam imitanti, incumbit; Scutiformi verò in priori sui ipsius parte subiacet, (quæ & *Cricoides*, *Cymbalaris*, & *Coopertoria* dicitur) Reliqua ab his *Chartilago*, quæ tum positione, cum magnitudine tertia est, in suprema *Cricoidis*, (quæ, & innominata dicitur.) *Chartilaginis* parte sita est, gutturniis, infundibulisq; quas *Arytenas* vocant similis, vnde & *Arytenoides* dicitur; Quæ autem à radice linguæ exoritur, quam *Epiglottida*,
quasi

quasi superligulam dixeris, non est bronchi propria, lib. de vocal. inst. diff. cap. 4. & 7. de vsup. cap. 11. & lib. de anat. iiii.

Crimnoides vrina Κριμνώδης, cuius sedimenta crimnoidea sunt, idest, quæ speciem furfuris, vel spumæ referunt, significantq; sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationē, si alba, lib. de vrinis, cap. 29, vide Hypostasis.

Crisis, siue Iudicium, siue Iudicatio Κρισις apud aliquos est subita in morbo mutatio, apud alios est in meliorem statum inclinatio sola, apud alios est ea quæ antecedit agitatio, apud alios integra totius morbi solutio; apud alios illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit, 1. de cris. cap. 1. Sed ea quæ repente fit, per excellentiam Crisis dicitur, quæ natura, quæ præter naturam sunt, superante, exquisite perficitur, 3. de cris. cap. 1. Iudicatio per morbos, de foro translatitia appellatione dicta est, significans precipitem in morbo mutationem, cum quadam euidenti euacuatione, vel abscessu, quæ quadrifariam existit, aut enim statim vindicantur à morbis, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multo deteriores euadunt; Itaque duas primas iudicationes, proximas duas magna ex parte cum adiectione, malam aut prauam iudicationem, quandoq; uerò, sine adiectione simpliciter, 3. prognost. 1. Vtitur item Hippoc. Crisi pro κρίσι, idest, solutione morbi, ut in progn. optimam eam dicit esse vrinam, in qua

in qua per totum morbi curriculum, donec ipse iudicatus sit, subsidet album, leue, & equale. Tertia adhuc est eiusdem *Κρίσις* significatio, ad motum uehementem naturae pro cuiuslibet rei molestae depulsione, secundum quam non modo morbi, sed & conceptiones, & abortiones, & partus, & omnino quaecunq; magno conatu naturae indigent, dicuntur Iudicari, lib. de septim. par.

Crisis asima, quae à nullo dierum indicantium fuerit indicata, 3. de cris. 10. periculosa, quae cum grauius symptomatis accidit; *Infida* seu incerta, cum morbi recidua contingit; *Obscura*, quae citra excretionem, vel abscessum euidentem euenit; *Absoluta*, quae in morbo nihil facit reliqui, 1. die. decr. cap. 2.

Crisis imperfecta, quae non omnino à morbo liberat, 3. cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit, 1. dier. decr. cap. 2.

Crisima signa, idest, decernentia & iudicantia, 1. aphor. 12.

Crithe, idest, Hordeum, siue Hordeolum, sine Posthia, & oculorum tuberculum, de remed. par. fac. cap. 10. uid. Hordeolus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, *Κροταφοίται*, idest, temporales musculi, qui maxillam inferiorem mouent, & sursum trahunt, & intra os siti sunt, lib. de musc. diff. cap. 6. uide Manducatorij.

Cruda Urina, uide *Aquosa*.

Cruditus quæritur est, cum *Ventriculus*, uel propria morbo

morbo, uel uitiosis humoribus in ipso accumulatis, uel praua alimentorum qualitate, ut nidorosa, acida, fœtori, aut putredini, aut corruptioni obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, ea non amplectitur, sed in ipso corrumpuntur. Differens ab incoctione, quæ est rerum quæ non possunt concoqui, ut acinorum, & omnium quæ omnino imputria, & immutata deiciuntur, I. loc. aff. cap. 3.

Crudus humor αἷμας χυμὸς est, cum alimentū, suam naturam, in uentriculo, hepate & intestinis quàm diutissime seruat, nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum, est destinata, suscepta; uel cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem, 8. de comp. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, ijs præsertim quæ ex edacitate sedimen muluum fabaceæ pultriculæ simile obtinent: quin & corporibus ijs quæ ab exercitatione abstinuere, cibis uerò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos utebātur, sepe eiusmodi humor confertim per aluum descendit, sed & una cum hoc humore, perinde ac cum pituita, decolor quedam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetētes homines efficit, lib. de multitud. cap. 11.

Crura κνήμια, dicuntur extreme corporis partes, quæ thoracem medium, & imum uentrem prætergrediuntur, ut quicquid prominet ultra os sacrum, et carnosos

nosos musculos illi subiectos infernè, usque ad pedes, & id quod superne ultra thoracem, & scapulas usq; ad manus, id crura dicantur, lib. Introd. cap. 10.

Crysochoris, χρυσόχρως, est testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recessio, lib. finit.

CrySTALLINUS humor, κρυσταλλοειδὲς ὕγρον, et CrySTALLOIDIS (qui glacialis adhuc dicitur, quod concretam glaciem imitetur 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, in quo fit visio, primumque videndi instrumentum, qui per Diadosin, idest, transumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adhæret vitreus oculi humor, qui & Hyeloides dicitur, qui que quanto crassior & albior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate atque albedine relinquitur; subest huic Albugineus, albo oui similis, quem Hydatoidem, quod aquæ sit similis, vocant, 10. de vsup. cap. 1. lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11.

Ctir, κτῆς, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur; quæ sinum ambiunt, περιγύματα, idest, alæ vocantur, 15. de vsup.

Cubitus, (ἀγκὼν, ἀγροστὲς, ἐλέφαντος πῆχυς ἀλένη) est os, quod inter Humerum & Carpon, quod brachiale dicitur, situm est; eiusdemque partis os grandius Cubitus item dicitur, qui alteri subest ossi, quod Radium nominant, lib. de ossib. cap. 17. quem cubi-

tunt

tum Pechym, idest, vlnam dicunt, 2. de vsup. 2. clarius. Cubitus Pechys πῦχος, seu ulna, Arabibus facile maius, est ea pars totius brachij, quæ superne terminatur, qua brachio quidem continua est, per articulum, qui in curvatura cubiti est, cui innitimur; inferne autem qua Carpo manus; quo spatio, duo ossa recipiuntur, alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine quo pars, idest Cubitus, alterum quod Cerchis, Arabibus facile minus, idest Radius appellatur, 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de de fract. 18.

Cubiforme os, quod κοβειδὲς ὀστέον, siue os Cubiti dicitur, est os quod ab externis pedis partibus firmum in terra statuitur, externis quæ Tarsi partibus, est locatum, & dearticulatur cavitati calcanei ad finem adiacenti, 3. de vsup. 7. est enim os vnum, ex quatuor tarsi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus, est autem os, ut reliqua Tarsi ossa, intus cauum, foris gibbū, est autē os Cubo simile, quod latera sex habeat Cubo cōmunia.

Cuculus, vide Coccyx.

Cucurbitule leues, quæ citra scarificationē adaptantur, 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, quod ὀστέον ὀπυειδὲς, os basilare, et os palati appellant, medium inter superiora & inferiora totius capitis ossa, de oss. b. cap. 1.

Cunnus, inanitas ea est, quæ inter ossa pubis penetrat, extrinsecus pelliculam quandam habens, vi-

rorū præputio correspondentē, lib. de vulue diff. c. 2.

Curatoria, Θεραπευτική medicine pars, est, quæ tum factum morbum tollit, ut Ethicam, & Ephemeram febrem, tum quæ fit ut putridam, tum quæ imminet, aut qui futurus timetur, quod est proprium προφυλακτικής, quæ hac ratione, sub Therapeuticâ cadit; cuius tres sunt partes ad curationem necessariae Διαίτητική, φαρμακευτική, χειρουργική, quarū primæ uictus rationem instituit, altera medicamenta propinat, postrema, manum adiutricem, admonet, de part. art. med. cap. I.

Curta, Κολοβώματα, idest, mutila & curta, id autem dicitur à Grecis Coloboma quod in labijs aut narium alis aut aure deficit, huius generis sunt, & quas in maiore angulo Rhogadas uocant, eo utique, uel impensius extenuato, minore uero facto, uel prorsus abolito, uide Colobomata.

Cuticula, uide Cutis suprema.

Cuticularis membrana, uide membrana dura.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti commixtus, obtinet, ut uel cuticulosus musculus, uel carnosus cutis dici possit, lib. de musc. diff. c. 30.

Cutis suprema Ἀγρίς, & Ἀίγυα, quæ & Derma dicitur, quasi Corium dixeris, quia excoriari potest, cuius exterior pars, Epidermis siue summa cutis corporis, siue Cuticula est, & toti super extensa, sensuq; destituta, et quæ sepe citra dolorem facile ab ea separatur, 2. de usup. cap. 6. & 3. meth. 4.

Cyboi-

Cyboides, vide *Cubiforme*.

Cycliscus sunt caua excisoria scalpra, 6. meth. 6.

Cyllum, κυλόν dicitur apud Hippoc. crus varum, idest, in exteriorem partem luxatum, uel conuersum, adeo ut Suræ processus, qui talum exterius complectitur, sine ullo stabilimento suspensus relinquatur, quamuis propriè mutilum, & imperfectum significet ut scribit Gal. 3. de diebus criticis, ubi in ea significatione mensē κυλόν appellari inquit, qui diebus viginti nouem constet, alios autem perfectos qui triginta. Vnde *Cyllosim* κύλλωσιν distortionem cruris in exteriorem partem vocat Gal. 4. de artic. Idē tamen comm. 3. dicit non nullos de omni longorum membrorum distortionē κύλλωσιν intelligendam censere, generaleque ei tribuere significatum; alios uero eo nomine distortionem solum intelligere, in qua in interiorem partem membrum inclinatur.

Cyema, κύημα, factus est cum non dum menses duos in utero absoluerit, quo tempore Embryon dici nequit, sed *Cyema*, idest, uteri gestatio, et conceptus, & genitura, 1. de sympt. caus. cap. 7.

Cymbalaris, vide *Cricoides*.

Cynache, est inflammatio extra guttur existens, quæ & *Paracynanche* dicitur, si autem sit inflammatio adiacentium musculorum faucibus adueniens, dicetur *synanche*, vel *parasyanche*, 4. aph. 34. propriè loquendo, angina Græcis est inflammatio quæ in gutture & faucibus aduenit; Hippocrates verò et

alii ueteres omnes passiones in ijs locis aduenientes ,
 quas spirandi difficultas comitatur , angina nomine
 uocant , nullo existente in pectore uel pulmone uitio ,
 qua in re differt anginæ cōcursus à Peripneumonia ,
 & laterali morbo, atque ex eo, quod angustiae sensus
 in gutture est , suntque eiusdem exquisite loquendo ,
 quatuor differētiæ, una ubi fauces inflāmantur, alte-
 ra ubi neque reliquæ oris partes, neque etiam exter-
 narum partium ulla inflammata uidetur, æger tamē
 suffocationis periculum in gutture persentit, Tertia
 quando gutturis partes, tum externæ, tū internæ si-
 militer inflāmantur, quarta ubi ad anteriorem re-
 gionem, cervicis vertebræ luxantur, & inde canus
 apparet locus, doloremq; quando tangitur, æger sen-
 tit. Recentiores Græci quidam ut est Paulus, lib. 3.
 cap. 27. & nostræ ætatis medici non pauci, inter Cy-
 nanchen & Synanchen, inter paracynanchen, &
 parasynanchen discrimen faciunt, quod tamen Ga-
 lenus, lib. 4. de loc. aff. cap. 5. & 3. progn. 20. re-
 prehendit. Inflammationem itaque, quæ in inte-
 rioribus faucium musculis oritur, Συνάχην nomināt
 eam uerò quæ in exterioribus eorundem musculis fit,
 Παράσυναχην, Inflammationem item, quæ in interio-
 ribus musculis gutturis accidit, uocant, Κυνάχην,
 eam autem quæ in exterioribus eiusdem musculis ori-
 tur, Παράκυναχην, vide Angina.

Cynodontes, vide Canini Dentes.

Cyphosis κύφωσις, gibbositas, seu gibborositas,
 vitium

vitium spinæ est, quod à casu ictu, & tuberculis duris, anteriorem thoracis partem distendentibus, pulmonemque prementibus, aliquando contingit, ut docet Gal. eo aph. quo scribit Hipp. gibbos ex asthmate aut tussi factos, ante pubertatem mori, uide Gibborositas; Dicitur eadem, κύρσις, ut annotauit Gal. 3. de artic. opposita huic contorsio, dicitur Lordosis, Λόρδωσις spinæ vertebris in anteriorem partem conuersis, uide Lordosis.

Cyrtoſis, uide Cyphosis.

Cyrroma, κύρσιμα, tuberculum in Iljjs appellauit Hippoc. quod & œdema ab eodem appellari solet, 2. progn. 25.

Cyſſaros, κύσσιρος, est vltimum intestinum in ordine, quod & rectum dicitur, & podex est, lib. quod animal sit, id, cap. 5. uide Rectum.

Cystis, κύστις, vesica, est pars membranosa, vrinam à renibus excipiens, & foras excernens, exanguis, quæ & si ex nullo neruoso corpore originem ducat, quia tamen latissime distendi, & artissime contrahi potest, ut reliqua omnia alba, & exanguia, ex quadam similitudine, neruosa dicta est, icet in eam neruuli quidam inserantur; In qua renes, tanquam in lagenam vrinam deponunt per meatus vretes dictos, qui à renibus prodeuntes, obliquo itinere delati inter ipsius tunicas, paulo supra ipsius os, inseruntur; Cuius vesicæ cervicem musculus ambit, transuersis constans fibris, quibus vnde quaque constrictis, ne

sicam claudit, ne vrina effluat.

Cystis choledocos, quæ, & vesica fellis, & vesica bilis susceptiua, Græce autem νύστις χοληδοχος, dicitur, vesica est, ad Hepar sita, in canis ipsius, inter venę portę & canę radices, bilem, ex iecinore attrahens, quam rectis fibris, trahit ex hepate, obliquis retinet, transuersis uerò expellit, quæ & ob id, fellis folliculus appellatur, 4. de vsup. cap. 12. & 2. de natural. fac. cap. 9. & 9. de anatom. adm. cap. 2.



D



DACTYLION, πρῶτον τῶν δακτύλων, idest podex, 1. de comp. med. loc. cap. 15. sunt autem qui rectum intestinum eo nomine intelligant.

Darsis, idest, excoriatio qua cutis à subiectis partibus scalpello deciditur, 3. de anat. adm. cap. 2.

Dartos una est è quatuor mēbranis, quæ testes inuoluunt; earum prima & intima Epididymis, post eam Erythroides, idest vaginalis, tertia Dartos carnosus, Erythroide multo valentior, quarta & extrema Scrotum est. Introd. cap. 11. Mulierum autem testes, penitus in vulua latentes, vnica tantum tunica contenti sunt, quę Dartus appellatur, pro portione respondens tertię testium marium tunicę, cæteris autem carent. de dissect. vuluę, cap. 9.

Dasympma, oculi vitium, idem quod Trachoma, ut scribit Aetius, lib. 7.

Dearticulatio, ea est ossium naturalis coniunctio, quæ

quæ euidentem motum habent, ut coarticulatio naturalis ossium est commissio, quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præferunt 2. de artic. 8. & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quæ statim ipsum subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium, 1. cris. 3. vide Principium.

Decrescens febris, vide Continua.

Decretorius, siue Indicatorius dies est, in quem plurimum iudicii tempus incidit, 1. de dieb. decret. cap. 3. Est adhuc alius dies Indicatorius incidens, in quo imperfecte solent fieri iudicationes, ut tertia quinta, sexta, nona, 3. progn. 1. Decretoria autem signa sunt, quæ salutem aegri, per crism futuram ostendunt, 1. cris. cap. 7. Incidentes uerò, siue Intercidenties dies differunt à Indicatorijs, & decretorijs, cum eorum natura, tum usu; Natura quidem, quod naturæ suæ ratione Indicatorij perfecti sunt, omnibus si quidem rite factis sola natura sponte agente, in ijs crises fiant, hi autem dies sunt, qui quaternario, & septenario diuiduntur; Intercidentes autem minus perfecti sunt, & in eos, non nisi aliquo errore interueniente, crises incidunt, vnde non ui naturæ, sed morbi malitia, aut aliquo extraneo impellente, in ijs crisis accidit. Atque hinc est ut à non nullis, dies prouocatoriij nomenclentur, quod in his natura ad pugnam irritata, insurgat. Usu adhuc differunt, quod ad futuri vigoris, & iudicii cognitionem, quaterna-

riorum circuitus sufficiunt, ad crīsim verò iam factā discernendam, num scilicet fida, aut infida sit, inter eidentium cognitio, conducit.

Deficiens pulsus est, qui admoventi digitos, videtur exolutus; & tenenti applicatos paulatim prorsus desinit, 2. de caus. puls. cap. 3.

Deficiens decurtatus *μυωγιστὼν ἀφυγμὸς*, pulsus est, qui et mutilus, & decrescens pulsus dicitur, qui perpetuo diminuitur, nec minui desistit, ad quietem denique prorsus recidit, motuque deficitur; qui pulsus si iterum redit, & de integro augetur, decurtatus reciprocus dicitur, 1. de differ. puls. cap. 11. quod si in eo nulla seruetur equalitas, motuque ipso frequenter deficitur, deficiens inequalis appellatur, 2. de caus. puls. c. 12. nomen autē Graeci à figuris, quae in acutum desinunt, & à Cauda transtulerunt, huiusmodi autem pulsuum inaequalitas, systematica, idest collectiua dicitur.

Duglutitio, *ναρἀνοσις*, est cibi, potionisque ab ore in ventriculum descensus, larynge simul sublata, sursumque in tantum corrente, quantum Gula deorsum trahitur.

Deiectiones, et subductiones solet Hippoc. vocare, excrementa per aluum exeuntia, 7. apho. 64. syncera autem deiectionis est, quae unum tantum humorem, ceteris impermixtum habet, 2. prorrh. 15.

Deleterium, quod & Phtharticum, & Phthoropæum dicitur, letale venenum est, quod ubi in animalis corpus ingressum fuerit, totum id momento temporis

poris immutat, sibi que simili affectione alterat, 1. de semin. cap. 16. quod si etiam alexipharmacum medicamentum ultra modum exhibitum nos interficiat, vel parum assumptum sanet, non ob id deleterium censendum est, quod quocunque tempore, loco & quantitate sumptum, aptum est interficere, com. 6. in 6. de morb. vulg. 5.

Delirium, Desipientia, *μαραρρολον*, mentis alienatio, duobus modis dicitur, generaliter et speciatim; generaliter est motus errans et deprauatus facultatis imaginatricis, aut ratiocinatricis, plerumque in utraque facultate consistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando, aliquando uerò in altera tantum facultate, ut exemplo illustrat Galenus, lib. de sympt. diff. cap. 3. atque hae tum maxime sine febre est, 1. prorrh. 1. & 4. insanire omnes dicunt eos, qui citra febrem desipiunt, & subdit, omnes qui mente lesi continuè fuerint, Phrenitici vocantur, sola febre ab iis, qui deliri appellantur, discrepantes. Speciatim uerò significat mentis alienationem cum febre, à phrenitide differens quod haec fiat Cerebro primario affectu laborante, cum symptomatum magnitudine & vehementia, Delirium autè eiusdem febris symptoma est, atque ex subiectis Cerebro partibus originem ducit, sublato in caput acris, & feruenti biliosi sanguinis vapore, neque impetus tantos habet, quantos Phrenitis, 5. loc. aff. 4. vide Phrenitis & Paraphrosyne.

Deltoides, quasi *deltae* literę figuram imitans, musculus est, qui superiorem humeri partem, qua brachij caput est, tegit, qui etiam totius manus initium est, 3. de anat. adm. cap. 3. Graece $\Delta\epsilon\lambda\tau\omicron\iota\delta\epsilon\varsigma$ sic dicitur, quod triangularis videatur, ut in Δ similitudinem efformatus.

Deneruationes ($\alpha\pi\nu\epsilon\nu\epsilon\omega\varsigma$ Graeci uocant) sunt nerueę musculorum tenuitates, in quas musculi desinunt, & *Tendones* dicuntur, 1. de motu musc. cap. 1. & 1. de anat. adm. cap. 3. vide *Tendones*.

Dentem, sepe *Hippoc.* secundam colli vertebram uocat, propterea hunc processum à dentis similitudine, *odon* idem, idest, dentiformem appellat, lib. de oss. cap. 8. alij *Pyrinoidem* productionem à nuclei similitudine nominant, 12. de vsup. cap. 7.

Dentes in ossium numero reponuntur, mollium Cerebri neruorum participes, ob idq; soli sentiendi uim habent euidentem, lib. de oss. cap. 5. priores quaterni, quia secant, *Tomi*, idest, *Incisorij* ad cultri similitudinem, ad eos cibos incidendos, qui molliem in se habent; utrinque *Canini* adiacent, quod *Canum* dentibus sint quàm simillimi, ad dura cibaria non secanda, sed admodum confringenda. Ultra hos, *mamilares* & *molares*, ab utroque latere, quod ijs cibi (ueluti molis cereales fruges) tenuantur, & atteruntur, ibidem.

Dentes genuini, qui omnium nouissimi nascuntur $\alpha\pi\phi\epsilon\gamma\epsilon\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ ess, ut plurimum ab anno duodenigesimo, usq;

vsq; ad annum vigesimū sextum, nisi aliquādo sunt, etiam anno octogesimo nasci, utrobique singulares, penitissima oris parte oriuntur, ideo quæ ita nominantur, quod nascantur, cum homo sapere incipit; sunt autem è genere dentium molarium.

Dentifricium medicamentum est, quo utimur ad dentes confricandos, & gingivarū circūsitārum, contactū, quando humore fuerint prægnantes, 5. loc. aff.

Dentitio, *ἰδοντίασις*, est dentis iam concreti, extra gingivam eruptio, seu dentium ortus, 8. de placit. c. 6.

Depascens vlcus, idem est ac Phagedæna, vide Herpes, Phagedæna.

Deperditio, vide Aborsus.

Deprehensiones, vide Catalepsis.

Depressum & oblongum est ossis caput, ad cervicem in ipsum cui adnascitur, referentes, lib. de ossib. in præmio.

Derivationem appellare consuevit Hippo. quando succus aliquis euacuationis indiget, neque per convenientem regionem ferri inceperit, neque tamen ualde procul à conuenienti, neque ad remotissimum locum, ut si per lotij vias exire ceperit, vitiosa vesica, aut renibus; tunc enim per alium deriuare satius fuerit; veluti si per ventrem vitiatæ intestinis ferri tentauerit; Contra enim in istis succum euacuandum ad vrinarios meatus dirigemus; In mulieribus verò non nunquam ad vterum, aut è contrario, interdum vteri profluvium, ad vrinae vias ac ventrem deriuabimus.

bimus. At si in aliqua id genus euacuatione uomitū citauerimus, reuulsionem hanc nominant, ut si uomitus etiam retraxerimus, ad uterum aut vesicam, aut sedem incitantes, com. 2. in 6. de morb. vulg. 7. Deriuatio Græcis *παροξέσεις*, eiusdem est generis, cū euacuatione facta per particulam, quæ fluxionem suscipit; sit autem per aliquam vicinarum partium; Ri-uare igitur est, per riuos ducere, deriuare autem est, à rinis ad latera diuertere. Ex Oribas, lib. de Cucurbitulis, vide Purgatio.

Derma, vide Cutis skprema.

Desipientia est, cum ægris loquentibus, & agentibus, nihil rationi consentaneum dicunt, 7. aph. 14.

Desipientia ferina est, in quā ægri calcitrant, pedibus feriunt, mordicus impetunt, & excandescunt, eos qui ingrediuntur, tanquam hostes reputantes, com. 1. in 1. prorrh. 25.

Deficcatio oculi, est idem ac spasmus oculi, lib. de ocul. cap. 13.

Desperata vlcera sunt, quorum curationem plerique aggressi non absoluerunt, sed tanquam ab insaniabilibus, destitit, 4. de comp. med. per gen. cap. 5.

Destillatio, idest fluxio quælibet, quæ per venas à Capite ad partes inferiores fertur, 3. aph. 12.

Desudatio ab Hippoc. sumitur, uel pro sudore circa Thoracem, & caput apparente, uel pro eo qui toto manat corpore, ubi tum paucus, tum nihil conferens, fuerit, com. 3. in 1. Prorrh. 33. quæ, & sudamina di-

na dicuntur, vide Sudamen.

Detritio, vide Rhacosis.

Deurens febris, vide Continua, & Synocha.

Diabetes est urinae profluvium, hydrops matelle, Dipsacos, Hydrops in vas urinale, Diarrhæa in urina διαβητης; ὕδρεος εἰς ἀκροῖα; εἰς οὐρὰ διαρροία; διψανός; Synonima sunt, quae significant, cum exuberanter per urinam redditur, id quod bibitur, eo à sua qualitate non mutato, 6. de loc. aff. cap. 3. de sympt. diff. cap. 6. passio hæc talis est, qualis circa aluum lauitas intestinorum, extinctio, ut diceret quispiam utriusque virtutis, & retentricis, & alteratricis, 1. de cris. 12.

Diabotantum emplastrum, idest ex herbis factum, 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Diabrosis siue Anabrosis, διαβρωσις, καὶ ἀναβρωσις, erosio; est oris alicuius vasis apertio, 5. loc. aff. 5. à re acri & mordaci facta, siue intrinsecus à vitioso succo, siue extrinsecus à valentioribus medicamentis, aut igne.

Diachylon διαχυλῶν emplastrum, quod ex succis est compositum, 7. de comp. med. per gen. cap. 9.

Diatodion, confectio est, ex capitibus papaveris, 7. de comp. med. loc. 2.

Diadosis διάδοσις, digestio seu distributio alimenti est, cum per venas maiores in minimas, ipsumque corporis habitum transit, vide Anadosis.

Diæta, victus ratio, est certa victus institutio & norma, non in solo cibo & potione consistens, verum
in omni-

in omnibus alijs, otio, exercitatione, Venere, somno, vigilijs, repletionem, inanitionem, animi affectibus, atque alijs omnibus, quæ quovis modo fiunt in humano corpore, ad Thrasiolum, cap. 35. Inde disciplina quæ hanc instituit dietetica διαίτησις, dicta est, pars artis medicæ curatiuæ, tum quæ sanis ad imminentes arcendos morbos, tum quæ ægris ad præsentis profligandos, debetur, 11. meth. cap. 15.

Diagnostica signa sũt præsentium rerum, & morborum declaratiua, lib. de opt. sec. emp. cap. 5. vide Prognostica.

Dialemma, est illud intervallum, quo febris ad infabricitationem venit, antequam sequens annotatio adueniat, lib. de morb. temp. cap. 3.

Diapedesis διαπιδυσις, est exiguorum vasorum apertio, vel seri non sanguinis excernendi species, 3. de caus. sympt. cap. 2. fit autem ex tunica rarefacta, sanguine uerò tenuato, & ex gracilium vasorum ore adaperto, unde transcolatur sanguis sine sudoris, aut roris more transmittitur, 5. meth. c. 2. differt ab anastomosi, in qua tum maiorum venarum, arteriarumque ora aperiuntur, tum sanguis impetu, & copia erumpit.

Diaphanes Græce, Latine dicitur Lapis specularis, ex iis est, quæ leniter ac sine morfu exiccant, qui vltus vlcerebus agre cicatricem admittentibus, non item malignis ac rebellibus, conducit, 4. de comp. med. per gen. cap. 1.

Diaphoresis διαφώρεσις, Latine digestionem, seu euapo-

evaporationē dixeris, est quæ humorē qui in phlegmone obsessa parte continetur, per meatus insensibiles, educit, 13. meth. cap. 16. & medicamenta, quæ id præstant, Διαφορητικά, hoc est discussoria, & per halitum digerentia, appellantur, duplici ratione, aut humores ebibentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem, 5. de simplic. med. fac. c. 5.

Diaphrattontes membrana, Διαφραγόντες ὑγρές dicuntur membrane illæ, quæ totum thoracis spatium, à iugulo ad septum usque in duos sinus, dextrum, sinistrumq; diuidunt: vulgo mediastinum, vocatur; unde Hypezochotes, Cingentes.

Diaphragma, septum transversum est, quod & Phrenas idest mentem appellarunt antiqui (quia, ut aliqui putant,) eo inflammatione affecto mens lædatur, nā multi quidem varios ob morbos delirare solent, sed quæ eo affecto incidunt deliria, non multum distant à Phrenitide; nulla enim pars Cerebro subdita præter septum transversum, perpetuū delirium excitat, itaq; maximus illi videtur esse cum mente consensus. A Platone Diaphragma vocari cœpit, idest septum transversum, est enim musculus rotundus, obliquus, membranofus & carnosus, medius inter partes alimento seruietes quas peritonæum continet, & inter spiritus organa, quæ tunica succingente concluduntur, eamq; ob rem diaphragma nominatur, quod eas partes Διαφραγῆται, idest, diuidat quasi septum quoddam medium, qua ratione Aristoteles illud succincturam
appel-

appellat, 5. loc. aff. 4. maiores nostri præcordia nominarunt, com. 1. in 1. progn. 24.

Diaphthora est corruptio ciborum in ventriculo, 2. loc. affect. 1.

Diapyemata, vide Empyemata.

Diaria febris ἡμερησία πυρετός, Ephemera febris est, quæ unica accessione, unoque plurimum die, ex ipsius saltem natura circumscribitur, à causa manifesta orta, 9. meth. 1. in spiritibus accensa, quam excitant causæ, alijs febribus communes (præter spirationem et putredinem) ira, dolor, vigilia, cura, estiuus sol, fatigatio, Bubo, pertinax studium, cruditas.

Diarrhœa, διαρροία, idest profluvium, copiosior est alui fluxus, sine phlegmone, & ulceratione aliqua, lib. finit; quo vel pituita, vel bilis altera syncera, aut inuicem mista vacuatur, ab humoris copia vel cruditate, quæ aut in toto corpore, aut in certa quadam parte sedem habet, exorsum; Ventriculus enim multitudine grauatus, quam vel ipse colligit, vel ex alijs se se in eum exonerantibus suscipit, aut praua aliqua qualitate irritatus, quæ cruditas (quæ propriè διαρροία dicitur,) inuexit, τῇ διαρροίᾳ infestatur, præsertim si eius orificium, supernæq; partes valentes sint, infernæ autem languidæ, nam si contra acciderit, uomitiones pro diarrhœa succedent, ut docet, Gal. 3. de natur. facult.

Diarrhœa in Urina, vide Diabetes, & Canina Cupiditas.

Diarrhœa

Diarthrosis, vide Articulus.

Diaspermaton medicamentum, idest ex seminibus constans, 7. de comp. med. per gen. 7.

Diaspoleticum medicamentum est, cuius compositionem, cuminum, piper, ruta ingrediuntur, 4. de sanit. tuen. cap. 5.

Diastole est motus dilatationis & eleuationis arteriæ, ad substantiã quandam exterius attrahendã, quo natiuus totius animalis calor, per immissum spiritum refrigeretur, quemadmodum Systole est arteriæ submissio & contractio, ut id quod ex humorum deustione in toto animali contractum, ueluti fumida superfluitas est, expellatur, lib. de usu pulsuum, c. 3. ut eundem usum præstet Diastole, & Systole, totius animalis calori, quem inspiratio, & exspiratio, particulatim calori Cordis, ibidem.

Diateßeron emplastrum, quod ex quatuor rebus constat, Chalcitide, misy, diphryge, Chalcanti, 5. de compos. med. per gen. cap. 14. Διατῆσάρον Græce.

Diatrion pipereon, idest, medicamentum, triplici piperis genere constans, 4. de sanit. tuen. cap. 5.

Diatriton, idest tridui inedia, ut Diatritarj, qui tri duanam inediam præcipiunt, 4 meth. cap. 4. cuius pri mus autor Thessalus, Διατρίτων Græcis.

Dichophyia, pilorum defectus est, quando bifurcantur, lib. finit.

Dichroma, (Διχρόμων Græce) emplastra sunt quæ & Gilua dicuntur, coloris ambigui, 2. de compos. med.

med. per gen. cap. 1. sunt enim quaedam medicamenta, quae fulva vocant, quib⁹ ubi statim reponuntur, quaedam extrinsecus super eminentia fusca concrefcit, sub qua pars medicamenti profundior, plusquam ab initio fulva videtur, propterea dichroma vocant, idest bicolora; quidam verò eadem vocant, Diprosopa Διπρόσωπα, idest bifacia, 2. ad Glanc. 8.

Dicrot⁹ pulsus, Αιγοτος σφυγμός, seu bis feriens, est cū recessio, quæ creditur arteriæ, nō perfectæ obitur, sed cunctatur, idque pro subductionis, aut inhibiti spiritus quantitate, deinde repetitio perfectæ, debitæ fit contractionis, lib. finit. Estq; vnus pulsus, non duo (contra Archigenem,) qui simul atque omnem distentionem effecit, se paulisper subducit, ac mox pulsatur iterum, ut intermittentium quies media ictus intercipiat, cuius dicroti contractio, congressus vel reditus dicitur, 1. de differ. puls. cap. 17. qui post absolutam diastolen, antequam perfecte contrahatur, secundò tactum ferit, ut ex malleis incudem percutientibus, & postea resilientibus, apparet.

Didymus, idest, testis ipse, 14. de vsup. cap. 14. Διδύμοι, dicuntur propriè fratres vno partu editi, dicuntur et testes, honestiore uocabulo ut ait Galenus; dicuntur & Διδύμοι in Cerebro, de quib⁹, uide Glutia.

Dies in hoc significatu apud Medicos accipitur, ut non solum lucem, sed etiam noctem complectatur; nō id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur, appellantes diem, sed etiam illi tempus noctis adiecentes,

tes, 2. de cris. cap. 2. *Δυσεντερία* dicitur.

Difficultas intestinorum, quae & *Δυσεντερία* dicitur, 2. de facul. nat. cap. 9. propriè ulcus intestinorum est, ex mordaci bile, quā sequitur interaneorum abrasio, cum quibus paulum cruoris secernitur, 6. de loc. aff. cap. 2. in quibus difficultatibus intestinorum, cum adhuc constituuntur, quaedam corpora pingua excernuntur; post hæc autem nisi finire anticipauerint, quedam ramenta intestinorum, ablata ipsarum superficie interiore, quæ membranosa existit & densa, illi quæ cutem exterius contegit, Epidermidi, idest cuticulæ appellatæ, proportionalis; post hæc autem aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum, sed iam completam dicimus; excernuntur enim partes magnæ intestinorū, quas & carnes & carunculas vocare possumus, 4. aph. 26. Talis quippe propriè dicta Dysenteria est, nomen habens à læsa particula, quam solum plerique dysenteriam nominandam censent; et sicut Hippoc. atque alij, non ipsam modo intestinorum exulcerationem, uerum omnem cruoris per intestina vacuationem, Dysenteriam nominent, nomen morbi, symptomati tribuentes, 4. de artic. 40.

Difficultas vrinæ, vide Ischuria.

Difflatio & Difflatus. Quicumque in Hippocratis placitis legitime versatus fuerit, is demum didicit eius, quam medici omnes vſitato vocabulo, sensum latentem transpirationem appellant, qua difflantur corpora, aliam quidem talem esse qualis vapor est,

I aliam

aliam autem qualis aër siccus, atque aliud esse, cum
quæ videri possunt, exeunt humiditates. *Aduersus*
Lycum, cap. 2. quæ Græcis λόγῳ θεωρητὴ διαπνοῇ,
& ἀκλὸς αἰσθάνει διαπνοῇ, hoc est perspiratio, &
diffusus, qui ratione comprehendatur, & transpira-
tio sensu imperceptibilis appellatur, quæ calidiorib',
temporibus, regionibus, ætatibus, naturis, diætis,
multa est, non parua substantiæ nostræ portione per
διαπνοὴν, exhalante, ut cōtra in frigidioribus pauca,
propter cutis adstrictionem; vide *Inspiratio*.

Digiti, δαυῖλοι, quinque sunt in omni manu, pri-
mus Pollex, quod oppositus cæteris quatuor digitis
æquipolleat, ἀνίχῃρα, hoc est promanum, tanquam
pro tota manu esset, vocarunt; Hippoc. μέγαν hoc est
magnum nominat, quamuis parvus sit, quia cæteri
sine eo fere inutiles sunt, apud *Arist.* 4. de part. ani-
mal. cap. 10. Magnus Galeno dicitur, non solum vi-
ribus, sed & magnitudine, nam principium pollicis
ut ait, propè radium est, adeo ut eum fere attingat.
Celso, & *Aristoteli*, viribus tantum magnus dicitur;
secundus λιχανὸς, index, tertius μέσος medius, quar-
tus παρὰ μέσος, annularis, medicus à medicis appella-
tus, quintus μικρὸς, minimus, auricularis, omnibus
alijs corpore & viribus inferior; Singuli terna ossa
continent (præter pollicem) mutuò sibi colligata, &
ordine sibi succedentia, veluti in acie, vnde & φα-
λάγγες à Græcis appellantur, ab alijs autē Σκωτάλιδες,
à turma equitum, quam Græci Σκωτάλην vocant, La-
tine

tini communi vocabulo, digitorum internodia dicere solent.

Dignotio est præsentis morbi, præcognitio verò est futuri morbi cognitio, 3. cris. cap. 1. dignotionem autè proprio nomine dinotationē appellamus, 1. progn. 5

Dimotio, vide Prolapsiones.

Dipsacos, vide Diabete.

Diprosopa, vide Dichroma.

Discissiones, magna vulnera solet Hippocrates appellare, quae letalia sunt, ut vulnus in Cerebro, cum ad aliquem eius ventriculum peruenerit, 6. aph. 18.

Discretina, Medicinæ pars est ea, quam significantiam recentiores vocant, Græci σημωτικὴν, 1. de his quae in medicatr. 1.

Dispersus morbus, vide Communis.

Dissimilare membrum, heterogeneum seu compositum est, cuius quamcunque partem assumpseris animalis, toti communicans non erit nomine uel definitione, sicut manus & facies, lib. anatom. viii. uide Instrumentale.

Dissidentias vocat Hippoc. cum ossa, quæ natura coherent, ac se se mutuò contingunt absque articulo, ob aliquam lésionem dissident à se ac distant, ut Cubitus & Radius in brachio ad gibbum, & ad manū; In Cruce Tibiam, & Suram, qua, & Genu, & Calcii committuntur, com. 3. in medicat. 31.

Dissolutiones vocant, animi defectus, Græci λυποβομιαν, vocant, 1. Glauc. 14.

Distentio, idem est, ac neruorum conuulsio, quæ est triplex, opisthotonos, idest tentio ad posteriora, Emprosthotonos, idest tentio ad anteriora, & Tetanos, idest, æqualis tensio, 4. aph. 57. qui Tetanus est per vniuersum corpus neruorum conuulsio, 3. loc. aff. 10.

Distorsiones sunt, cum uel à sua sede dilabitur aliquid in exteriorem corporis partem, uel introrsum in inanitatem aliquam prolabitur, ut in naribus, si in exteriorem partem, aut os, aut pinnula earum abiit in eam partem, si in foramen descendit, introrsum distorsio fit. 2. de ijs quæ in medic. 33.

Diuretica pharmaca Διουρητικά φάρμακα, medicamenta sunt, quæ ad ciendas vrinas accomodantur, quæ & Vretica dicuntur, 11. meth. 16. & 5. simpl. 20. quæ diuisum sunt generum, aliqua enim mediocriter id præstant vt Eccathartica, idest, poros expurgantia dicuntur, calida & tenuium partium; alia uehementius, vt quæ plurimum mouent vrinam, quæ magis & siccant, & excalfaciunt, prioribus.

Diuturnus morbus est, quicumque acutorum ex decidentia, terminum prætergreditur, quem nunc quadragesimum, nunc sexagesimum diem Hipp. facit, 2. dieb. decret. cap. 12.

Dodecadaetylon, siue Duodenū intestinum Δωδεκαδάκτυλον, primum est intestinorum fundo stomachi alligatum, à longitudine duodecim digitorum sic appellatum, 6. de anat. adm. cap. 9 quod quidam non dignantur vocare intestinum, priusquam in anfractibus orbesq;

orbesq; conuoluatur, sed ipsum *ἐν πύθω*, idest, productionem simpliciter, vel cum appendice productionē duodecim digitorum, *ἐν πύθω δωδεκάδακτυλον* nominant, primumq; intestinū in ordine dicant esse ieiunum, ibidem, cap. 12. hoc idem Duodenum, uocant Portinarium, lib. de anat. uiu. In id meatus inseritur, à vesica bilē continente, per quem ea in ipsum expurgatur.

Dolor *ἰαλνῦ*, tristis sensus est, ut uoluptas blandus, 2. loc. aff. 2. qui si per inflammationis fiat affectus, atque in corporibus sensibilibus, vel per se, proprio & primario affectu, in arterijs, vel reliquis partibus sensibilibus omnibus per consensum, eo quod à uicinarū contactu premantur, pulsatorius, siue pulsatiuus *ὀφυσματώδης ἢ σφυγματώδης*, dicitur, 2. loc. aff. 3. si verò in aliquo uiscerum, circumambiens membrana, per quam neruus dispergitur, à tumore præternaturam extendatur, ita ut grauitas quaedam sentiatur, dicetur sensus, seu dolor grauis *βαρὺς*, aut grauitatis, ibid. cap. 4. quae partes si inflammatae sunt, unico doloris modo uexantur, tensiuo *τενώδης*, siue extensionis; Qui verò in membranis fit, ipsius affectus ueluti radice, eo loco fixa, ubi membrana purgatur, qualis est in morbo laterali, dolor punctorius *σφυγματώδης* dicetur, ibid. cap. 5. si neruis ipsis primò accidat, dicitur dolor *γλυκὺς*, stupidus, 2. loc. aff. c. 2. Quod si lateribus, spiritus quidam flatuosus procreatur, qui tum extenuatus, tum discussus dolorē se-

dat, deinde rursus procreatus alter, dolorem augeat, dolor ἀγῶς, rarus dicitur, cō. 1. in 1. prorrh. 22. Dolores aut ulcerosos, tū Medici, tū Gymnastæ uocāt, eos per quos, inter mouendum, uel tangendum lassatas partes, sensus ueluti ulceratarum partium ἐστονόπος, percipit solet, 2. loc. aff. 7.

Dorsum, quod Græci Νῶτον καὶ Ἀνίστηγον, & Μεταφρέον, appellant, est omnium uertebrae quos spondylus uocant structura; Nō nulli tamen ex recentioribus medicis, non totam uertebrae structuram, spinam appellandam censent, sed circa thoracem tantum & lumbos, non circa collum, 3. de artic. 1. Aristoteles uerò, 1. de histor. animal. Dorsum dicit esse totam posteriorem corporis partem, ob occipite usque ad extremum Coccygem, triginta quatuor uertebrae (si modo ossis sacri partes, uertebrae annumerentur) compactam: quod dorsum conficiunt, collum, thorax, lumbi, os sacrum & Coccyx, in quo costæ uelut in carina trabes, connectuntur, totumque corpus stabiliunt. Sed aliter Galenus lib. de ossib. cap. 7. his uerbis, spina est tota connexio, uiginti & quatuor uertebrae à Capite usque ad os sacrum, ita ut septem primæ à Capite uertebrae Collum siue Cervicem constituent; duodecim quæ sequuntur, Dorsum, cui à parte anteriori respondet pectus, quinque reliqui lumbos, os in quod omnes uertebrae finiuntur, sacrum, uel latum dicitur, siue etiam os magnum, 12. de usup. cap. 12. vide Spina.

Dothien Δοθίλιν, idest Furunculus, 2. meth. 2. vide Furunculus.

Dracunculus, Δρακύντιον, est ulcus, quod à parte propinqua, ad ipsum nervi dilatationem habet, dictus quod nervus mouendo corpore in ulcus recedat, in eoque occultetur, lib. finit. uide quid scribat Aëtius ex leonida, de dracunculo.

Dropax, Δρώπαξ, est medicamenti forma quædã, interdum liquidioris in modum malagmatis, interdum siccioris, emplastri modo, prout usus exigit; cuius materia eadem est, quæ Acopis, & emplastris debetur. Est autem dropax duplex, simplex alius, qui & πικρώσις, hoc est, picatio appellatur, sola pice arida, oleo liquata constans; Compositus est, cui præterea adiunguntur alia ad diuersos usus; In hoc genere est illud medicamentum, quod Græci Ψιλλώθεον, idest, depilatorium uocant, quod & Dropax dicitur.

Drymea medicamenta, idest, acria, quæ nequitiam humorum extinguunt, lib. de dynam. in præmio.

Dulcia ulcera, quæ Græci ὀχθῶλη, idest Verrucosa ulcera sunt, quæ callum contraxerunt, & pretumidas ac duras oras habent, 4. de cõp. med. per gen. c. 12.

Duodenum, uide Dodecadactylon.

Dura mater, uide Membrana dura.

Durum Σκληρόν, Medicis est, quod repletionem, largum & superfluo humore, aut uapore in partem aliquam affluente, tactui renititur, nec cedit sponte (aliter ac Philosophis) & propterea quod ita durum est,

proprie *αυτίλον*, hoc est renites appellatur.

Durus pulsus, uide Mollis.

Dyonisisci, sunt offee eminentia, quae propè tempora nascuntur, dicuntur autem cornua, detorto à Cornigeris animalibus nomine, lib. finit.

Dyplasiasmus, idest, duplicatio, quae est duorum musculorum, qui ab ipsa scapula excipiuntur, ad exteriora, posterioraque membrum circum agunt, amboque simul agentes, brachij circumductionem efficiunt, lib. de muscul. dissect. cap. 18.

Dyploës, secundalamina Caluariæ, 6. meth. 6.

Dyprosopa, uide Dichroma.

Dypsacōs, uide Diabete.

Dysesthesia, idest sensus difficultas, est uitii actionis sensitivæ diminute, lib. de sympt. diff. cap. 2. *Δυσαισθησία*, sic *Δυσκίνησις*, non modo difficultatem motionis, sed etiam immobilitatem significat, de sympt. differ. cap. 2.

Dyscrasia, Intemperies. Est mistio inæqualis quatuor primarum qualitatum, ubi enim illæ ita coierint, ut earum pares sint uires & portiones, temperamentum emergit exquisitissimum, quod ceterorum omnium norma est; ab eo quodcumque desciscit, intemperies dicitur, tunc enim aliqua qualitas exuperet, necesse est, uel due.

Dysenteria, uide Difficultas intestinorum.

Dysepulota, uide Cacoethe. (vsup. c. 15.

Dyspathia, hoc est ad patiendum difficultas, 1. de

Dyspepsia

Dyspepsia, uide Concoctio.

Dysphonia, idest uocis difficultas; ut Aphonia, eiusdem abolitio, de sympt. differ. cap. 3.

Dyspnæa, difficultas spirandi, uel inordinata spiratio, 2. meth. 2. & 1. de difficult. respir. cap. 1.

Dystherapeutica ulcera, idest curatu difficilia, 6. de compos. med. per gen. cap. 1.

Dystichia, est alterius pilorum ordinis in genæ margine exortus, præter naturam, lib. finit.

Dysthymia, idest maestitia melancholica, 6. loc. aff. cap. 1.

Dysuria, Δυσουρία, est urina difficilis, uel cum dolore excretio, siue utrumque symptoma, siue alterum tantum adsit, Dysuria dicitur, 7. aph. 48. uide Ischuria.

Dytriachisis oculi morbus est, cum pilis naturalibus alijs subnascentes, ipsum pungunt, fluoremq; coarctant, lib. Introd. cap. 15.



E



ECVOLIÆ, Εμβολία, pharmaca, idest abortiua medicamenta; quæ abortum faciunt, quæ & Εμβόγια appellatur, eadem & fœtus demortuos extrahunt, uide Aborsus.

Eccathartica, quæ et Ecphractica, uide Rhyptica.

Ecchymoma, (quæ Græcè Εγχύμωμα ἢ Εγχύμαον, idest sugillatio,) est affectio circa cutem; cum tenuibus in ipsa uenis contusis; sanguis per fissuras effunditur, non dum in grumos coactus, sed postquam per

Per.

Persultationem, idest Diapedesim, effusio ipsa facta est, contingit sane aliquando, ubi ita coierit temporis progressu lineescere, & denigrari, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes, sanguine coactis, 2. de comp. med. loc. cap. 1. & 4. meth. 1. eandem vocat Ecchymosin, idest solutionē continuitatis cum contusione, & ruptione. Generatim verò Hippoc. solitus est vocare Ecchymoses, ex vasculis effusiones, & inanitiones & alio nomine *ναυοίωσις*, com. 2. in 6. de morb. vulg. 9. quae effusio, in phlegmone quoque fit à causa interna, ubi sanguis è vasis effunditur, & tumor excitatur, tactu mollis & cedens, distinguit tamen Gal. 6. aphor. 20. phlegmonem ab Ecchymosi, quod in phlegmone sanguis per musculorum cavitates, sola ratione contemplabiles secundum minimas sui partes effunditur; In Ecchymosi uerò in spatia effluit, quae venis adiacent. Species Ecchymomatosis sunt, Hypopion, & Hyposphagma *ὕπωπιον καὶ ὑποσφάγμα*, & sanguinis ad ungues concursus ex plaga, vide Unionis solutio.

Eccoppe, *Ἐκκοπή*, excisio. Diuisio est Caluariæ, qua os offensum refractum est, lib. finit. inde *Ἐκκοπηώματα*, medicamenta imbecillia sunt, quæ mouendi tantum stercoreis, & ea quæ in spatijs intestinorū continentur, deiciendi vim habent, non etiam ex alto attrahendi, & humores euacuandi.

Eclegma, (Græcis *ἐκλέγμα ἢ ἐκλεκτόν*) medicamentum est per sputum euacuans, quæ in faucium partibus,

tibus, phlegmone obsessis, continentur, 4. de rat. viſt. 20. ori enim inditum, ſenſim liqueſcit, & deglutitur, ad peſtoris, & pulmonis vitia; quod & alio nomine vocatur *Arteriacum*, ἀρτηριακόν, diciturque ἀπὸ τοῦ λῆχειν, idest à lingendo. Arabes vocant loch, Paulus verò, lib. 4. cap. 57. nomen tribuit medicamentis, quæ deuorantur ad lumbricos; vide *Arteriaca*.

Ecphraxis, idest pororum apertio, & reclusio, II. meth. cap. 13. Inde ἐκφρασίμα, medicamenta vocantur, quæcunque obturatione liberant facultate nitroſa & amara; opposita emplasticis medicamentis, quorum est meatus obducere, & obturare, 4. de compos. med. loc. ca. 1. quæ dicuntur alio nomine *Eccathartica*, ἐκκαθαρτικά.

Ecphysis, idest, exortus, seu proceſſus alicuius offis, uel intestini, uel uisceris, 2. de anat. adm. cap. 5. sed sine adiectione prolatū *Ecphysis* est illud spatium, quod est medium inter intestinum ieiunum, & fundum ventriculi, carens circumuolutione, lib. 5. de vsup. cap. 3. vide *Dodecadaſtylon*.

Ecphyſeſis, efflatio, ſiue exufflatio, est expiration confertim facta, 2. de motu muscul. Græcis ἐκπύνοσις, ἡ ἀθρόα τοῦ πνεύματος ἐξω πορὰ; propria est uocis materia, neque vox citra eam fieri potest; differt à simplici expiratione, tum uiolentia, tum musculis à quibus efficitur, 4. de vsup. nam et paulatim expiration fit & à solo septo transuerso, 4. de loc. aff.

Ecplexis est subitus & uehemens timor, ἐκπληξις, cuius

cuius oppositum *Pericharia* dicitur, περιχάριον, Græci vocant, quasi excessum gaudij dixeris; Scimus autem amborum occasione, plures subito periisse, 12. metho. cap. 5.

Ecpiesma, ἐκπίεσμα, caluariae in multas partes fractio, & simul ubi intrusa ossis partes, in imum decubuerint, ac membranam innixio suo premant, lib. finit. in qua profundius fracta officula descendunt, et membranam Cerebri comprimunt. Vnde *Ecpiesmus* ἐκπίεσις, est totius oculi prolapsus extra suam cavitatem, ut prominens permaneat. Differt à *Proptosis*, ἀπὸ τοῦ προπίπτω, hoc est à procidentia, quod in hac *Vnea* tantum tunica, in illa totus oculus foras erumpat, presertim ijs qui stragulantur, Athleticis, & foeminis quae prae dolore partus vehementius distenduntur, aut fluxionibus à capite in oculos tentantur.

Ecpyema, ἐκπύημα, dicitur ab Hippoc. vniuersæ puris collectio, tumore aliquo qui præter naturam est, concacto, & ἐκπονήμην, ad suppurationem perducere.

Ecrhythmus pulsus est, qui nulli ætatis rhythmo seruat, 1. de diff. puls. cap. 9.

Ecstasim melancholicam, mentis motionem, aberrationemque intelligimus vehementem & ferinam, quæ irrigante Cerebrum affata flaua bile oritur, co. 1. in 1. prorrh. 14.

Ecthlisma, est exulceratio, quæ in summa cute ex cōpressu nascitur, 2. de fract. Græce itē ἐκθλίμμα.

Ecthymata, ἐκθύματα papulae sunt per summam cutem

tem erumpentes, ab humoribus superfluis & tenuibus, ideo in cute leuiter extuberant, quod tennes humores exulcerationem potius, quàm tumorem procreent. Dicuntur & alio nomine Græce *ἐκφυματά*, neque enim harum vocum discrimen ullum comperi; eius generis sunt, tum quæ, per febres ardentes exeunt, tum uariolæ vulgo dictæ & Morbilli.

Ectoposis, *ἐκπλοήσις*, luxatio; hoc est ossium à propria sede amotio & diuulsio, citra fractionem; nec uerò id modo significat, sed etiam *ἐκἀρθρωσιν*, siue *ἐκἀρθρώμα*, apud Hippoc. ut notat Gal. in initio libri de Articulis, cuius luxationis causa alia est externa, idest, vis omnis quæ articulum loco dimouere potest, alia interna, est quæ humoris defluxio articulum præcopia, vel mollitie loco propellentis.

Ectropion est suppullulatio carnis in gena, quæ genam ipsam sua grauitate foras conuertit, causa est genæ euertende, vel caro adnascens, uel resolutio, vel cum cicatrix inducitur, lib. finit. Sed alibi. *Ectropion* idest diuersio, palpebrarum est uitium, cum exulceratis oculis, plus extra feruntur, lib. Introd. cap. 15. Est autem affectus solius inferioris palpebræ oculum contegentis, ita inuersæ, & retractæ deorsum, ut parum sursum attollatur, sed pendeat & hiet, neq; ex toto oculum integat; Quod uitium si palpebræ superiori acciderit *λαγώφθαλμον* dicunt, sed tñ *lagophthalmos* naturaliter contingere potest, *Ectropion* uerò nō nisi à causa præter naturam, & cicatrice, carnis ex-

crescentia, relaxatione, medicamento, sutura vel
vstione inartificiosa, vel senectute.

Ectrosmos, apud Arist. 7. de histor. animal, sunt
imperfectorum fœtuum corruptiones infra diem qua-
dragesimum factæ, quæ uerò intra septimum diē sūt,
non ἐκτροσμός, seu abortiones, sed ἐγούσας, idest efflu-
xiones vocat.

Eczemata, sunt pustulæ ardentes & feruidæ, dolo-
rem cientes, citra saniem; ingens enim feruor, om-
nem materiam absumit, Græcis ἐκζέματα.

Efflationes, sunt magnæ & vehementes spiritus
expulsiones, quæ per eadem instrumenta fiunt, per
quæ tussis, & tussiendo efficiuntur, quæ & efflatus
dicuntur, ab expiratione, quæ sine strepitu fit, copia
& uelocitate motus differentes, 2. de motu musc.
cap. 8. & 2. de sympt. caus. cap. 4. uide Ecphysefis.

Efflorationes sunt ulcerationes factæ in superficie
subrubræ & asperæ, de medic. fac. par. cap. 5. quas,
si noctu enascantur, Epinyctidas uocāt, lib. de tumor.
cap. 15. et 2. meth. 2. quas Celsus vocat pustulas pes-
simas colore subliuidas & subnigras albas, suo hu-
mori similes, magnitudine fabam non superantes, cū
vehementi inflāmatione & dolore, à quibus adaper-
tis sanies effluit, & exulceratio mucosa intus reten-
ta: Paulus, & Aëtius dicunt esse vlcuscula sponte
nascētia phlyctēnis similia subrubra, ex quib⁹ cruē-
ta sanies effluit, utrumque uerum est, & pustulas
& vlcuscula esse.

Efful-

Effulgescentiæ quas Græci επιλάμψεις vocāt, tum præsertim Hippoc. significant morbum puerorū proprium, idest Epilepsiam, com. 1. in 6. de morb. vulg. 5. & si alij de hoc significato contendant.

Effusio, vide Contusio.

Effusa & Nigrores fiunt, sanguine à venis effuso, nunc per tunicas contusas, nunc verò in finibus reseratas, lib. de tumor. cap. 10.

Elcos, Latine Ulcus, solutio continuitatis est in omnibus corporis partibus, (præterquam in solo osse) ab interna causa, humore scilicet vitioso acri, & erodēte, particula cui incubuit, continuitatē, siue ea caro sit, siue cutis, siue cartilago, siue mēbrana soluens. Id autem vitij ubi in os incidit, τετραδὲν appellatur in alijs verò partibus ἑλκος. Aliquando uerò Hippoc. vlceris nomine ad omnem morbum dolorificum extendit, continui solutionem eo nomine significans.

Elementa, στοιχῆα Græcis, apud medicos, sunt calidum, frigidum, humidum, siccum, ex quibus homo primis apparentibus & simplicibus, minimisque est constitutus, & in quæ vltima apparentia & simplicissima ac minima resolutionem capit, lib. finit. Adhuc elemētum appellatur minima pars eius rei, cuius est elementum; omnium enim corporum quæ gignuntur & corrumpuntur, quatuor sunt elementa, ignis, aër, aqua, terra, ut minimum intelligatur, id quod minime diuisionem suscipere potest, 8. de placit. c. 2.

Elephas (qui & Elephantiasis dicitur,) morbus est in

est, in quo naturalis faciei figura mutatur, resimatur
 nasus, labra crassa fiunt, extenuantur aures, ad Sa-
 tyrorum effigiem, lib. de caus. morb. cap. 7. ex san-
 guine melancholico primam generationem habens,
 quam affectionē cum incipit satyriasmus nomināt,
 quoniam vultu Satyris similes fiunt, aliqui uerò of-
 seas eminentias, quae in temporibus fiunt, sic vo-
 cant; In alijs autem partibus quoque fiunt tales of-
 sium eminentiæ, quas exostoses vocant, lib. de tumor.
 cap. 14. ἑλεφαντινὰ ἐλεφαντίναις, vniuersi corporis can-
 cer est, Id nominis nactum est hoc malum, quod in eo
 cutis corio Elephanti persimilis uideatur; nam ma-
 culis quibusdam ad atrum colorem vergentibus infi-
 citur, atque inæqualiter aspera, crassa, ac ueluti squa-
 mis fæda, liuens, ferinaque redditur; Nec Elephas
 quicquam (apud aliquos) à lepra Arabum differt.

Elminthes, ἑλμινθες, lumbrici, animalia sunt in
 humano corpore genita, siue in intestinis, siue in au-
 ribus, siue in uesica, siue in ventriculo, interdum
 etiam in sordidis vlceribus, quos Græci σπώγνυες vo-
 cant; sunt autem trium generum, primi generis sunt
 teretes, seu rotundi à figura quæ est secundum crassi-
 tudinem, longitudine aliquando palmares, sæpe lon-
 giores, quos vocant ἑλμινθες στρογγύλας, in gracili-
 bus plerumque intestinis consistunt, & superiorem
 ventriculum suberunt, ideoque sæpe per os eijciuntur,
 quibusdam è naribus redduntur, & plurima parte cū
 febricula, atque hoc genus pueris infantibus & pu-
 beribus

beribus peculiare est. Alterius generis sunt qui lati vocantur, ἑλμινθα πλατῆαν, aliquando νέριαις, hoc est institas à similitudine quam cum institis obtinēt, instar enim harum lati sunt, & longi, aliquando ταίνας, idest fascias vocant, quod fasciarum effigiem sua latitudine & longitudine, referant. Plinius lib. 11. cap. 33. tradit tricennum pedum tēnias ventris aliquando visas, interdum plurium. Tertij generis lūbrici sunt, qui Ascarides nuncupantur, breues ac tenues, parvis vermibus similes, qui in extremo intestino reperiuntur, qui glomeratim in multas phalanges, per sedem deiciuntur.

Elythroide membrana, quae & Erythroide, ἑρυθρὸς δὲ λέγεται, dicitur, testium est tunica, vaginalis dicta, 2. de sem. cap. 5. qua tunica & scroto fœminarum testes carent, lib. de vuluæ diff. cap. 9.

Embroche, Græcis ἐμβροχή ἢ ἐμψέγµα, medicamenti genus est, cum locis affectis, liquore aliquo humectatis, perfusisq; lanam deinceps aut linteum, eodem liquore imbutum perfundimus, imbecillius cataplasmate.

Embryon, est animal vtero gestatum, 6. de v. sup. cap. 13. licet non antea Embryon dici debeat, quam duos menses in vtero absoluerit, vide Cyema.

Emmota, ἑμμοτᾶ, medicamenta, idest linamenta sunt, vel humida consistentia, similia ijs, quae linamentis, vel linteolis excipiuntur, cerati specie, 13. metho. 5. Emmotos verò vocat Hippoc. eos, qui pl-

cus cauum & exesum contraxerunt, & suppurarūt, quod curationē per linamēta desideraret, 3. artic. 55.

E mollientia, vide Chalastica.

Emphraxis, ἐμφράξις, obstructio, est meatuum aut cavitatum naturalium stipatio, ex copia vel nitiosa qualitate, ut lentore & crassitie succorum proveniēs cuius species Gal. 12. meth. ponit στῆγνωση, & ἀύνησις. Vnde medicamentū quod suo lentore obstruit ἐμπλαστὸν, huic contrarium est medicamentum ἐνρραντὸν, quod obstructione liberat, 5. simpl. 12. vide Rhyptica.

Empirici sunt (Græce ἐμπειροὶ) qui à sola experientorum notitia procedunt, nomine ab ἐμπειρία, hoc est experientia deducto, lib. de sect. cap. 1. vnde Empirica medicorum secta, accidentium concursus, qui aegris accidunt, respicit, illorumque curationem ab experientia observat, idque nec morbo, nec causa cognita, in Introd. cap. 3.

Emphisema inflatio, quæ Græcis ἐμφύσημα, ἐμπνευμάτωσις, καὶ πνευμάτωσις, est spiritus flatusque collectio, in inanibus corporis partibus, vide fusè, infra Physis.

Emplaston siue emplasticum ἐμπλαστὸν, pharmacum est, quod meatus obducit, ut picatio, quæ imponitur pilis in totum abrasis, 1. de comp. med. loc. cap. 1. atque hoc pharmacorum emplasticorum genus, substantia terrestris est, citra refrigerationem, aut caliditatem manifestam, aut in primo ordine re-
frige-

frigerantium vel calefacientium, 4. de comp. med. loc. cap. 1. suntque sine mordicatione siccantia, 4. simpl. cap. 5. & lib. 5. cap. 11.

Emplattomena medicamenta vocant, quæ exiguis totius corporis meatibus herentia, prohibent ne quid per urinas, vel vniuersam cutim diffletur, et effluat, 8. meth. cap. 2.

Emprosthotonos, vide distentiō.

Empyemata, quæ & Diapyemata, ἐμπυεµάτα, suppurantia omnia sunt; aliqui cum in viscere tale aliquid factum est, id solum empyema nominant, & qui sic affecti empyus, alij eos solos empyus dicunt, quibus inter Thoracem & Pulmonem, pus aggregatum est, lib. de tumor. cap. 3. ἐμπύους ἢ ἐμπυίνος Greci vocant, suppuratos & purulentos, qui multum puris in capedine inter thoracem & pulmonem collectum habent, 4. de caus. puls. cap. 9. Tandem omnes quibus inflammatum viscus aliquod suppurauit, suppuratos vocant, ubi pus vniuersum constiterit, concocto tumore quopiam præter naturam, com. 1. in 1. progn. 40. & progn. 59. & 60.

Empyreuma, reliquæ sunt caloris febrilis post solutam accessionem; Intermittentium enim & putridarum febrium proprium est, ut soluta accessione supersit non nihil caloris, uel in ipsis humoribus relictis, vel in solidis etiam partibus impressi, quem aliqui febris fomitem appellant; huic contraria est, ἀπυρεμία.

Emulgentes venæ, & arteriæ quæ sint, hinc pa-

tet, vena caua vbi ex hepate primum emergit, vicinis partibus prætenues impertit surculos. Deinde ramum maximum in vtrunque renem subiectum mittit; Similiter alia duo vasa æquè magna, à maxima arteria, quæ spine incumbit, profecta, non aliter quam venæ in renes inferuntur, quæ uenæ & arteriæ vulgò emulgentes appellantur, per quas renes urinam à sanguine secernunt & trahunt, simul etiam multum bilis, ac propemodum omne id quod ipse continuerint, attrahunt, lib. de venar. diff. cap. 5.

Enarthrosis species est Diarthroseos, cum os cauum excipiens altum admodum est, caputque quod in id inseritur, oblongum, lib. de ossib. in præmio, vide Arthrodiar.

Enæmon, ἐναιμόν, est medicamentum quod glutinat, 6. meth. 2. imponiturque maxime cruentis vulneribus, sistendo sanguini, 1. de com. med. per gen. cap. 14. atque ideo & sanguinarium, & cruentis opitulans, & glutinatorium dicitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2. uide Glutinatorium, & Sanguinariū.

Encœorema, ἐναιούρημα, quod & Appendiculum quidam vocant, vide Sublimamentum.

Encanthis, ἐνκανθίς, idest inangularis, immoderatum est augmentum angulorum oculi, ut Rhœas immoderata diminutio, de differ. morb. cap. 9. est enim quidam præter naturam tumor in magnis Hirquis oculorum, quod tuberculum, non est omnino præter naturam, lib. de tumor. cap. 17. estque ut plurimum
in maio-

in maiori angulo, quam carunculam quidam chirurgi rescindentes, effluxum excrementis, ea parte aperuerunt, quem affectum Rhæada quidam appellarunt, 10. de vsup. cap. 11. Encanthis propriè angulum oculi significat, maior autem angulus qui naso est proximus, proprio nomine Rhanter ῥαντήρ dicitur, minor qui est ad tempora πτερωπιάς, Inde verò eius nomen, morbo inditum est.

Encathisma, ἐνκάθισμα, est sessio in aqua medicata, ab imis pedibus, vel feminibus, usque ad umbilicum, ita ut supernę partes non madescant, 5. de comp. med. per gen. cap. 13.

Encephalos, ἐνέφαλος Cerebrum, uide Cerebrum.

Encharaxis, ἐνχαράξις, scarificatio, est cutis & subiectę eius carnis per scalpellum sectio nō punctim sed casim facta, multis foraminibus; differt à Phlebotomia, quod hæc vno vulnere venam adaperiat, illa multis sectionibus, cutem, carnem quę diuidat.

Encherida, grumi sunt cerę modo facti in emplastris, dum liquida illis infunduntur, 4. de comp. med. per gen. cap. 5.

Enchymoma, est sanguinis & humorum, in partem aliquam natura'is effusio, per quam, & partis eius venulę replentur sanguine, & color viuידus parti inditur, ut in ira, verecundia, gaudio, somno fit, dicitur quę Græce ἐγχυμώμα ἢ ἐγχύμωσις; quę effusio si fiat præter naturā, ut in vulnere, abscessu, phlegmone, dicitur Ecchymosis, vel Ecchymoma, vide Ec-

chymoma, 2. de morb. vulg.

Enchyta, medicamenta sunt, quæ oculis instillatur, ut fœnogræci decoctum, candidum & tenue oui, lac muliebre, & quæ in hunc usum preparantur collyria, de remed. par. fac. cap. 10.

Encope, ἐνκοπή & ἀνακοπή, vide Hedra.

Encranion, vide Cerebellum, & Parencephalis.

Enema, idest infusum, quod per inferna in aluum infunditur, dicitur adhuc ἐνέχυμα κλύστις, lib. de ren. aff. cognit. cap. 4.

Endemus & Endemius morbus appellatur, quasi patrium dixeris & Vernaculum qui morbus communis est multis, qui alicui regioni superuenit & accedit, ut Epidemus & Epidemius morbus est, qui cum perniciosus non sit, tempore tamen aliquo in regione aliqua abundat, & insolescit, si enim perniciosus sit, pestis dicetur, 1. de vict. rat. 9. Morborum enim alij sporades hoc est dispersi, σποράδες, qui singulos separatim corripunt, non ab aëre, sed potius à victus ratione cuique propria exorsi. Alij communes sunt, quos Græci κοινῶς, πανόινως ἢ πανδημῶς vocant, qui sunt certi morbi & singulares, qui alicubi vagantur, & multos eque simul corripunt, causamque habent communem, ut aërem quem omnes inspiramus, vel deprauate aquae potum, aut grauem & vitiosum cibum, quem omnes pariter absorbuerint, vel tetram exhalationem, vel quid simile, quod vitari nequeat. Qui morbi communes Pancæni & Pandemi, si pa-

trij

trij sunt Vernaculi & alicuius regionis familiares, Endemi & Endemij vocantur, causamque communem agnoscunt, & communem insultum, de quibus Hippocrates, lib. de aqua aëre & locis; si verò à communi causa nati, communes tamen sunt, non tamen patrij & familiares, sed potius externi & aduentitij, sint autem perniciosi & contagiosi, pestilentes dicuntur, Græce λοιμώδεις, si uerò non pestilentes, sed pestilentibus mitiores sunt, μη λοιμώδεις, carent proprio nomine, quamquam Galenus quasi oblitus eorum quæ in præmio, lib. 1. epid. scripserat, asserat eos qui pestilentes non sunt, vocari Epidemios mutuato, scilicet, generis nomine.

Endixis, ενδείξεις, Indicationes sunt, idest communitates, scopi, & auxiliorum materia, ανδείξεις, uerò his opposita sunt, 9. meth. cap. 7.

Engisomata, instrumenta sunt, quibus in Caluaria fracturis utimur, uel ut alij, est ossis pertusio, cum pars affecta in profundum descendit, ac super illa sum os corruit, lib. finit.

Engonios, idest, angulosa brachij figura, quæ illi membro naturalis est, omnis enim cuiusque partis figura rectissima, maxime ē à dolore aliena, 6. meth. 5.

Engosomata, vide Camarosis.

Enrhythmus pulsus, cōmune quoddam genus est, ad Eurhythnum pulsum, & Arrhythnum, 1. de diff. puls. cap. 9. qui enim naturalem & optimum seruat rhythmum, ευρυθμικός dicitur, unusque est et indivisus;

qui verò non seruat, ἄρρυθμὸς, in tres diuisus differē-
tias, omnis autem pulsus qualis ille sit, aliquem ser-
uat Rhythmum, qui ῥυθμὸς appellatur, & octaua
est pulsus differentia.

Ensiiformis chartilago, vide Chartilago ensiiformis
Entera, ἑντερον, intestina; sunt corpora caua, ro-
tunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anū pro-
tensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, ex-
pellendique stercoris instrumenta, in orbem inuoluta,
fibris circularibus & transuersis contorta, ad Chyli
& stercoris expulsionem; Quorum tria superiora
tenuia sunt, ἑνταῖς, siue Ἀσθενήσαστον, νῆστις,
ἑλκων ἢ λεπτόν, hoc est, Ecphysis, ieiunum, Ileon si-
ue tenue; tria inferiora crassa, τυφλόν, παλόν, ἀπεν-
θυσμένον, cæcum, colon, & rectum; atque inde patet
& si vnum et continuum numero sit intestinum, loco
tamen, magnitudine, numero orbium & amfraetuum
euariat, senariusque resultat numerus, & 5. de usup.
& 6. de anat. adm. Vbi verò ἑντερον, in singulari nu-
mero, idest, intestinum ab Hippoc. profertur, do-
cente Gal. com. 4. in 6. de morb. vulg. apud alios si-
gnificatur Colon, per Excellentiam, ratione suæ ma-
gnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descē-
dit, & Enterocelen efficit, idest herniam intestina-
lem, apud alios verò Cæcum, 4. de usup. cap. 17.

Enterocèle, Epiplocele, & Hydrocele, sunt spe-
cies exarticulationum, in quibus magna ex parte la-
xantur artuum capita; non nunquam etiam rumpitur
is mea;

is meatus qui à Peritoneo ad testiculos pertingit, lib. de caus. morb. ca. 10. cum articuli suis sedibus excidunt aut loco tantum mouentur, aut cum omentum uel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas deuoluuntur, alterum morbum Græci Epiplocele, alterum enterocelen appellant, de differ. morb. cap. 10. præter hæc ex ambobus etiam compositum plus iusto connexum, Enteroepiplocele, iuniorum medicorum nomine appellatur, lib. de tumor. cap. 15. vide Celas.

Enthusiasmus, idest fanatica percussio, seu numinis afflatio, est velut cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ uiderint, aut si tympana, uel tibias, uel signa audierint, lib. finit.

Epacmastica, 9. meth. 4. vide Continua.

Epapheresis, idest repetita sanguinis missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores secundum aures, in agrotantibus exortas, vocat Hippoc. com. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Sed Gal. 3. de comp. med. loc. cap. 2. dicit Eparmata (quæ, & Parotides sunt) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures, affectis; Paulus cum Hippoc. non inflammationem, sed affectionem tantum dixit, ut tumor omnis siue oedematosus siue scirrhusus, citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, παρωτίς, dici potest.

Ephebeon, pubes & pecten aqualiculus latine, Græce ἐφηβειον, ἐπίκουρον, ἄβη, id totum est, quod est
ab Hy-

qui verò non seruat, ἀρρυθμὸς, in tres diuisus differē-
tias, omnis autem pulsus qualis ille sit, aliquem ser-
uat Rhythmum, qui ῥυθμὸς appellatur, & octaua
est pulsus differentia.

Ensiformis chartilago, vide Chartilago ensiformis

Entera, ἐντέρα, intestina; sunt corpora caua, ro-
tunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anū pro-
tensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, ex-
pellendi que stercoris instrumenta, in orbem inuoluta,
fibris circularibus & transuersis contorta, ad Chyli
& stercoris expulsionem; Quorum tria superiora
tenuia sunt, ἐκφυοίς, siue ἀοδῖνα δάκτυλον, νῆστις,
ἄλalon ἢ λεπτόν, hoc est, Ecphysis, ieiunium, Ileon si-
ue tenue; tria inferiora crassa, τυφλόν, παλόν, ἀπεν-
θυσμένον, cecum, colon, & rectum; atque inde patet
& si vnum et continuum numero sit intestinum, loco
tamen, magnitudine, numero orbium & amfractuū
euariat, senarius que resultat numerus, & 5. de usup.
& 6. de anat. adm. Vbi verò ἐντερον, in singulari nu-
mero, idest, intestinum ab Hippoc. profertur, do-
cente Gal. com. 4. in 6. de morb. vulg. apud alios si-
gnificatur Colon, per Excellentiam, ratione sua ma-
gnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descē-
dit, & Enterocelen efficit, idest herniam intestina-
lem, apud alios verò Cæcum, 4. de usup. cap. 17.

Enterocèle, Epiplocèle, & Hydrocèle, sunt spe-
cies exarticulationum, in quibus magna ex parte la-
xantur artuum capita; non nunquam etiam rumpitur
is meq;

is meatus qui à Peritoneo ad testiculos pertingit, lib. de caus. morb. ca. 10. cum articuli suis sedibus excidunt aut loco tantum mouentur, aut cum omentum uel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas deuoluuntur, alterum morbum Græci Epiplocelen, alterum enterocelen appellant, de differ. morb. cap. 10. præter hæc ex ambobus etiam compositum plus iusto connexum, Enteroepiplocele, iuniorum medicorum nomine appellatur, lib. de tumor. cap. 15. vide Celas.

Enthusiasmus, idest fanatica percussio, seu numinis afflatio, est velut cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ uiderint, aut si tympana, uel tibias, uel signa audiuerint, lib. finit.

Epacmastica, 9. meth. 4. vide Continua.

Epapheresis, idest repetita sanguinis missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores secundum aures, in egrotantibus exortas, vocat Hippoc. com. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Sed Gal. 3. de comp. med. loc. cap. 2. dicit Eparmata (quæ, & Parotides sunt) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures, affectis; Paulus cum Hippoc. non inflammationem, sed affectionem tantum dixit, ut tumor omnis siue oedematosus siue scirrhusus, citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, παρωτίς, dici potest.

Ephebeon, pubes & pecten aqualiculus latine, Græce ἐφηβειον, ἐπίκουρον, ἡβη, id totum est, quod est
ab Hy-

ab Hypogastrio seu imo ventre (quem & sumen vocant) usque ad pudenda: Introd.

Ephelcis, idest ramentum, seu cruoris exigua guttula, quæ interdum tussi in hæmoptoica passione, reijcitur, 4. loc. aff. 5. aliquando generalius, ἐφελκίς, crustula est, quæ ulceri obducitur, diciturque de internis; quandoque enim crustula & per tusses è pulmonibus, & per deiectiones, & intestinis, deijciuntur.

Ephelis, ἐφελίς, est aspreudo & nigrities in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ τοῦ ἡλίου, idest Sole, nomen desumens.

Ephmera, febris est, quæ à causa procatartica, siue præincipiente fit cum urina coctione, prima die apparente, suavi caliditate, pulsu ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedente, systole pulsus parum à naturali tenore mutata, æquali atq; incompresso ascensu in caliditate ac pulsibus, etiam consistente febre, sudore, aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore declinans, ubi integra febris cessatio sequitur, 1. de differ. feb. cap. 7. in spiritibus citra humorum putredinem accensa, ibid. cap. 5. vide Diaria.

Ephialtes affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & suffocatio, cum quis somni initio, supinus iacens, grandi se mole opprimi, atque ab alio inuadi imaginatur, cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpedita, prope suffocari, æger videatur; adhuc Græcis dicitur ἐπιβολὴ ἀνιψαδίου, Latine

tine

tine vero Incubus, uel Incubonus dicitur, forte quia ex veteribus quidam Dæmonem, alij cupidinem, alij incubantem vetulam, aut externam quandam vim, quæ quiescentes inuaderet, & pondere oppressos, grauaret, esse voluerunt, quamuis tota mali causa, intra corpus esset. in libello de utilitate respirationis, Galeno, ascripto.

Ephidrosis ἐφιδρώσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in vniuerso corpore sudoris prouentum, tum paucum, tū inutile.

Epialus, uide Febris Hepialis.

Epicauma est velut, ex igne crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro aduenit, nec permanet, lib. finit. id morbi ἐπιμαύωσα & ἐγκαύωσα vocant Græci, Latini uero ustionem, siue exustionem.

Epicrastica, ἐπικραστικά, medicamenta sunt, quæ & temperantia dicuntur, quæ si valentiora euaserint humoribus mordicantibus, morsum eorum retundunt, 2. simplic. 12.

Epicrasis, ἐπιμείξις, est uitiosi succi curatio, cum indicationes sibi aduersantur, in qua paulatim quod uitiosum est, vacuatur, & paulatim inuicem, quod salubre est, pro eo reponitur, 9. meth. 10.

Epicrasis, idest adiudicatio, ad Thrasi. cap. 6.

Epicrusis certa quædam est percussio, qua mango nes puerorum, hoc ipso præsidio succurrunt ijs, quibus à natali die, gracilia sunt mēbra, 14. meth. c. 16.

Epicryema, ἐπικρύμα; est secundus fœtus conceptus
grau-

grauida iam muliere, id quod fit vt scripsit Hippoc. cum fœtu iam concepto non clauditur exactè uterus; sed semen aliud etiam postea intro admittit; Arabibus super imprægnatio dicitur.

Epidemus, vide Endemus, & Communis.

Epidermis, summa cutis corporis, seu Cuticula, 3. meth. 4. sola sensatione à uera cute differt, hæc enim à neruorum extremitatibus dilatatis fit, Epidermis uero à Cutis excremento prouenit, itaque uel sensu caret, uel exigui sensus est, proinde citra dolorem facile à subiecta cute separatur.

Epidismus, siue Hypodesmidas, idest fascias, sub fasciationes, & subligamina, sine ulla distinctione, veteres vocauerunt; At Hipp. fascias quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciationes appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur, 3. de his quæ in medic. 6. uide Plagula.

Epidesis, gen^o ligationis est ad sanguinis profluentibus uasis, iniecta, quanquam ipsum uas circulo non complectatur, sicut uinculum, uerum cum ex parte, suo complexu, committat quodam modo vulnerati membri, labra dissidentia, & quæ super imposita sunt, contineat, merito inter claudentia remedia, numeratur, 5. meth. 3.

Epididymis, ἐπιδιδυμῖς, idest supergeminæ tunica, testium inuolucrum est, & appendix; est enim pars quædam animalis gemini, hoc est testis capiti super imposita, id quod nomen ipsum præsefert, ex
qua

qua multæ fistulæ, seroso quodam humore plenæ ad testem permeant, 1. de semin. cap. 15.

Epigastrium, vide Abdomen.

Epigenema, ἐπιγενεµα, quasi superueniens, vel super genitum, idem est ac symptoma, de sympt. diff. cap. 1. vide Symptoma.

Epiglottis, ἐπιγλωττις, idest superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunditatis oblonge in interiori gutturis parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice lingue exoritur, lib. de uocal. instru. diff. cap. 4. quæ & Glottis dicitur, 7. de vsup. cap. 13. Dicitur et lingula, ligula, idest laryngis lingua; est. n. corpus quoddam simile lingue alicuius fistulæ ubi arteria & larynx inter se connectuntur, 7. de vsup. cap. 13. quæ uelut operculum recte quidem omni tempore, quo animal respirat stans, quo transglutit laryngi accumbens. ibid. cap. 17. Cuius ligulæ nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs quem nunc habet, uidentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferretur, ad laryngis cavitatem acernata, ibid. Estq; hæc proprium vocis instrumentum, 1. loc. aff. 6.

Epigonatis, uide Patella.

Epilampsies, uide Effulgescentiæ.

Epilepsia, (quæ & Epilepsis dicitur,) idest morbus Comitialis, de differ. morb. cap. 5. estq; totius corporis conuulsio, 2. de sympt. caus. cap. 2. vide Comitialis.

Epilogismus communis est quædam ratio, & omnium

nium assensu conspecta, 1. prorrhēt. 6.

Epiludes, Parulides, Thymi; tumores sunt præter naturam, nihil selectum habentes, præterquam quod sunt carnosæ germina, lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides, vide Efflorescences.

Epiparoxineste, idest superacui, & super exarcerbari dicimus, cū paroxysmus plures habet insultus, sicut & pulsuum Thlipsis idest compressio, sic enim nominant, quando incipiente accessione satis paruos atque inæquales eosdem habet, 1. de diff. feb. cap. 7.

Epiphora, ἐπιφορὰ, tum inflammationis magnæ, vniuerso illatæ corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum commune nomen est; propriè verò, de oculis profertur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia influxerit, lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις est; vbi os cum osse ad vniōem coit, siue adnata appendix, lib. de ossib. in præmio, differt autem ab Apophysi, ut idem Galenus annotat, quod Apophysis, sit totius ossis extremâ pars, Epiphysis vero non est ossis pars, sed aliquid ossi adnatum.

Epiphysis vermiformis ἐπιφυσις διωλκνοειδής, idem est ac Conarium siue Conoides corpus, & Turbinatū, vide Conoides.

Epiplasma, idem est ac Cataplasma, vt cum trititi farina, ex hydrelæo decoquitur, ac vulneribus imponitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Epiplotele, vide Celas.

Epi-

Epiploocomistae plerique homines dicuntur, quasi dicas. Omenti gestores, dum in magnam molem excreuerit, 6. de anat. adm. cap. 5.

Epiploonphalon, omenti est in umbilicum decursus, & prolapsus, lib. finit.

Epiploon, siue *Epilun*, uide *Omentum*.

Episarcidium, uide *Anasarca*.

Episemasia est ipsum principium, siue insultus accessionis febrilis, in quo aegri solent horrere, refrigerari, oscitare, pandiculari, dormitare, aut aliud quid simile pati, dicitur autem ἐπισημασία, hoc est significatio, dicitur etiam, ἐσβολὴ παροξυσμοῦ, idest annotatio paroxysmi, uide *Annotatio*.

Epision, uide *Aquaticulus*, siue *Aqualiculus*.

Epispasthon, uide *attrahens*, est medicamen aridum inspersile, ad malignorum ulcerum curationem, non inefficax, 4. de comp med. loc. cap. 5.

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis ualentiora, que tum ex unguentis, tum ex iis quae similem vim obtinent medicamentis componuntur, 7. meth.

4. *Epithema* adhuc, operculum est, 2. de vsup. c. 9.

Epneumatosis, uide *Physis*.

Epoche, est suspensa sententia, nihilque definiens, quod est de nulla re pronunciare, nec assenerare certo, lib. de optimo docendi gen.

Epomida, idest, super humeralem, superiorem humeri partem dicunt, 1. de anatom. adm. cap. 11. uide *Ala*.

Epulis

Epulis, ἐπουλῖς, est tuberculum et carnis excrescētia in gingiuis proueniens, & ad intimos molares dētes, pertinens, ita ut æger aliquando os aperire nequeat, 5. de comp. med. loc.

Epulotica, ἐπουλωτικὰ φάρμακα, medicamēta sunt quae non detrahēre neque liquare carnem, sed indu-rare, desiccare, & cicatricem inducere apta sunt, ut alumen, galla omphacitis, es combustum præsertim lo-tum, 5. simplic. ca. 15.

Equus, (qui Græce Hyppos dicitur, lib. finit.) oculorū affect⁹ est, insitus quibusdā, quib⁹ oculi nullo tempore manere possunt requieti, sed tremule subin-de nictant, semper instabiles, 1. progn. 21.

Erratica febris, siue inordinata est, quæ extra bo-ras consuetas vel tardius, uel celerius inuadit, modo enim inordinate mouetur, modo inordinate persistit, nunquam autem ordinatè, lib. de Typis, cap. 4. sunt enim in erraticis, inordinata principia.

Errhina, medicamenta sunt, quae naribus, quas Græci Rhinas vocant, capitis purgandi gratia in-funduntur, 5. simplic. cap. 20.

Erythroide, est interna testiculorum tunica, de caus. morb. ca. 10 uide Elythroide.

Eruptionum, siue ut Græci dicunt, Exanthema-tum nomen quidam in communi usurpāt, de affectio-nibus uidelicet ulcerosis, & asperis, in mento sua sponte prouenientibus, 5. de comp. med. loc. ca. 6.

Erysipelas est tumor præter naturam non alte de-scen-

*scendēs, sed in cute consistens, à bilioso humore obor-
tus, colore pallido, 14. meth. 1. si uerò ipsius color nō
sit omnino pallidus, sed mistus ex pallido, & rubro,
erit etiā mista affectio, ex phlegmone in qua sanguis
peccat, coloris rubei, & ex Erysipelate, utique ab eo
quod in mistura superat nomen ipsi inditur, ac dica-
tur de eo id quod superatur, sicut uel Phlegmonem
erysipelatosam, uel Erysipelas phlegmonosum, 14.
meth. 1. & 2. Dicunt autem Erysipelas, idest Vici-
nitrahā, uel Vicinirubiam, quod incensum quidem
atque inflammatum est semper, cum tumore uerò nō
semper, lib. 3. de his que in medic. 30. & 2. ad Glau.
1. Exactū autē Erysipelas est, quod à biliosa fluxio-
ne ortum ducit, 7. simplic. dictione Coriandrum.*

*Eschara crusta est, quæ ulceribus ueluti septū, uel
sua sponte, uel arte adnascitur, 5. meth. cap. 3. vide
Caustica.*

*Escharoticum medicamentum est, quod perinde
ut causticum, in crassa essentia est, quod cuicunq;
inhæserit parti, stipitis ritu infixum excruciat, 5.
simplic. 15.*

*Esthiomenon herpes, est inflammatio ex syncera
flaua bile ad cutem decumbente acriori et mordacio-
ri quā herpes miliaris; in hoc enim fluor pituita mi-
stus uidetur, in illo exacta bilis totam exulcerans &
corrodens cutem, lib. de tumor, cap. 9. vide Herpes,
Phagedæna, Nomæ.*

Ethmyodes platysma, idest latus ille musculus, si-

L ne mi-

ue musculoſa dilatatio, quæ cuti ſubnaſcens, Gnatō,
ideſt buccam, ſine maxilla mouet, lib. de neruorum
diff. cap. 6.

Euacuationem omnem, ſiue fiat inedia, ſiue ſan-
guinis miſſione, ſiue purgante medicamento, ſolitus
eſt vocare Hippoc. vaſorum inanitionem; Euacuatio
autem eſt humorum, qui ſua quantitate moleſtant,
purgatio; vt purgatio eſt humorum, qui ſua qualita-
te moleſtant, euacuatio, 1. aph. 2.

Euonymia, ideſt ſuccorum in corpore bonitas, 2.
de ſimplic. 13. vnde Euymon nutrimentum eſt bo-
ni ſucci, 6. de ſanit. tuen. cap. 7.

Eucraſia, eſt medium omnium temperamentorū,
1. ſanit. tuen. cap. 4. ex optima & conuenienti cuiq;
miſtura quatuor primarum qualitatum conſurgens,
Vnde eius magna eſt latitudo, quam qui adeptus eſt
ſuſceptos, ſiue Eucraton corpus, ideſt optime tempera-
tum appellabitur, ſecus dyscraton, ſiue intempera-
tum, 2. de temper. 1.

Eueſtica medicina pars, quam alij Gymnaſticam
vocant, eſt quæ optimum habitum corpori inducen-
dum ſtudet, de part. art. med. cap. 5.

Euexia, eſt bona corporis habitudo, 1. de ſanit.
tuen. cap. 8. vt huic oppoſita Cachexia .i. prauus cor-
poris habitus, eueſiæ na. naneſiæ, illam complent bo-
na omnium partium temperies, actionum robur, Eu-
chymia, ſanguinis, carnis, totiusque corporeæ molis
Symmetria.

Euiden-

Euidentes causæ, uide Continentes.

Euoxon, uinculum vocat Hippoc. quod bene gestat & sustinet, hoc est firmiter & sine ulla compressione continet, 3. de artic. 22.

Eupathia, idest, patiendi pröptitudo, 4. de vsup. 14.

Euphyiam, vocat Galenus, bonam habitudinem 1. de vsup. 9.

Eupnœa εὐπνοία, proba spiratio, quæ secundū naturam fit, opposita dyspnœæ quæ est difficilis spiratio, apud Hippoc. vt annotat Gal. in commento prognost.

Eurhythmus pulsus est, cuique ætati, loco, tempori, tēperamento, naturalis pulsus, cū suum rhythmū seruat, 1. de differ. puls. cap. 9.

Eusarcon, uide Quadratum.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ vndecimo die coctionē in urina, noctem grauem, quæ accessionem præcedit, insultus cum concussione, pulsuum decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit, 1. dier. decret. cap. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, uentrēq; roborans, 6 de tuen. san. cap. 9.

Euthyporos, idest in rectum procedens, alterum ex instrumentis & organis est, quæ fractis vel luxatis cruribus supponuntur, (quæ εὐθυπορας, Græci vocant) quod quidem Euthyporos per vnicum axem, qui in fine machinæ ad infernam eius partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, gemina tē-

L 2. sione

sione efficit quod verò prius sursum, mox deorsum, illud Metalepticum dicitur, quasi translaticum dixeris 6. meth. cap. 5.

Eutrophia, idest bona, & vberior nutritio, 3. sanit. tuen. cap. 8.

Exanastomosis, vide Osculorum apertio.

Exangues corporis partes sunt, ut ossa & cartilaginee, quae mucoso quodam humore aluntur; qui lentore quodam & albedine praeditus est, cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat, 3. de articul. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis & asperis in aliqua corporis parte prouenientibus, quae & pustulae & Bothor dicuntur, 5. de comp. med. loc. cap. 6. sunt autem ἐξανθήματα, idest papulae, quaedam leues eruptiones humorum per cutem efflorescentium; rubrae, pallidae, flavae, non nunquam & nigrae & lividae, pro humorum ratione, nunc indolentes, nunc prurientes cum scalptu, interdum sine pruritu, nunc ulcerosae, nunc ad vlcus non deuenientes, harum generum sunt φλυκταίναι, ψυδράται, ἐπινούσιες, λειχήναι, Variolae, Morbilli, quaeque in lue Venerea gignuntur & quae in febribus pestilentibus, vide Pustulae, Eruptionum.

Exarthrema, luxatio est, non omnis, sed ea tantum, in qua totus articulus à sua sede excidit, nam parua luxa-

luxationem, non ἐξάρθημα, sed παράρθημα, quidam vocari contendunt, 2. meth. 2.

Exarticulatio est alicuius membri luxatio, lib. de morb. diff. cap. 13. Exarticulationes interdum vocat exarticulata, idest ossium à propria sede excessus, sine fractiōe, co. 1. in 1. de fract. 1. vide Luxationes.

Ex egritudine senectus, siue ex morbo seniū (quod & Tabes, seu Marasmus & Marcor, febrisque à qua proficiscitur, tabida, vel marasmodes dicitur) est extinctio nativi caloris, ad quam totum corpus contabescit, instar arboris cuiusdam supra modum arfacte, aut ob longitudinem temporis, aut flammæ viciniæ, aut vehementem, atque immoderatū squallorem; Cumque hæc qualitas senibus, annorum multitudinis ratione comparetur, tabidis tamen à febrili caliditate, 5. de sanit. tuen. cap. 9. & 1. de differ. feb. cap. 8. Fitque ex defectu nutrimenti, ubi quis vel ex electiōe famem tolerat, uel præ ciborum inopia, fame conficitur, lib. de marcore, cap. 1. vide Marasmus.

Excavatio, vide Lordosis.

Excidentia apud Hippoc. nunc sine adiectione luxationē ossium à propria sede significant, 1. de fract. 1. nunc articulorum tantum luxationes, com. 3. de iis quæ in medic. 31. vide Luxationes.

Excrementum id omne dicitur, quod in alendo corpore, nec confici, nec assimilari potuit; Cumque propterea corpori non adnascatur, nec adcreseat, per ipsius

laxiora intus spatia tanquam supernuacaneum errat, unde nomē quoq; recte à maiorib⁹ ei rei περιπλῶμα, idest pererrans est inditum, 1. de sanit. tuen. cap. 3. vide Attractrix, & Lotium.

Excutiones, idest ossium extra cutē eiectiones, de ossibus enim extantibus est sermo, 4. de artic. 34.

Exelcismus, est ossis, uel ossium deductio à superficie in profundum, lib. finit.

Exercitatio acuta, cuius celeres motus sunt, quae corpus tenuat, contraria crassum reddit, multa corpus siccatur, mediocris obesum praestat, 5. sanit. tue. 3.

Exipotica, idest excolentia, & digerentia medicamenta, 7. de compos. med. per gen. 9.

Ex morbo senium, vide ex aegritudine senectus.

Exomphalos, dicitur cui umbilicus foras prominet, quod malum, alij rupturam vocant, alij egressionem umbilici, quod accidit vel Peritonæo rupto, aut procidente Omento, aut intestino, vel humore ibidem collecto, uel carae subnata, uel sanguine irrumpe, per Diapedesim, vel aneurisma, uel solo aliquando spiritu irruente, vide Bubonecele.

Exostoses, uide Elephas.

Expansa ενπεπληγυα, vide Abscedentia.

Experientia, est eius, quod sepius & eodem modo visum est, observatio, atque memoria. ad Trasibul, cap. 11.

Expiratio est motus, quo spiritus per respirationē ad interiora lat⁹, ad exteriora propellitur, 4. aph. 68.

qua

qua in Cordis compressionibus, id quod fuliginosum est in eo, ac fumidum per leues arterias, extra funditur, 7. de vsup. 9. vide Inspiratio.

Expiratus, species quædam est, ex conuulsione proueniens, quæ musculorum qui exspiratum efficiunt, conuulsionem sequitur, quam appellat Hippoc. spiritum inter exeundum offendentem, 2. de sympt. caus. cap. 2. & 4. apho. 68.

Expultrix facultas, vide Attractrix.

Exquisita, & extensa tertiana, uide Tertianæ simpliciter.

Extasis, idest mentis emotio, insania est, quæ breui finitur, lib. finit.

Extensum intestinum, Vide Rectum.

Extergentia, uide Rhyptica.

Externa causa, uide Procatartica, & Continentes causæ.

Extuberatio, est vertebræ alicuius ab interiori, ad exteriorem regionem luxatio, 9. de placit. 4.

Exuccatio, idest sugillatio, 2. de fract. 24. vide Contusio.

Exudare, est circa frontem & clauiculas parum sudare, com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Exufflatio est multi spiritus extra animal per guttur affatim facta emissio, agentibus ad id intercostalibus musculis, contractoque Thorace, 1. loc. aff. 6. quæ duplex est, altera citra sonitum & strepitum, cū ex utrisque thoracis partibus nihil omnino expirat

animal; altera cum una tantum thoracis parte respirat animal, ita ut semispirans, uel semiuocale reddatur, diciturque exussatio strepens, uel cum sonitu, 4. loc. aff. 6.

Exustio, quæ & Deustio dicitur, siue ipsa Solis operatio talem sortiatur appellationem, aut qui ab eodem fit in corpore affectus, siue ille qui iam effectus est; est quidem sane, & hoc ipsum calor præter naturam, non dum tamen febris, nisi Cor una calefiat, 1. de differ. feb. cap. 3.

FACIES, Græce πρόσωπον, est quicquid à priore capitis parte sub tota fronte auribus, oculis naso, & ore ad mentum usque, à supercilijs incipiens, circumscribitur, lib. Introd. cap. 10.

Facies Hippocratica, quam mortiferam uocant, est cuius nasus acutus, caui oculi, adstricta tempora, aures frigide & contractæ, & fibræ earum uersæ, cutis circa frontem dura, intenta, arida, color totius vultus uiridis aut niger est, 1. progn. 7.

Fetus, (quo tempore in utero semen, feminis speciem refert, ut in abortu & dissectione uisum est) ab Hippoc. non appellatur, donec sanguine repletum Cor, Cerebrum, & Iecur, indistinctam quidem & informem, quandam tamen coagulationem & magnitudinem præse tulerint, & carnea fetus substantia & non amplius seminalis apparet, tunc non genitura

tura, ut prius, sed factus ab Hippoc. appellatur, 1. de sem. cap. 9.

Fames, uide Sensus indigentia.

Fatuitas (quæ & μωροῦς, stultitia & stoliditas dicitur) symptoma est citra delirium, ægros naturalibus fatuis similes reddens, quales etiam ex ijs, qui dicuntur consenescere, non nullos fieri nouimus, cui pathemati simile quidem est, quanquam non idem quod vocant ἀνοίαν, anæam, idest ignorantiam, de qua Thucydides scripsit in his qui ex peste seruati sunt, hoc pacto, ignorauerunt, tum seipsos, tum familiares, com. 2. in 1. prorrh. 60.

Fauces sunt internus oris locus, ubi simul conueniunt, & gulæ & gutturis partes extremæ, 4. loc. aff. cap. 3. quas fauces Pharynga uocant, idest, præiacentem gulæ & gutturis sedem, quæ aperiendo deorsum, euidentem amplitudinem, in qua gemina ostiola visuntur, tum gulæ, tum etiam gutturis, commōstrat, 3. progn. 16. uide Isthmus & Pharynx.

Fauus, qui & κηρίον, & μελιμηρίς dicitur, uide Achæres, & Cerion.

Febrire siquidem existimamus, non eum modo qui in cute, in superficie exteriori igneam habet caliditatem, uerum etiam & hoc magis, qui eam, in corporis imo, & visceribus continet, co. 1. in 1. prorrh. 7.

Febris, secundum communem omnium hominum consensum, est caliditas præter naturam, maxime quidem in totum animal effusa, sin minus at omnino

vel

vel in plurimis partibus, uel in nobilissimis accensa, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29. cum is calor adeo auctus est, ut & hominem offendat, & actionem laedat, 8. meth. cap. 1. siue idem calor, ipsum Cordis corpus occupauerit, siue eos, qui in eius uentriculis continentur humores, 1. de diff. feb. c. 1. & 3. & de cur. per san. cap. 5. febre[m] autem dicit Hippoc. à feruore & igne deducta appellatione, ut significet febre[m] quoque ipsam quae πυρετός dicitur ἀπὸ τῷ πυρὸς, idest ab igne fuisse nominatam, eamque esse febris essentiam, quod calorem igneum habeat, 3. de fract. 8. & de caus. morb. cap. 2.

Febris ab apostemate (quam febre[m] phlegmonodem vocat, 14. meth. cap. 9) est cum aliqui, vel ob inflammationem obortam, abscessum, dolorem, vel Erysipelas, uel lateris inflammationem, pulmonis, uel alterius partis febricitant; licet ueteres eos non simpliciter febricitare, sed uel pleuriticos, peripneumonicos, lienosos, simpliciter dicerent, 4. aph. 73. Eadem etiam febris accidens dicitur, si post sensibilem alicuius membri, aduenerit affectum, alioquin ægritudo & passio censenda est, de differ. morb. c. 5. & com. 1. in 6. de morb. uulg. 29.

Febris accidens, vide Febris ab apostemate.

Febris Acmaistica, Anabatita, Epacmaistica, Paracmaistica, Homotena, Causon, ardens, deurens continua, ἀκμαστικὸς καὶ ἰμωτόνους, ἀναβατικὸς καὶ ἐπακμαστικὸς, παρακμαστικὸς, καύσους, καὶ συνεχὴ

Greg-

Græci uocant, vide Continua febris.

Febris Amphimerina ἀμφιμέρινος, vide Amphimerina febris.

Febris Cathemerina, uide Cathemerina febris.

Febris Colliquatiua συρτήσιον πυρετός, ex genere est febrium quas marasmodos uocant, hoc solo tamē differunt, quod quæ portio carnis in his colliquatur, ea semper uaporis uice digeritur, in illis, in uentrem defluit; in ardentissimis enim febribus, si carnes humidae ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas, sin' sine adipe & siccae sint in marasmodos febres transeunt, in quibus sicciores carnes redduntur, & corij ritu durantur, nec defluit ulla ex his sensibilis liquatio, 10. meth. 11. idque fit cum corporis humores tenues fuerint, et febris calor acris; nam euaporantur, qui ita extenuantur, per insensibilem euacuationem, 2. de ratione vict. 47.

Febriū cōfusio νράσις, vide Colplexio febriū ἐπι-

Febris Diaria, uide Diaria febris. (πλονη'.

Febris diurna & nocturna, quam Græci Cathemerinam & Mathemerinam uocant, est febris quotidiana, quæ nocte uel die remittit quidem, sed non intermittit, quæ uero remittit, & ad infebricitationem uenit Amphimerina dicitur, co. 3. in 1. de morb. vulg. 2. & 9. uide Amphimerina.

Febris Ephemera, uide Ephemera febris.

Febris facta & fiens, uide Febris scetica.

Febris focus, est ea animalis particula, quæ prima

ma suis ipsius solidis partibus immodice fuerit calefacta, quod in Ethica febre primum ē Cor, tum Iecur, tum uenter, tandem quaecunque possunt secum Cor concalfacere, lib. de Marcore, cap. 7. qualis est particula, quam uel obstructio, uel putredo, uel phlegmo ne obsederit, 11. meth. 20.

Febres Hefticas appellant, quæ solidas animalis partes occuparunt, uel quoniam firmæ ac solutu difficiles sunt, quemadmodum habitus, aut quoniam ipsum corporis habitum comprehendunt, 1. de differ. feb. cap. 7.

Febris Heftica exquisita est, quæ nullum particularis accessionis, aut principium, aut incrementum, aut uigorem, aut denique remissionem habeat, à solo autem cibo, hefticæ febres effervescent, quo incremento ablato, æquales semper perseuerant, lib. de marcor. cap. 8.

Febris Helodes, quæ & Typhodes & humida dicitur est, cum à prima statim die, ægrotantes sudant, sudore quæ ipso, aut parum, aut nihil leuatur; Contra sicca, in qua sitis urget uehemens, ac scabra uisitur lingua, durataque tanquam Corium cutis, plurimusque adest in corpore squallor. Aduersus Licu, c. 2.

Febris hemitritæus, uide Febris Semitertiana.

Febris Hepiala ἡπαλός, de genere est quotidiana, quando simul ægri, rigent, & febricitant, atque eodem tempore in toto corpore utrumque sentiunt affectum; (& si quidam, eum rigorem, qui febrem antecedit, ita

ita nominant) 2. de differ. feb. cap. 5. quae & Epia-
lus appellatur, lib. de ineq. intemp. cap. 8.

Febris homotena, vide Continua.

Febris horrida, est, in qua magna accessionis pars
horrore consumitur, 2. de differ. feb. cap. 8.

Febris humida, vide Febris Helodes.

Febris Hyemalis, ea est apud aliquos, quæ hye-
me fit; apud alios ea, quæ hyemis tempori est pecu-
liaris, 4. rat. vict. 61.

Febres liuidæ, à colore cognomen adeptæ sunt,
egri enim cutis tota liuida, & labia qualia exesis mo-
ris esse solent, & oculorum alba liuescunt; quæ san-
guineum succum deficere nunciant, & cum ipso itidē
ingenitum calidum, atque iccirco mortiferæ sunt, ex
quibus non nullæ syncopas euacuationem sequentes,
efficiunt, com. 1. in 6. de morb, vulg. 29.

Febris typharia λεπύγεια est, in qua intus, & in ip-
sis visceribus calor sentitur urens, ut neque valde
subtilium uestimentorum, neq; linteolorum velamē-
ta, neque aliud quicquā præter nuditatem ferre pos-
sint; in externis autem partibus, frigus aut tepor.
lib. de inæquali intemp. cap. 8.

Febrem magnā, aut paruam, consueuerunt Medi-
ci appellare, non propriè quidem rei quali, nomen
quantum accommodantes; hoc tamen facere assueti non
in febribus tantum, sed in mille alijs rebus, quæ li-
cet in qualitate subsistant, magnæ tamen ac parvæ di-
cuntur, 1. de differ. feb. cap. 1.

Febris

Febris marasmodies est febris marcida, in qua omnes corporis partes, æqualiter marcescunt, lib. de marcor, cap. 5. vide Marasmus.

Febris marcida apud Philippum datur, quæ idem est ac ex morbo senium, sed eam Galenus non vult febrem dici, cum in ea frigidius quàm natura postulat Cor sit factum, ostendunt id, pulsus parvus & rarus redditus, respiratio parua tarda ac per longa interual la, quæ & ipsa Cordis & partium ad Cor pertinentium frigiditatem indicat, lib. de marco, cap. 5. Senium igitur ex morbo, quoniam frigiditas siccitati adiuncta est, febris non est; sed is tantum febris dici potest, qui & marcor torridus dicitur, & marcor syncoposus; his enim ambobus est pulsus frequens et parvus, ægrique dum oscitant spiritum efflant calidum, ut in re ipsum ardori & aestui assimilare possis, qui marcor torridus, ex caliditate, ardentissimisque febribus præsertim in sicciori corporis habitu fit; frigidus aut marcor qui senectutis similem affectionem obtinet, fit ex permutatione febrium, quæ tum per aquæ frigide potionem, tum per ea auxilia, quæ refrigerandi gratia hypochondrijs, ac Thoraci imponi solent, fuerint secus, ac oportet refrigeratæ, lib. de marc. cap. 5. vide. Ex egritudine senectus.

Febris Mathemerina, vide Febris diurna.

Febris mitis, est quæ medici manum non mordicat, neque exurit, sed vaporem minime mordacem exhalat, huiusmodi est Diaria febris, mitis autem dicitur

citur nō simpliciter quidem sed per comparationem ,
hoc est minus mordax , si quidem febrilis omnis ca-
lor , cum sit igneus , acer & mordax est , sed hic ma-
gis , ille minus , uide Febris simplex .

Febris modos non nunquā mores vocant , non nun-
quam differentias vel essentias , vt quod febris boni
vel mali moris sit , benignus , uel malign⁹ , 1. de morb.
vulg. 10.

Febris Pemphigodes πεμφιγώδης est , quæ per calo-
ris intensiōem , pustulas in ore , quæ Græcis Pibly-
ctides dicuntur , generat , lib. finit. nec hoc solum , sed
pemphigodes febres , hoc est spiritibus affluentes in-
terpretamur , sentimus enim plerunque per febrici-
tantium cutes , aërium quendam halitum effluentem .
Dicitur itaque Pemphigodes , idest flatulenta , vel fla-
tuosa , sed hanc pleriq; vario modo interpretati sunt .
Quidam diariam febrem intelligunt , natam spiriti-
bus accensis , Alij febrem madentem & humidam ,
ab effluuio quodam aëroso , & uaporoso , per cutem
sæpius erumpente ; alij eam febrem sic vocant , quæ
veluti exilientium et manui occurrentium scintillarū
opinionem præbet ; uel ita appellatur pestilens ἢ πε-
στὰς πεμφιγών , idest , quæ cum pustulis efflorescit .
Quamquam possit adhuc intelligi synochus nō putris ,
quam ob id inflatiuam vulgus medicorū vocat , quod
sanguinis calore febrili feruentis copia , uenæ omnes
plurimum sint inflatæ et sanguine flatuoso & bulliē-
te , plene . Verum Galenus in eam sententiam incli-
nat , ut

nat, ut diaria intelligatur, quæ in spiritibus accensis, & interdum putrentibus, subsistit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris pestilens est, quæ à calidioribus ambientis aëris statibus, quales maxime circa Canis ortū contingunt, uel à putrescibili vaporazione effecti, per inspirationem quidem manifeste cor calefacientis, excitatur; qui corpori extrinsecus circumfusi, totum ipsum calidius efficiunt, & præsertim arterias, ut quæ substantiæ ipsius ambientis aliquid trahant; Cum quibus omnibus simul cor affici est necessarium, et cū supra modum incaluerit, ipsum primum atque potissimum, febrilem calorem suscipere, atque ad uniuersum corpus transmittere, 1. de differ. feb. cap. 4. uide Endemus.

Febres putride sunt, quæ ex humorum putredine accenduntur, cum rigore, frigore, vel horrore incipientes, inequalitate pulsum & caloris, siue in principio, siue augmento, pluribus paroxysmorum insultibus, acri, et mordaci calore, submissione pulsum, quam systolen vocant, uelocitate, urinae cruditate, cuius febris declinationem integra non subsequitur quies, 1. de differ. feb. cap. 7. generantur autem à precedentibus causis, non à præincipientibus, quascūq; enim in ipso animali vel dispositiones, uel motus præter naturam, ægritudinum præcedentes causas nominant, quæ uerò extrinsecus adueniunt, & alterant corpus atque transmutant naturam vehementes, præ-

inci-

incipientes appellant, de caus. morb. cap. 2.

Febris putrida intermittens est, quæcunq; ad sensibilem infebricitationem peruenit, ortum habens ab humore febrem generante, qui per oēs corporis partes suo motu defertur, 2. de differ. feb. cap. 1. cuius tres sunt oēs differentiæ quotidiana, tertiana, quartana, quotidiana quæ ex pituita putredine est, ex utriusque verò bilis, flauæ quidem tertiana, nigrae autem quartana, 2. de differ. feb. cap. 2.

Febris quartana, vide Febris putrida.

Febris quintana, sextana, septimana, est cum egri non prorsus affectione morbosa sunt liberati, sed semen aliquod retinuerunt; his usu venit ad victum negligentioribus, sæpe sexto die à principio febricitare, sæpe septimo non raro octauo, uel alio; & cum febris cessauerit, putantibus se prorsus esse liberatos, eodem omnino victu utentibus, ex semine morbi reliquo, totidem diebus in eadem affectionem deuenientibus similiter febricitare, non igitur ex vi morbi hic circuitus datur, sed ex residuo affectionis & inordinato infirmorum victu, com. 2. in 1. de morb. vulg. 7.

Febris quotidiana, vide Febris putrida intermittens.

Febris remissio, totum illud tempus est, quod accessionem sequitur, quod tempus aliq̃ interuallum, declinationem, submissionem, uel ablationem nominat, de morb. temp. cap. 6.

Febris reuersua est, non acuta, sed diuturna, im-

M perfo-

perfectas habēs solutiones, quę postea rursus exoriū-
tur, & per secundam in abscessu expulsionem inte-
grè soluuntur.

Febris sanguinis est febris simplex, in quā sanguis
secundum naturam se habens, accenditur quidem,
sed non putrescens generat febrem similem epheme-
ris, quæ ex inflammationibus inguinum accidunt, nū-
& inguinis inflammatio, ex bono sanguine, sed ac-
censo, fit, 2. de cris. 12. putrescit quidem interdum san-
guis, sed ex eo simplices sunt febres quān ex alijs
humoribus, similem uerò accessionum proportionem
assumunt, qualem tertianæ febres ostendunt; Quod
si sanguis supra modum assetur, pars eius subtilior ac-
pinguior, in flauam omnino conuertitur bilem, quæ
autem crassior in atram, ut in carbunculis contingit,
in quibus sanguine supra modū efferuescente, ad me-
lancholicum humorem fit transmutatio, 2. de differ.
feb. cap. 9. quam uidetur reponere in ordinem febriū
synocharum non putridarum, in quo genere etiam
enumerat febres diarias, 9. meth. 2.

Febris scetica, quæ facile discuitur, opposita fe-
bri hectica quæ difficile, ut enim illa fit, ita hæc fa-
cta est 8. meth. 1.

Febris semitertiana, siue Hemitritæus nūmigitæos
est quę ex quotidiana continua, & tertiana intermit-
tente fit, & confunditur, 2. de diff. feb. cap. 7. in quā
cum pituita, et flaua bilis sibi proportionem respondēt,
& æquipotentes sunt, dicitur Hemitritæus, ibid. c. 8.

Febris

Febris significatio, quæ Græce Epifemasia dicitur, est primus insultus accessionis tempus indiuisibile, exactè iam primum, lib. de morb. temp. cap. 6. quæ & Annotatio dicitur, 2. aph. 1. vide Insultus.

Febris simplex, clarioris doctrinæ gratia, fugiendo equiuocationem à me dicitur, quæ à primo statim die, & si acuta est, non tamen supremè, simplicissimæque & cum tutissimis signis, quam Hipp. εὐνοῖα, idest mitem nominat, seu boni moris, 1. de cris. c. 16.

Febris singultuosa, est in qua egri singultiendo, rodentem, accerrimumque humorem vomuerunt, à quo symptomate non sunt liberati, donec febris in totum soluta sit, vel propè, 4. acutor. 69.

Febres spirituosas quidam nominant (quas Pemphigodes aliter appellant) non ad tactum notitiam referentes, sed ad difficilis anhelitus speciem, in qua magnus creberque spiritus redditur, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris syncopalis, συνκοπὴς πυρετός, est in qua aliqui febricitare incipiunt, ubi maximam crudorū succorum copiam, unā cum oris ventriculi offensione, vel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione congesserunt, quibus præcordia instantur, totum corpus ampliore mole, quàm pro naturæ modo cernitur, tum color ad albidius, uel liuidius, uel nigrius, seu plumbei coloris tendit, pulsus minores, obscuri, & inæquales, quos syncope facile solet apprehendere, 12. meth. 3. Est & aliud syncopalis febris genus quod nō

ex crassorum, & crudorum succorum copia fit, sed ex tenuibus succis, qui ocysissime exhalāt, in qua egrī syncope similiter opprimuntur, 12. meth. 6. priorem vocat Auic. syncopalem humorosam, posteriorem syn copalem minutam.

Febrem Synochon Græci medici eam appellant, in qua vna accessio ab initio ad finem perpetuo manens in multos dies porrigitur; cum enim accessionis remissio ex feruentium humorum transpiratu contingere soleat, non transpirant autem in uehementi stipatione, qualis est in synocho, necesse est multorum dierum fieri accessionem, 9. meth. 2. vel ea est, quæ omni magna mutatione usq; ad iudicationem caret; hæc Latinis continens dici potest. Cæterum & si vna sit idea huiusmodi febrium, à qua synochos eas nominant: natura tamen earūdem minime simplex, vnaq; est; quædam namque earum manifestam habent putredinis notam, quædam uerò prorsus non habent, quæ ex diariarū febrium genere sunt, illas uocamus synochos putridas, has synochos non putridas, Barbari hanc uocant synocham, illam synochum, Galenus 9. metho. & 2. de differ. feb. indiscriminatim, vtræque uoce utitur, & synochi & synochæ, utrasq; sub synochi nomine comprehendit. Atqui synochus febris, & synoche, Græce σύνεχες & συνέχης, hoc est continens & continua differunt, quod in synocho nulla sit feruoris remissio, synochys autē singulis accessionibus remissionem sensibilem obtinet. Item synochus

chus plures; neutra tamen ad infebricitationem peruenit, 2. cris. 6. vide Synocha.

Febris Tabida, vide Marasmus.

Febris Tertianā exquisita est, ea quæ tertia quoque die accessionem faciens intermittens, cum breui accessionis tempore, cum frigore inuadens, sudore, bilis vomitu, et biliosis excrementis terminatur, à bile putrescente exorsa, cui si aliquid horum deficit, nō exquisitè sed simpliciter tertiana dicitur, quod si intermissio sit minor, & accessio longior, dicitur tertiana extensa, 2. de differ. feb. 8. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 25. uide Febris putrida intermittens.

Febres Tritæophyes, τριταόφεις, hoc est tertiana-ũ naturā referentes sunt, quæ tertio die inualescunt, 2. de diff. feb. cap. 2. vide Tritæophies febris.

Febris Typhodes, τυφώδης, vide Febris helodes.

Fellis folliculus, est vesica fellis, 5. loc. aff. 7. vide Cystis, & Choledocos.

Femen, vide Interfemineum, & Perinæon.

Femur, quod & Crus, os magnitudine cunctis animalis ossibus præstat, supra coxendici, infra tibiæ alligatur, cuius ceruici duo sunt exigui processus, quos Trochanteres vocant, quorum anteriorem qui longe maior est, Gluton, hoc est Natem appellant, lib. de offib. cap. 21.

Fermentatio, vide Feruor.

Ferina desipientia, vide Desipientia ferina.

Feruor, sine fermentatio, affectus est, ab atra bi-

li proueniens, vbi amplius incaluerit aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodem, quam nullum animal, ne ipsi quidem mures gustauerint, terra quæ raditur ab ea, ac partes quæ raduntur, omnes in altum attolluntur, 14. meth. cap. 9.

Fibre, seu uilli sunt tenues quædam & subtiliores nervorum, & ligamentorum propagines, aponeurosis, & denervationes, quibus tanquã digitis manus, nervi & musculi actiones suas obeunt, 9. de usup. 2. & 1. de placit. cap. 10.

Fibula, vide Cnimi.

Ficationes, vide Sycosis.

Ficatum, idest Iecur, quod quia omnium animalis partium crassi est succi, ac ad coquendum difficile tarde quæ permeet, propterea macerandi animalis iecur, multarum ficuum siccæ esu preparatur, euadit quæ illud seipso melius, cum animal ipsum caricas affatim comederit; ea quæ ratione factum est, ut hanc appellationem sortiretur, 3. de aliment. fac. cap. 12.

Ficosus tumor, est tumor in mento natus ex crassiori humore, & serosiori tenuitate, quàm Varus, 5. de comp. med. loc. cap. 4.

Ficus in oculo, est tuberculum quoddam à crassiori humore oculi partibus affectis adherescente, colluio modo, hoc est ὀφθαλμία, com. 3. in 3. de morb. vulg. 48. Græce σὺνα νὰι σὺνὼσις, eruptiones vlcerosæ sunt, rotundæ subduræ rubicundæ, quæ dolor comitatur, fit hoc malum magna ex parte in capite, sed & reliquo

quo etiam corpore, fit etenim in ano, & Marisca dicitur, in palpebris ad huc fit et dicitur etiam *ουκωσις*, quod scilicet ficus granorum referat similitudinem, unde ficosam appellant palpebram.

Fistula *Σύρις*, est angustus & longus sinus, lib. de tumor. cap. 5. per translationem dictus à musicis instrumentis, quae oblonga obtinent caua, & fistulae nominantur, 2. progn. 64.

Fistula Vrinaria, quæ vrithra dicitur Græcè, est meatus vrine reddendæ accommodatus, qui in pene est, 4. aph. 76.

Fistulosus, seu flatuosus neruus, uide tauernosum.

Flatuosus morbus, vide Hypochondriacus.

Flatuosus spiritus, qui, & Flatus dicitur, tumore excitans flatuosum, crassus ac vaporosus est uapor, non æthereus atque tenuis, ille enim aëri qui austrinis constitutionibus fit, hic uerò qui aquilonaribus regnat, assimilatur; est quæ hic, is qui in nobis secundum naturam est, spiritus, hic conseruandus, ille ut qui crassus est, extenuandus, 2. ad Glau. 6.

Flaua bilis, vide Amara.

Flexus variciformis, est plexus ille venarum, & arteriarum in testibus multipliciter flexarum, in cuius primis flexuum partibus, sanguinem syncerum continent, qui certe in ultimis flexibus ad ipsos testiculos non amplius ruber, plane est, sed iam quodam modo albicat succus is, qui in ipsis continetur, exiguum ad huc requirens ad perfectam substantiæ seminis gene-

rationem, quod ei à testiculis ipsis accedit, 9. de vsup. cap. 4. uide Glandulosi assistentes.

Fluctuatio cum sonitu Grece κλύδων, symptoma est facultatis concoctricis & retentricis, complectentis alimentum, sed quæ illud sufficienter concoquere non potest; unde eò diutius in eorum uentre, grauitas ex alimento manet, quo tardius concoquitur, præsertim cum nihil in eo continetur, quod verti in flatum possit, aut cum ventriculus vehementer fuerit perfrigeratus.

Fluxio quaedam est apparentium inflammationum causa, quæ non admodum occulta est, nisi quandoque illis coniungatur, quæ aliqua alia ex causa, euidenter factæ uidentur; quandoque enim nulla ex his præcedente, membrum confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionem generat, Rheumata, idest, fluxio vocatur, ipsa uerò passio, dispositio Rheumatica, 2. ad Glauco. 2. Fluxio adhuc simpliciter dicitur, pilorum defluuium, quod tabescentibus magna ex parte, atque ex diuturno morbo conualescentibus, euenit, lib. finit.

Fluxiones ventris, vocat Hippoc. cum & semper & assidue humida deiciuntur excrementa, sine tenesmo, & lienteria, 1. de morb. vulg. 36.

Fluxus est tenuium humorum delatio, quam cohibere nequeas, non ex nostra voluntate proueniens, lib. finit.

Fluxus hepaticus is est, in quo ob imbecillitatem hepa-

hepatis, alui sedimina, aquae in qua nuper mactata caro abluta est, redduntur simillima, 5. loc. aff. 7.

Fluxus muliebris, est sanguinis ex utero profluvium 9. simplic.

Focile maius & minus, vide Cubitum

Focus febris, vide Febris focus.

Fœtus ab Hippoc. vocatur, ubi semen in uterum iniectum sanguine repletum fuerit, & Cor, & Cerebrum & Iecur indistinctam quidem adhuc, & in formam quandam coagulationem, & magnitudinem aliquius momenti præse tulerint, carneaque appareat fœtus substantia, & non amplius seminalis, unde neque genituram amplius talem formam appellat Hipp. sed fœtum. 1. de semin. cap. 9.

Folliculus fellis, vide Fellis folliculus.

Fomenta, & fœtus, sunt qui per spongas calida aqua decoctionis alicuius simplicis imbutas, & expressas, alicui corporis parti fiunt, 2. loc. aff. 1.

Foramen cecum, idest auditorius meatus, vide auditorius meatus, & Cæcum foramen; Cæcum verò dicitur, non quod reuera cecum sit, sed ob flexuosam meatus obliquitatē, quae causa est cur funiculū, aut setam porcinā in ipsum foramē dimissam, trāsmittere non possis, 9. & 11. de vsup.

Foraminulenta ossa, vide Caucrnosa.

Foratio est, qua utimur in fracturis Capitis, cum usque ad Cerebri membranas, Caluariam diuidimus 6. de comp. med. per gen. cap. 2.

Formatrix uirtus est, quæ iacto in uterum semine siue in terram, statis quibusdam temporibus multas conflatur partes eius quæ gignitur, quæ est optima & summa ars, quæ omnia alicuius gratia molitur, sic ut nihil otiosum sit, aut superuacaneum, I. de natur. fac. cap. 6.

Formica, quæ & *Myrmecia*, & sessilis verruca dicitur, 2. meth. 2. uide *Myrmecia*.

Formicans pulsus, uide *Vermiculans*.

Fornices seu testudines, quas Græci *Ψαλλιδας* *ψαλλιδας*, vocant, est forma & figura concaua, figurarum omnium ad patiendum difficillima, qua forma, multa ædificia configurantur, ad cuius similitudinem, pars Cerebri efformatur, II. de usup. c. 15. uide *Camarion*.

Foueola est cauum vlcus, ac paruum in nigro oculi, lib. finit.

Fractura, uide *Vnionis solutio*, & *Rhegma*.

Fractura Caulatim facta, uide *Abductio*.

Friccio (que *Terps*) sicca est, cum corpus vniuersum solis manibus vel linteolo, nullo admisto, aut humido, aut pingui corpore, fricatur; cui opponitur *friccio* humida, quæ sit per aquæ & olei admistionem; ubi enim cum oleo aqua confunditur, haud facile solubili mistione coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum, necesse sit & plusculum inherere aquâ; sola enim aqua quæ foris circumfunditur, facile defluit, & quæ in poros ingressa corporis, nullam habens

bens ansam, promptè effluit, nisi oleum admisceatur, 3. simplic. cap. 25.

2 Frigus, χεῖμα, non eodem modo in sanis, & ægris sumitur; in ægrotantibus, enim aliud est rigere, aliud horrere, aliud algere; sæpe enim accessionis insultus cum rigore, alteri cum horrore, alteri cum sola frigiditate suboritur: Ita ut cum quis cum nulla concussione & agitatione corporis perfrigescit, nec corpus, nec omnino cutis inæqualiter, & præter voluntatem moveatur, perfrictio dicitur, non hic tamen riget nisi motum concussionis inæqualem, & cutis & totius corporis sentiat, isque Rigor Πῖγος, dicitur; si autem cutem quidem perturbet, & per quosdam insultus quatiat, corpus autem totum non commoveat, Horror & Horripilatio, Græce φέμιν nominatur, ut hic affectus solius cutis talis existat, qualis totius corporis Rigor, lib. de Trem. palp. cap. 6.

Frons, μέτωπον, est pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usque protensa, substantia musculosa, & osse subiecto (quod Coronale vocant) constans, superposita supercilijs, pilis nuda, inter utramque aurem sita, Introd. cap. 10.

Fugaces fructus qui et Horarij & Horei dicuntur sunt qui nascuntur eo tempore quod Horam vocant; Est autem Hora Græcis id anni tempus, in cuius medio Caniculam exoriri contingit, Tempus autem id est dierum quadraginta, quo tempore Horarij fructus constant, non nulli iam declinantes, alij incipientes, alij

alii in suo uigore, aut ultra uigorem, aut citra confiscentes; Vocant autem ipsos horarios non quod id solum temporis sint, sed (ut mea fert opinio) quod ipsos ab is qui ad reponendum sunt idonei, distinguant, quando et triticum & hordeum, semina cerealia, & omnia quæ æstiuam, atque anniuersariam habent generationem, sed non cito corrumpuntur; quo modo, cucurbitae, mora, pepones, melopepones, persica, & alia id genus; quæ si quis in hyemem seruare uolens, exiccata reposuerit, eo etiam modo ueterem naturam, in contrarium imitabunt, 2. de aliment. fac. cap. 2.

Fuliginosus vapor, qui ex deustione aëtorum eleuatur, lib. de usupuls. 7.

Fuligo, vide Fumus.

Fumus & fuligo, vapores sunt qui eleuantur, ille quidem ex materiis semiustis, hic uero ex immodice assis, ustisque. Est namque fuligo, vapor terrestris, fumus, mistio quadam ex terrestri, aqueaque substantia, 8. meth. 5. utrunque enim materie adustum excrementum, quod in sublime fertur, significat, non secus in febribus fuliginosum excrementum, expiratione & contractione arteriarum, natura expellit, 3. de præsag. expuls. cap. 7.

Fulua, vide Dichroma.

Funis brachij uena est, pars uenæ humeralis, quæ protenditur, secundum diuersas adiutorij, id est, ossis, humeri, partes, lib. de anatom. viu. & de ratione cur. per

per sang. cap. 16.

Fungos vocant crassas palpebrarum eminentias, com. 3. in 3. de morb. vulg. 49.

Furcula superior, & inferior, vide Claves.

Furfuratio, quæ & farsur, & $\pi\iota\tau\upsilon\alpha$, est cum quibusdam se scalpentibus, furfuribus similia, ex capitis cute dididunt, à vitiosis saniebus prouenientia, 1. de comp. med. loc. 6. quæ & Pityriasis dicitur.

Furor, vide Melancholia.

Furor $\iota\epsilon\omega\tau\iota\mu\acute{o}\varsigma$, amatorius, qui ex amore fit, perinde atque is qui ex Musis $\mu\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{o}\varsigma$, dicitur.

Furunculi, Dothienes, $\Delta\omicron\theta\iota\iota\epsilon\varsigma$ Græcis dicti, tumores sunt præter naturam, ex similibus humoribus quibus Vari, geniti, per vniuersum corpus, qui duplices sunt, aliqui vt ita dixerim, variosi, duri, & agre cōcoctiles; aliqui inflammati in quibus aliquando etiā febres consistunt, & tumor in magnitudinē excrescit, & in pus transmutatur, 5. de comp. med. loc. cap. 7. Estque furunculus mitis quidem, cum in ipsa sola cute cōstituitur, malignus verò cum alte exoritur, Phymati, idest tuberculo similis, à quo sola duritie differt, lib. de tumor. cap. 15.

Fusaneus morbus est, qui omni loco & tempore fit, lib. finit.



G



GALIANCONAS, vide Ancos.

Ganglia γάγγλιον, quæ Auic. & Paulus vocant

cant glandulas, apostemata sunt glandulosa, sicut auellana, & nux, & aliquando minus, saepeq; accidunt super manus & frontem, quae si comprimantur, digitos effugiunt, tum redeunt, & aliquando multiplicantur, saepeque cum impositione, & forti alligatione laminae plumbeae curantur & discutiuntur, quas etiam Contractiones uocat Galenus, 5. de comp. med. per gen. cap. 7. Paul. lib. 4. cap. 16. vocantur etiam & Gangilia quasi concretiones & contortiones quaedam, ex lento & mucoso humore concrecente & conglomerato, quod proprium neruorum alimentum est, 2. de artic. 56.

Gangrena γαγγραινα, est alicuius membri mortificatio, ex magnitudine inflammationis, quae iam fit, non quae facta est, 2. ad Glauc. 9. nam cum omnino membrum effectum est demortuum, ut punctum, vel sectum, uel ustum non sentiat quae patitur, statim rescindere oportet, quae sanam partem uicinam attingit, sed quod ita affectum est denigratur, quod uero in medio est constitutum, ita ut tendat ad mortificationem, Gangrena nominatur. ibidem, vide Syderatio. Adhuc Hippoc. Gangrenas, emortuorum uenarum torporē nominat, qui ex nimia inflammatione consequitur, 2. de fract. 24.

Gargareon siue Gurgulio, Cion, Columna, Curgulio, est ea gutturis pars, quae faucibus adiacet, cum secundum naturam se habet; cum autem morbo afficitur ita ut eius extremitas phlegmone laboret, fit
simi-

similis *Acina* vultus, et dicitur *Vua*; quando tota *Cion*, *Columna*, quando vero fit, dicitur *Himàs*, *ταρυαρεών*, *σταφύλη*, *κίων*, *κίονις*, & *ίμις*, 4. loc. aff. cap. 3. quod quia ad uocis modulationem fit, ideo à quibusdā ple-
ctrum, *πλῆκτρον*, idest uocis refractorium appellatur, 7. de usup. cap. 5. Hanc eandem partem, *Columellā*, *Staphylen*, & carnosam particulam summo ore de-
pendentem vocant, 6. de comp. med. loc. cap. 3. vide *Columella*, *Pharynx*, *Staphyle*, *Epiglottis*.

Gastrocnemion est posterior carnosā *Tibię* pars, seu *tibię* ueter, (ut anterior *tibię* pars carnis expers, dicitur *Anticnemion*, *ἀντινῆμιον*,) Gręce *ταρτερονῆμιον* nā *ταρτερονῆμιον*, *Sura* appellatur, lib. de musc. dissec. cap. 32. & 2. de anat. adm. cap. 4. vide *Sura*.

Gastroraphia, idest, abdominis futura, 5. de anat. adm. cap. 6.

Gemelli, vide *Nates Cerebri*.

Genę *Γένυς*, faciei pars sunt, quę inter nasum & aures sitę sunt, quę bene coloratis & ingenuis, pudore suffusis, rubent, quę & *Malę* dicuntur, *Introd.* cap. 10.

Genion, vide *Mentum*, lib. de musc. dissec. cap. 2. vide *Mentum*.

Genitalis meatus, quem varicosum assistentem vo-
cant, maxima illa via est, quę genituram à testi-
bus haustam, ad *Colis* radicē defert, 1. de semin. c. 15.

Genituram appellat *Hippoc.* illud quod in abortu,
vel

vel dissectione uteri, seminis speciem representat, nō animal constitutum, quod primis duobus mensibus solet accidere, quo tempore neque fœtum, neque embryon uocat, sed genituram, 1. de sem. cap. 9. genituram adhuc aliquando appellat, membra genitalia, in fœminis uterum, in maribus seminaria uasa quae nuncupantur, 3. de artic. 41. vide Cyema, frequentius autē genitura sumitur pro semine, recenter emissō, vel in suis uasis contento, Graece τὸν, Hippoc. lib. de natura pueri.

Genu, Graece γόνυ, est femoris, & Tibiae dearticulatio, in qua sinus est quidam prominens, alterius caput excipiens, quod anteriori parte quo firmitus fieret Rotulâ, seu patellâ munivit, quam μόλις, & παρυονάτιδα vocant, quae prohibet, ne femur curuatis, aut per declinia currentibus loco excidat, & dilabatur, lib. de ossib. cap. 21. 22. & lib. I. introd. c. 10.

Gerocomica, Γεροκόμικη, est ea medicinae pars quae senes regit, de part. art. med. cap. 5. incertum an ad γῆρας, an ad ἡλικίαν, pertineat, cum senum corpus, neutrum sit, plures tamen eam salubris medicinae partem esse statuunt.

Gibba Hepatis, uide Sima.

Gibborositas, quae Graecis κύφωσις dicitur, est distortio spinae in posteriorem partem, 3. de artic. 2. vide Cyphosis & Incuruatio.

Gibbus est, ubi inter distractas vertebrae, uel una uel plures illesae permanserint, sic affectis gibbus accide-

cidere solet ; ubi enim vnica duntaxat uertebra , aut etiam duæ aut tres , se se deinceps consequētes distrahuntur , ea parte spinam cauari contingit , 4. loc. aff. 5.

Gilua emplastra , vide Dichroma .

Gingiuae Οὐλα , carnes sunt , quæ sunt circa dentes , 9. de vsup. cap. 15. vbi primum è locellis emergunt , 5. de comp. med. loc. cap. 8.

Ginglymos species est Diarthroseos , qua ossa se se inuicem ingredientia , coniunguntur , ut vertebrae inter se , ac cubitus , humerusque alligantur , lib. de ossib. in procæmio .

Glabrities , vide Madarosis .

Glacialis humor , vide Crystallinus .

Glandium , vide Thymus .

Glans est finis & extrema totius Colis pars , cuius cutis quæ eam vestit , præputium dicitur , 5. meth. cap. 13. Aristoteles verò 1. de hist. animal. cap. 13. dicit cutem , quæ Glandem integit , carere nomine , & totum quod ex ea cute , glandeque constat , præputiū appellat . Dicitur etiam in alio significato glans , suppositorium , quod clysteris loco sedi infunditur , 6. de compos. med. loc. cap. 3.

Glandula , corpus quoddam carniforme est , quod vtique velut cunei quidam , uasorum diuisionibus incubantes , fulcimentum ipsis suggerūt , vt à nullo uolento casu afficiantur , 4. de vsup. cap. 20. glandulam etiam suppositorium vocat , com. 2. in 1. prorrh. 6. glandulam etiam Thymum dicunt , 3. de aliment. fa-

N cult.

cult. cap. 6. sunt autem glandulae, quas etiam Adenes vocant, imbecilliores corporis partes, ad quas valentiores corporis partes, supernacua sibi tū quantitate, tum qualitate & praesertim ad eas quae rariores natura sunt, transmittunt, quippe valentius est arteriarum, uenarum, nervorum, musculorum robur, imbecillius autem aut prorsus nullum corporū, quae glandularum sunt naturae, 13. meth. cap. 5.

Glandulae laryngis sunt corpora laxiora, & fungosiora ceteris glandulis, laryngi utrinque adiacentes, factae à natura, ut partes omnes, quae tum ad laryngem, tum ad fauces pertinent, humore persunderēt, 7. de v. sup. 17.

Glandulosi assistentes, vel astites, vel parastatae, vasa seminaria, uasa spermatica, plexus, seu flexus variciformis (plexus Capreolaris, & Haderarius, 1. de semin. cap. 12.) homonyma sunt, significantia duo vasa, venam scilicet cui subiacet arteria, utraq; flexus multos numero aequales, instar Capreolorum quorundam, variè complexorum efficientia, quo implexu sanguis & spiritus, qui ad testes feruntur, diutissime coquuntur, in quibus semen elaboratur, qui flexus postremi in testes terminantur, qui testes, ut qui laxi & cauernosi sunt, chymū, qui in uasis ceptus erat concoqui, excipientes, rursum concoquunt, donec perfectam seminis formam induxerint; idemque per aliud vas, quod ad pudendum porrigitur, semen ei aculantur, (quod varicosum assistentem vocant, 1. de sem.

de sem. 15. vulgus vasa deferentia, vt priora, vasa preparantia appellat) quod vas spermaticum maribus latum & longum, fœminis angustum & breue natura concessit, 14. de vsup. 10. & 11.

Glandulosa corpora, quæ primus Herophilus, ἀλνοειδὲς προstates, quasi glandulosos præsides aut prostates appellauit, vtraque parte colli vesicæ sunt locata, in quibus humor quidam spermati similis, verum longe tenuior continetur, qui in coitu repente ac simul vnà cum semine elabitur, reliquo autem tempore omni paulatim, eoquæ sensu non deprehenditur; cuius usus est, ut ad venereū coitum excitet, et in coitu delectet, denique quod crassus is ac viscosus instar olei meatum vrinarium humectet, & inungat aduersus vrinæ rosionem, & ne exiccatus consideat, prohibeatque quo minus per se lotium ac semen facile feratur; in masculis glandes hæ notabilis magnitudinis sunt, 14. de vsup. & 1. de semin.

Glaucosis, γλαύωσις, glaucedo est oculorum affectus, qui ex immodica siccitate, vel concretione humoris crystallini, uel ex largiori eius euacuatione, quæ fit in compunctionibus solet progigni, quiq; cecitatem præ omnibus inaximè qui oculis accidunt morbis, inferre solet, 10. de vsup. cap. 6. Glaucoma vero γλαύωμα est naturalium humorum, in glaucum colorem mutatio. lib. finit. diciturque id oculi vitiū, quod orta prius suffusione, & humore circa pupillā valde concreto & resiccato contractum est, vnde

Glaucedo à siccitate est, vt *glaucoma* ab humiditate; & propterea, *Gal.* 3. *apho.* 31. dicit *Glaucoma* speciem esse *ὑποχύματος*, idest, suffusionis, non tamen docet esse eundem morbum, differt enim suffusio, tum à *Glaucedine*, tum à *Glaucomate*; est enim suffusio extranei humoris, & aliunde influentis concretio; *glaucedo* verò ipsius humoris *crystallini*, densatio & resiccatio; Nec omnes suffusiones tantæ sunt, vt toti pupillæ prætendantur, & visum ex toto adimant; *Glaucoma* verò *crystallini* vniuersi est, atq; siccitas per ipsum totum ex æquo diffusa, & ex siccitate concretio. Adhæc pleræque suffusiones curationem recipiunt, cum tamen nullum *glaucoma* curetur, uti nullus alius morbus ab immodica siccitate proueniens.

Glaucedo, uide *Glaucosis*,

Glaucoma, uide *Glaucosis*.

Glene est id quod in superficie extremi ossis situm est, ab ocularis sinus similitudine, sic dicta, lib. de ossib. in præmio, uide *Articulus*.

Glenoides, sunt duo sinus leniter caui, in inferiore summæ uertebrae parte, quos ab ocularis sinus similitudine sic appellant, similes superioribus; sed sinus superiores, cum caput ipsum excipiant, non ab re sunt maiores, infra verò minores sunt, qui uertebam secundam admittunt, lib. de ossib. cap. 8.

Glossocomion, quod & *Glottocomion* dicitur, machina quædam est, in qua extenduntur & vinciuntur fra-

tur fracta membra laqueis, ad iustam eorundem distentionem, 7. de vsup. cap. 14.

Glutia, Græce Γλουτια, idest parua nates, sunt tenues ac praelongæ Cerebri eminentiæ, ex vtraque parte illius meatus, qui spiritum ex medio Cerebri ventriculo, in Parenchephalidis ventriculum transmittit, quarum concursus, hominum coniunctis inter se femoribus, quæ nates uocant, rectissime comparaueris; sunt autem qui Didymis hoc est testiculis ea assimilantes, malunt uocare Didymia, quæ verò his proxima glutia, 9. de vsup. cap. 14.

Glutinatorium medicamentum, quod & sanguinarium, & cruentis opitulans, & enemon dicitur, est quod vulneris oras committere & glutinare molitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Gluton, hoc est Natem appellant, alterum ex duobus processibus ceruicis, ossis femoris, qui maior & exterior, & gibbus est, lib. de ossib. cap. 21. vide Femur.

Glycea medicamenta sunt, quæ aliquando purgant, et interdum acres humores, indulcant, lib. de Dynamid. in proæmio.

Gnaton, vide Ethmyodes platysma.

Gomphos, affectus oculi est, qui latine dicitur Clauus, cum pupilla egrediens pelliculas Vneæ, superficietenus operit, unde eius forma fit quasi Clauus, lib. de ocul. cap. 11. vide Clauus.

Gomphosis, Synarthroseos species est, cum ad in-

star clauis os ossi infigitur, uel cum quippiam penitus est infixum, ut ne tantillum quidem (ueluti dentes suis alueolis) dimoueatur, lib. de ossib. in proæmio.

Gonorrhœa est seminis inuita, & assidua excretio cole non extenso, Gonorrhœe autem nomen plane cōpositum est, quasi seminis genitalis fluor, ob imbecillitatem continentium ipsum corporum, 6. loc. aff. 6.

Gracilis siue tenuis pulsus est, in quo longitudinis dimensio, quodammodo duabus reliquis præstat, in quo autem duæ reliquæ hâc, turgidus siue crassus appellatur, 1. de differ. puls. cap. 5.

Grando, est tumor crassus, in partibus interioribus palpebrarum coagulatus, ut quasi grando videatur, lib. de ocul. cap. 9.

Graphioides, aut Belenoides processus, idest graphio seu stylo, & acui similes, qui & styloides dicuntur, à Columnæ specie, qui partibus his sunt, nunes ossium capitis processus, appellitât, 10. de usup. cap. 4. Adhuc graphioides & styloides processus est Cubiti processus, quæ è directo parui digiti porrectû, à graphij seu styli modo, Græci dissectores, sic vocant, 1. de anat. adm. cap. 10.

Grauatius dolor, vide Dolor tristis.

Grauedo, siue Coryza est tenuis & incoctus humor qui per nares secernitur, 2. progn. 49. quæ docet non esse pituite speciem, ut quidam falso asserunt, sed excrementum, quod à Cerebro distillat, quod & mucum et Coryzam vocat, qui frigidus et humidus suc-

cus est, qui tum in senibus, tum ijs, qui ratione quavis sunt perfrigerati, plurimus acervatur, quem quidam phlegma vocant, 2. de natural. fac. cap. 9. uide Coryza.

Graueolentia, uide Beneolentia.

Grauis, seu grauatiuus dolor, uide Dolor tristis.

Gressuram γλίσχλα, uocat Hippoc. totum id, quod inter inguina utriusque cruris est, cuius mediam partem περιαιών, nuncupat, hoc est interfemineum, eò quod duobus feminibus interiacet, quæ est intercape do, quæ ab exortu pudendi, usque ad anum pertinet, ubi etiam uesticæ collū, collocatum est, 4. de artic. 45.

Grumus, Graece θρόμβος, est concretus sanguis, lib. de atrabil. cap. 2. estque aggregata concretio sensibilis sanguinis, lib. de tumor. cap. 2.

Guidex uenæ, uide Apoplecticæ.

Gula, uide Oesophagus.

Gurgulion, uide Staphyle, & Gargareon.

Guttur, uide Larynx.

Gutturosos, idest ἰσχυρογγοῦς, quasi gutturem-nulos uocat Hippoc. eos, qui prominentia in anteriorem partem, guttura habent, Guttur enim, idest, βρογχον, uel totam asperam arteriam nominat, uel fauces tantum, 3. de artic. 8.

Gynæciæ, idest mulierū passiones, lib. de Gynæciis.

Gynecomaston, idest muliebris mamme, & subiectæ mammis pinguedinis auctio est, præter naturam, lib. finit., γυναικωμαστόν, muliebrium mamma-

rum summum incrementum; unde τὰ Γοαμεία, idest, muliebria, seu menstruae purgationes.

HABITVS est partium nostri corporis structura & cōpositio, qua ratione dicimus huius corpus esse raræ texturæ, qua propter facile euaporatur, & syncopem incurrit, huius uerò densioris, atq; ob id in morbis cunctari, diutiusq; trahere, 2. de ratione uict. 47. habitus nomine in omni re uti solemus, quae constans est, egreque amouetur, unde et sanitatem bonam habitudinem dicimus, lib. de bona habitudine, & 4. de rat. uict. 25.

Hæderarius flexus, uide Glandulosi assistentes.
Hæmalopa, est oboriens cruenta suffusio ad plagas oculi illatas, 4. de comp. med. loc. cap. 8. estque sugillatio in oculis, ex plaga aut ictu, effuso, sub contusum locum, sanguine. Unde Archygenes dicebat idem malum esse cum Hyposphagmate, atque etiam in omni alia corporis parte posse contingere, praeterquam in oculo.

Hæmatosis, idest, sanguificatio, uide Hepar, & Sanguificatio.

Hæmodia est affectus quidam, qui dentes gingiuasque infestare solet, cum quispiam & austeros, & acidos cibos ingesserit, quo dentes stupet, 2. loc. aff. 6.

Hæmophonus, idest, sanguinis mittendi timidus, 9. meth. 5. uide Psychrophobus.

Hæmoptoicus is est, qui sanguinem sputo eijcit, lib. 7.

lib. 7. de comp. med. loc. cap. 4. siue uomendo. siue tussiendo, siue screādo, siue simpliciter expuendo, reijciatur, 4. de loc. aff. 5.

Hæmorrhagia, idest sanguinis eruptio, & abundans effusio, quæ si per magnum vulnus fiat, per largum obitur fluxum, sin' angustum per iaculationem, vt in uenis secandis. Differt autem Hæmorrhagia, ab hæmorrhoidæ, quod illa sit abundans effusio sanguinis, hic vero delatio sanguinis per dissultationem ac paulatim facta, ut quæ vt plurimum per uasorum erosionem fiat, lib. finit. Vnde Hæmorrhoidæ, sanguifluas venas, in ano existētes, appellāt, 4. de artic. 40.

Hæmorrhoides, vide Hæmorrhagia.

Halitiosa sunt, quæcunque per cutem foras effluere apta sunt, humida quæ per uesicam, sicca quæ per aluum, quippe à uincenti in singulis eorum substantia, nomina ipsis imponuntur; Contraria halitiosis et diureticis dicuntur, Emplattomena quæ exiguis meatibus cutis, & vesicæ in hærentia, ea detinent, quæ per cutim & urinas expurgantur; quæ uerò opponuntur solutiuis, dicuntur stryphna, quod valenter adstringant, 8. meth. 2.

Halitosus spiritus, est alicuius corporis partis humiditas, quæ ad summum concocta, in tenuem halitum, uirtute insiti & validi caloris soluta, insensibili transpiratione in ambientem effluit, qui halitosus spiritus in animalis corpore ex succis, qui lente sensimque ex calfiunt, nascitur; ubi uerò calor imbecillior,

cillior est, vel naturalis humor, tum semicoctus, tum crassus, tum glutinosus, atque particula densior, ibi crassior excitatur halitus, quàm ut transpirare possit. 14. meth. cap. 7.

Harmonia in ossibus, species Diarthroseos est, in qua ossium structura, per simplicem lineam fit, sunt autem non nulla maxilla superioris, et quaedam etiam Capitis ossa, ad hunc modum inter se iuncta, lib. de ossib. in proœmio.

Hebetudo visus, quæ & offuscatio visus nominatur, est summa offensio visionis, sine causa manifesta, lib. Introd. c. 15. Græci uocant ἀμαβρώσις, Arabes guttam serenā, differt quæ ab Ambliopia ἀμβλιώπια, in eo quod magis, vel minus, in hac enim minus læditur uisio, quàm in Ambliopia.

Heftica febris, duplicem habet significationē, una quidem dicitur, omnis febris solutu difficilis, siue sit pituitosa, siue melancholica, opposita est τῇ σκετικῇ, hoc est febrī solutu facili. Altera verò significatione, speciatim magis dicitur, quæ & putrida & diaria opposita sit, dicitur quæ Heftica, quod in habitu corporis ἔξω appellant, tāquam in subiecto consistat; est enim heftica febris, calor præter naturam in solidis partibus accensus, vide Febris heftica.

Hefticus pulsus, ita ut febris uocatur, qui nō magnopere ullo modo variat, ceterum manet in perpetuum similis, cohæret quæ, nec soluitur unquam, quod totus habitus morbum induit, in eiusmodi febribus,

bus, & pulsibus, lib. de pulsib. ad Tyroneſ cap. 8.

Hecticus ſpiritus, qui opponitur naturali, & animali, lapidesque continet, & in uniuerſo corpore uerſatur, quique ſolidis corporis partibus, ex quibus compoſitus eſt, nec diuiſis, nec condenſatis, nec è loco ſuo motis conſeruatur, reſoluitur autem ſpiritibus intenſis, ut in phreniticis, uel diſſolutis, ut in lethargicis, uel ijs qui cardiaco affectu laborant, lib. Introd. cap. 13.

Hedra, ſedes, anus, podex, dicitur & Græcis alio nomine ἀκτύλιος, & πρωκτός; eſt autem meatus uentris inferior, continendis, transmittendisque excrementis deſtinatus. Adhuc Hedra apud Hippoc. lib. de vulneribus Capitis, eſt oſſis fracture ſpecies talis, ut in eo teli veſtigium remaneat, atque appareat, quæ telum inſederit, Hippoc. lib. de vulnerib. Capitis.

Hedysma ideſt unguentum odoratum, 1. de comp. med. loc. cap. 2.

Hegemonica uirtutes, ſunt rectrices, & animales, quæ in Capite collocantur, quæque ſunt imaginatrix, rationatrix, & recordatrix, lib. de ſympt. diff. cap. 3.

Helcydria, ideſt puſtula vlcerofa in capite genitæ, 1. de comp. med. loc. cap. 9.

Helioſis, ἡλιώσις, inſolatio, eſt corporis in ſole apri-
catio, Remediij genus eſt veteribus medicis uſurpa-
tum varijs modis, quo alij ad ſolem eiusque radios
exponebantur, ſiue ſtantes, ſiue ambulantes, ſiue
iacen-

iacentes, quo remedio præmissa per aluum euacuatione iuuabantur hydropici, Ischiadici, Nephritici, Paralytici, Elephantici, Cæliaci, Hysterice mulieres & alba uteri fluxione laborantes, & Cephalalgici, ubi ex eo auxilio, corporis perspirationem uberiorem, sudores, alui adstrictionē, adipis consumptionem, tumorum laxorum, tum maxime hydropicorum detumescētiā, facilem respirationem, omnisque superflui humoris absorptionem fuissent consequuti.

Helos, siue Clauus, est callosum tuberculum, albū, rotundum, capiti clauorum simile, toto corpore proueniens, sed pedum plantis, digitisque potissimum, & calcaneis, accidit, & oculis, sed vide Clauus.

Helodes febris, uide Febris helodes.

Helosis, est curua ac reflexa palpebrę euerasio, utroque oculi muscutorum conuulso, partemque; Tarsi sibi continuā, ad se ipsum trahente, quod in magnis morbis magnum malum significat, quam palpebrarum contorsionem Hippoc. vocat Campylon, 10. de vsup. cap. 9.

Helminthes, vide Elminthes.

Hemitriteos febris, ἡμιτρίτης πυρετός, semitertiana febris, vide Febris semitertiana.

Hemicrania affectio est dolorosa, circa dimidiam capitis partem, aliquando dexteram, aliquando sinistram, quae iuxta suturam sagittalem terminatur, & ut plurimum per circuitum exacerbat, plerisque; circa temporum musculos, dolentibus, quibusdam in
periti-

vertice capitis, quidam uerò adeo vehementer dolēt, ut ne manuum contactum facile ferant, in quibus pellicula Caluam ambiens, læsa est, diciturque aliquando heterocrania, Græce *ἡμιπάρια*, & *ἑτεροπάρια*, 2. de comp. med. loc. cap. 3. Estque & aliud Hemiplegia genus, quod Sphacelodes nominant, estque cōuulsorius, dimidiæ partis capitis dolor, 2. loc. aff. 7.

Hemiplexia, *ἡμιπλῆξια*, Paraplegiam significat, vide Paraplegia.

Hepar, quod & Iecur, est membrum princeps in dextro thoracis latere collocatum, venarum omnium principium, & primum sanguificationis, quam hæmatosim vocant, officina, & instrumentum, venarū omnium & nutrientis virtutis principium, 4. de vsup. cap. 12.

Hepatica uena, uide Axillaris.

Hepaticus affectus, (qui & Hepatitis nominatur, de symp. diff. 5.) est Iecoris imbecillitas citra pblegmonem, cum nutrimentum per uasa quæ in mesenterio sunt, ueluti per ora quadam, semicoctum attrahit, rursusque per eadem semicoctum ablegat in intestina; estque hæc excretionis species maxime similis loturæ carniū cruentarum, ac recenter enectarum, siue id quod excretum est, aquosum sanguinem dicas, atque hoc quidem symptoma semicoctorum ciborum, uomitioni in ventriculo ad portionem se habet, 3. sympt. caus. c. 2. Eos igitur qui sic affecti sunt, quibus uisceris ipsius uires fuerint imbecillæ, hepati-

cos uocat affectumque hunc, hepaticum fluxum, aliū à Dysenteria facit, 5. loc. aff. 7. Affectio igitur Hepatica appellata, ueluti etiam & Celiaca, & stomachica, citra tumores præter naturam, circa ipsas partes contingit; inflāmatū enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse medici dicunt, aut aliud quippiam tale, non tamen Hepaticum uocant hominem ipsum, cui tale quid accidit, 8. de compos. med. loc. cap. 6.

Hepiala febris, *ἡπιάλος πυρετός*, uide Febris hepiala.

Hepsēma, idest Sapa, uide Apothermon.

Herculus morbus, uide Comitialis.

Hermaphroditus, complexus est, masculini sexus & fœminini, simul etiam utroq; genitale proprium, obtinente, lib. finit.

Hernias, uide Ramex & Celas.

Herpes, qui & Serpigo nominatur, idest repens, inflammatio est ex syncera flaua bile, sui seruante naturam; quae si cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui Icteros idest regius appellatur, sola uerò quando secreta est, & in aliquo membro consistit, Herpes uocatur, quae si crassa sit totā exulcerans cutem, usque ad suppositam carnem, Herpes exedens, siue Esthiomenon, siue Phagedæna; si uerò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum ueluti deurens, generis sortitur appellationem, cum simpliciter & sine adiectione Herpes uocetur; Reli-

qua

qua uerò altera miliaris, quoniam paruę pustulae ac multę per summam cutem, similes milijs in ea excitantur; (atque hanc postremam Cenchriam Graeci uocant,) quae non protinus ulcus faciunt, quemadmodum alter, sed interposito tempore in ulcus habent, 2. Glanc. 1. & 6. aph. 45. Est quę eiusdem generis cum Erysipelate, atq; huius quoque magis cum eo quod exulceratum est, differunt autem humoris tenuitate; est enim admodum tenuis qui Herpetem excitat, unde ut non solum interiores partes, quę utiq; carnosae substantia sunt transeat, sed etiam cutem ipsam, ad summam usque cuticulam tum erodit, tum exedit; quando si hanc quoque sudoris uice transfret haud quaquam ulcus excitaret, 14. meth. 17. & 2. metho. 2.

Heterocrania, uide Hemicrania.

Heterogeneum, uide Dissimilare.

Heterorhythmum pulsum uocamus, qui alterius ætatis habet rhythmū, lib. finit. uide Pararhythmus.

Hexis, uide affectus, qui & schesis.

Hiatuli, qui & Hyatuli dicuntur, & Synodontes Graece uocantur, ij sunt quorum uenter interim in ore inuenitur, quod accidit in uehementiore appetentia, in qua uenter omnibus animalibus sursum procurrit; adeo ut non nulli cum primum incipere eū affectum sentiunt, foras repere sibi uentrem dicant, alijs uerò cibos, quod adhuc mandunt, nec dū satis eos ore cōfecerūt, eripit plane inuitis, 3. natu. fac. c. 8.

Hidroa,

Hidroa, pustule quedam genitalium partium sunt, summā cutem occupantes, & exulcerantes, 3. aph. 21. oriuntur, ut ipsum nomen ostendit, ab earum partium sudore bilioso & mordaci (ex mutuo attritu) qui per facile ijs in partibus putrescens pruriginē mouet, cutemq; uelut ulceribus exasperat. Dicuntur & Intertrigines, 6. de simpl. cap. de balaustio, Græci uocant ἰδρώα, & παπαρειμύατα, Plinius uocat Attrita, uide Sudamina.

Hidròs sudor ἰδρὼς, est humidum tertiæ concoctionis excrementum, per cutem in aquæ speciē erumpens, uide Sudor.

Himds affectus est Gurgulionis, cum longior. gracilior, sicciorque euaserit: talis enim Loro non inepte comparari potest; differt à Cionide quod in hac Gurgulio non extenuatus est, sed crassitiem ex fluxione maiorem ut plurimum adeptus.

Hippocratica facies, uide facies Hippocratica.

Hippocraticum scamnum est machina quaedam, quam Hippoc. consulit præparandam ijs, qui in aliqua magna urbe curaturi sunt, 1. de artic. 4.

Hippos, uide Equus.

Hirque, uide Anguli.

Homiomeres & homeomeres ὁμομερῆς, homogenee, idest similes, elementares, & primæ corporis nostri particule, 6. de sanit. tue. cap. 2. quas etiam prima corpora uocat, 8. de placit. 8.

Homonyma duplicia sunt, aliqua quidem nullo pacto in-

Et inter se communicantia, vt cum Canem dicimus terrestrem & marinum, atque hæc æquiuoca dicimus; alia verò quæ cum synonymis, idest vniuocis aliquatenus communia existant, cum ab vno factam appellationem habuerint, lib. 4. de vict. rat. 13.

Homoplata, quæ et Omoplata quas operas scopulas uocant, partes sunt quas ij, qui toto thorace respirant attollentes sensibilibus & notabiliter, ex difficultate respirationis, præcordia sursum trahunt variè & inæqualiter, 10. meth. cap. 8. vide Omoplata.

Homotena, vide Continua, & Epacmaistica.

Horam uocat Galenus, id tempus anni, in cuius medio caniculam exoriri contingit, 2. de aliment. facult. cap. 2. uide Fugaces.

Horarij fructus, vide Fugaces.

Horectica medicamenta, quæ fastidium auferunt, de Dynamid. in præm.

Hordeolus, est apostema nascens in extremitate palpebrarum, lib. de ocul. cap. 9. appellanturque Crithe, Hordeum, siue oculorum tuberculum, lib. de remed. par. fac. cap. 10. uide Crithe.

Horrida febris φερίως πυρετός, dicitur apud Hippocratem, 1. de morb. vulg. non simpliciter ea febris quæ cum horrore inuadit, id enim innumerabilibus accidit febribus, sed exquisitus hemitritæus, in quo videlicet magnam accessionis partem horrores occupant, eo maxime die in quo tertiana & quotidiana, continua simul concurrunt, 2. de differ. feb. vide

Febris Horrida.

Horror est inæqualis concussio totius corporis, & punctio, seu vulneratio summe cutis, & aliquando ipsius carnis ab humore tenui et acri, 3. de sanit. tue. cap. 5. & 10. meth. cap. 4. vide Frigus.

Humeraria uena est quae in superficie brachij exteriori collocata iuxta interiorē costam musculi Delthoidis ad extremum ipsius proficiscitur, 3. de anat. adm. cap. 5. quam Omicram Graeci uocant, 1. de anat. adm. cap. 11. dicitur autem humeraria vel humeralis quod obliquior à Clauicula sensim recedens se porrigat ad humerum, lib. de uenar. & arter. dissect. c. 6. eadem uena capitis, Cephalica, & uena cubiti externa dicitur, vide Cephalica.

Humerus totum illud est, quod apparet in ea dearticulatione qua superior humeri pars, quæ Epomis et superhumeralis dicitur ad Collum uergit & à posteriori parte ossi scapulae, ab inferiori ei quod dum totum Brachium attollitur manifestum fit, & ala nuncupatur, articulatur, 1. de artic. 4. & 62.

Humilis pulsus, uide latus.

Humor & succus non idem est; humor enim est humiditas quaedam, quæ in corpore animantis est, succus humiditas est, quæ in ijs fructibus, quibus vescimur, aut quos exprimimus, inuenitur, lib. de humor. com. 1.

Humor urinae, est id quod re ipsa urina est, sub quo nomine & substantia & color urinae continetur; præter

ter hæc quod in vrina reliquum est, inherens dicitur lib. de vrina, cap. 1.

Humorem mucosum, eū appellare cōsuevit Hipp. qui lentore quodam & albedine præditus est, qui ad exangues partes, idest ossa, & cartilagineæ cogi cōsuevit; cum imbecilla ita natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat, 3. de artic. 65.

Hyaloides humor Ὑαλοειδὲς ὕγρον, est humor oculi medius in ordine reliquorum duorum collocatus, qui & vitreus dicitur, & Hyelinos; qui quanto crassior & albior est sanguine, tanto à crystallino humore, humiditate relinquitur atque albedine, 10. de vsup. cap. 1. uide Crystallinus.

Hyatuli, uide Hiatuli.

Hyboma curuamen, gibbositas, Ὑβώμα, idem est ἀεκυρώμα, uox generalis est apud Hippoc. significans omnem vertebrarum euerfionem præter naturam, 3. de artic.

Hydatis, Aquula, substratæ superiori genæ pinguedinis augmentum est, qua fluunt præter naturam oculi, lib. finit. sunt autem Hydatidæ, humiditates ille, quæ circa vntuosa, & viscosa corpora per medium spatium, inter duas portiones tunicæ Periostrij adnascuntur, quæ corpora molliendarum sua pinguedine palpebrarum gratia, à natura fuerunt creata, 10. de vsup. cap. 7.

Hydatodes vinum, Ὑδατωδὲς οἶνον, est quod mul-

O 2 ta aqua

ta aqua dilui potest 5. sanit. tuend. cap. 12. quod vinum etiam Oenodes vocant, quod multam sustineat aque mitionem & imbecilles vires feriat, cui opponitur, *ὀυνόσπερον*, idest aquosum vinum, quod paucā sustineat aque mitionem, 7. meth. 6.

-Hydatoide, vide Crystallinus.

-Hyderici, qui & Hydropici, & Vtricularij dicuntur, lib. de atrabile, cap. 9. est que aqua inter cutem, 5. loc. affect. 7.

-Hyderos Phlegmatias, vide Leucophlegmatias.

-Hyderos, idest species Hydropis, quæ Anasarca dicitur, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Hydragoga medicamenta sunt, quæ aquam vtricularijs, Hydropibusque educunt, lib. de atrabil. cap. 6. Inde Hydragogia, idest, aquæ ductus, sanguinis lationem per venas, nomine à similitudine fluminis ad riuos translato, significat; qui fit spiritu, una cum caliditate per uentrem exeunte, ac deinde secum confractas nutrimenti particulas, deferente, Gal. in Timæum Platonis, fol. 578.

-Hydrælaum, est compositio ex aqua & oleo, & Agælaum, incerta autem & multiplex mistura ratio, ad dolores capitis ex febre, & vomitionibus conueniēs, 2. simplic. 25.

-Hydreteroceles, Herniæ species est composita, quando videlicet, una cum intestino, aquosus humor in Scrotum descenderit, lib. finit.

Hydro-

Hydrocele, vide Enteroccele, Celas, & Sarcoccele.

Hydrocephalon, est humoris aquosi, vel fæculenti sanguinis collectus tumor, in parte aliqua corporis eorum, quae caput concinnant, lib. finit. Est autē is humor piger & deses tribusque in locis colligitur, aut inter Cutem & Pericranium, aut inter Cranium & Pericranium, aut inter cranium & Cerebri membranas, aliqui addunt ex Aetio, quartum locum, inter Cerebrum & eius membranas, sed tunc nullam recipit curationem, puerulis maxime familiaris morbus est.

Hydromphalon, coitio in umbilico est, lenti humoris, qui sub tunica quoque interdum continetur, lib. finit., Græce Ὑδρομφάλον.

Hydrophobus, idest aquæ timidus, Ὑδροφοβός, est is qui ex morsu canis rabidi, aquam reformidat, 9. meth. 5. inde Hydrophobia, idest, aquae timor, vide Psycrophobus.

Hydropici, uide Hyderici.

Hydrops, Ὑδρωψ, est aqua inter cutem, in quo per eam extentam, siue aër, siue humor aliquis in profundo locatur; si igitur in membrana abdominis interiore, Peritonæo Græce dicta, aër recludatur, fit Hydropis species quae sicca ab Hippoc. vocatur, si verò humor, fit Ascites, qui & hydrops aquosus ab eodem dicitur, 4. apho. 11. Eius tres sunt species, prima Ascites ἀκνίτις, quae fit cum inter membranam Peritonæum, & intestina, plurimus aquosus humor

coaceruatur, qui locus, aquoso humore, vtri modo impletus uideatur, unde & vtricularem appellant, Barbari corrupta uoce *Asclitim*. Altera *Tympania* *Τομπάνια καὶ Τομπάνιτις*, dicitur, qui sit ubi flatus ac spiritus copiosus, in iisdem ventris locis congregatur; Hoc nomine à Tympano omnibus notissimo instrumento, appellata est, si enim pulsetur venter inferior, instar Tympani sonum edit. Tertia *Anasarca*, *ἀνασάρκη, ὑποσάρκη, καὶ λευκοπνευματία*, dicitur, fit q; quoties per totum corpus humor pituitosus disseminatur, ut instar spongiarum, aut papyri, uniuersa caro permadida appareat, ideoque in ea totum corpus intumescit, ac mortuo simile euadit.

Hydrops aquosus & siccus, uide Hydrops.

Hydrops matellæ, uide Diabete.

Hydrops, in uas urinale, uide Diabete.

Hyelinos, uide crystallinus.

Hygia, idest sanitas, quae est affectio, constitutioque partium, cuius ope, functiones secundum naturam edimus, i. meth. 9. Inde Hygine salubris medicinae pars est, quae sanitatem tuetur, & imminentes morbos praecauet, lib. Introd. cap. 7.

Hygrocyfocete, idest aquosus simul, & varicosus ramex, est dilatatio vasorum testem nutrientiū, & lenti humoris in Scroti aliqua parte, collectio, lib. finit.

Hymen, Hymenæon, uide Colliculum.

Hyoides, siue Hypsiloides siue lambdoides à simili-

litudine, quam cum Υ , & Λ , Græcis literis obtinet, dictum, est os capiti gutturris incumbens, rectum secundum colli longitudinem, & leniter cauum, lib. de muscul. diff. cap. 13. quod & Pharyngetron vocant, lib. de vocal. instr. diff. cap. 6.

Hypelata, Catoterica, siue deiectoria medicamenta sunt, quae renes, uesicam & gibbam iocinoris, cum multo uitioso succo sunt referta, expurgant, 7. metho. 13.

Hyperbolica figura corporis est, quoties quatuor membra Græce $\kappa\alpha\lambda\alpha$, idest crura ac manus aut summe extenduntur, aut immodice inflectuntur, aut spina, cuius partes vertebrae quoque in ceruice existunt, 1. progn. 13.

Hypercatharsis, $\Upsilon\pi\epsilon\rho\kappa\alpha\theta\alpha\rho\sigma\iota\varsigma$, superpurgatio, immodica est ex medicamento purgatio, in causa est uis nimia medicamenti, quod uasa ad ventrem attinentia mordens, et aperiens, & continenter irritans atq; conuellens corpora, vasorum uires dissoluit. In qua primum flaua bilis, deinde pituita, demum atra bilis, postremo sanguis, quem natura habet familiarissimum, excernitur, initio tenuissimus, demum crassissimus, vide superpurgatio. Si uero humoris uel sanguinis euacuatio, sponte fiat, quam natura grauita, uel sanguinis, uel humorum multitudine, ad ipsius & ipsorum euacuationem excitata, modum obtinere non ualens, facit, Hypercrisis dicitur, seu supernacuatio, 3. prorrh. 53.

Hypercrisis, vide *Hypercatharsis*.

Hyperoa, Ὑπεροα, est pars oris superior, modice concava, foraminulis pertusa, quibus à Cerebro pituita ad os descendit Latine palatum, & Basis Cerebri, osse sphenode firmata.

Hyperfarcion vlcus est, cui caro supercrescit, ueluti *Hyperfarcosis*, carnis excrescentia, Ὑπερφάρκωσις Græce, 2. meth. 2. & 3. meth. 6.

Hypezochotes membranae, siue subcingentes sunt, quæ tela araneorum similes, natura simplices, inter nam utranque thoracis regionem subcingunt, quæ uero rectæ ad iugulum usque perferuntur, Diaphragmæ, idest intercipientes, siue intersepientes, ubi pulmonem coherescunt, huius operimentum dicuntur, 5. de anat. adm. cap. 8. quas etiam tunicas omnium spirationis instrumentorum, uocat, 7. de anat. adm. cap. 2. vide *Cingentes*.

Hypnoticum medicamentum, est, quod somnum conciliat Ὑπνωτικόν, soporem quæ siue Cataphorâ epotum, molitur, refrigerat enim corpus, & sensum eò usque stupefacit, ut si paulo liberalius ebibatur, mortem afferat, 5. simpl. cap. 19. vide *Narcoticum*.

Hypocaustata, idest fomites, alimenta nominans, iuxta omnium philosophorum dogma, qui eorum quæ animalia constituunt elementorum, ignem maximè, vitæ esse causam existimarunt, qui suis pabulis, alimentis alitur, ut lucernæ flamma oleo, 1. aph. 14.

Hypocheomenes, idest suffusi, 6. de sanit. tue. c. 9.

Hypo-

Hypochondria, idest *subchartilagia*, sunt partes illæ, quæ sub ventriculi ore, ad partem exteriorẽ apparent, quoniam secundum rectitudinem sub *Chartilagine*, idest post *chartilaginem* habentur, sunt autẽ muscoli, qui expansi mēbranæ præcenni ueluti *Ara-næ*, quam *Peritonæon* vocant, subiacent, extrinsecus verò cute conteguntur; *Aequiuoco* autem cū his vocabulo etiam interiora uiscera vocamus *hypochondria*, quoniam, & ipsa sub *chartilaginibus* nothariū costarum ab interiori parte existunt, sed exteriora proprio, lib. *Introd. cap. 10.* in priori significato dictum, febres ab *Hypochondrijs* moderate, idest omnium februm acutarum, quæ ab *Hypochondrijs* profiscuntur sunt mitissimæ, in posteriori significato, quando sub hac uoce *Hypochondria*, complectimur, ventrem iecur, lienem, & septum transversum, quædam malignæ, quædam mites sunt, com. 2. in 3. de morb. vulg. Atque in hoc secundo significato, *hypochondrion*, ὑποχόνδριον, ab *Epigastrio* nō distinguitur.

Hypochondriacus, siue flatuosus affectus, qui & simpliciter *Melancholia* dicitur; morbus est ex tertio melancholicæ generis, à uentriculo ortum ducens, prauis symptomatibus infestatus, quem sequuntur metus & mēstitia, qui alui deiectione, vomitione, proba concoctione, & ructibus lenatur, 3. loc. aff. c. 7. Græce ὑποχονδριακὴ μελαγχολία dicitur.

Hypochyma, (quæ & *Hypochisis*,) est crassi humoris in cornea membrana, uel inter corneam tuni-

cam,

cam & crystallinum humorem, iuxta pupillam concretio; qua in re, Hypochymatos et Glaucomatos differentiam recentiores posuere, dicentes τὸ Υπὸχυμα, non aliud esse, quam humorem illic concretum; γλαυνώμα autem alterationem esse humoris crystallini, in glaucum colorem ab humiditate quādam intra ipsum contenta, aliunde adueniente, cū tamen ueteribus medicis, idem esset uterque affectus, nec tamen hoc solo differunt, sed etiam quod omnes suffusione laborantes, lucem videant aut multam, aut paucam, qui vero γλαυνώμα, quique ἀμάρωσις, patiuntur, lucem omnino nullam cernant. Est autem suffusio duplex, una propriè dicta, quæ est oculorum per se suffusorū morbus ab humore crasso pupillam obscurante; altera vero impropiè, in qua oculi non primò & per se patiuntur, sed uisa quædam visis propriè suffusorum similia representant, quæ est per consensum suffusio, (ut illa per essentiā) siue à uentriculo sursum ad oculos ascendendo, siue à Cerebro deorsum, siue à toto corpore ut in febribus, vide Glaucofis.

Hypogastrion, uide Abdomen.

Hypoglossis, medicamentum est, leniens, leuigās, & remittens asperitates asperæ arteriæ, in quibus si quid inflammationis reliquum est, id concoquit & persanat, quod medicamentum, quia lingua subditur, coque paulatim liquecente, asperæ arteriæ summū madescit & irrigatur, ob id Υπογλωσσος dicitur, de quibus Gal. fusè, 7. de comp. med. loc. vide Arteriacæ. Hy-

se. Hypoglossis etiam dicitur inferior linguae pars, quae subiectam attingit maxillam.

Hypophorae sunt fistulae & vitia profunda, et quae dehiscant, ut sinus, ulcera, aliaque huiusmodi omnia, quae ex defectu repletionem desiderant, atq; indicant, lib. Introd. cap. 3.

Hypophysis, seu Hypochysis, idest suffusio, 3. meth. 2.

Hypopyus vocamus, quibus pus in oculis congregatum est, quod vacuari solet, diuisa ea tunica, quae cornu est similis paulò supra locum quo committuntur inter se tunicae vniuersae, quem Graece alij Irim, alij Stephanon, alij Coronam uocant, differt quae ab Hypochymate, in qua non pus, sed leuis quaedam nebula tunicis oculi interponitur, 14. meth. cap. 19. Quod aut Hypopyon, sub oculis fiat, nomen ipsum indicat, idem .n. est ueluti si quis Hypophthalmiū dicat, quod ipsum sub oculis sonat; Est autem ex genere effusionum, Echymomatum appellatarum; Appellant ita Hippoc. & alij multi medici, circa cutem affectionem, cum tenuibus in ipsa uenis contusis, sanguis per fissuras effunditur, non uno loco aceruatum, ac statim ita excretus in grumos coiens; sed postquam per persultationem, hoc est, Diapedesim, effusio ista est facta, tunc enim temporis progressu, contingit liuescere & denigrari, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis, 5. de cōp. med. loc. cap. 1. & lib. de virtute Centaureae cap. 4., ὕπυς

ὕπωψος ὕπωψος Græci vocant. ὕπωψος H . 22

Hypophthalmia, & Hypophthalmium, vide Hypopyus.

Hyposarca, quæ & Hyposarcidium, & Episarcidium dicitur, species hydropis est, in quâ habitus totius corporis, pituita plenus redditur, 4. de rat. viſt. 111. vide Anasarca.

Hyposphagmata, plagas oculi illatas, & oborientes ex eis cruentas suffusiones, appellant, 4. de comp. med. loc. cap. 8. species τὴν ἐν ὕμῳ ὕψος.

Hypospadiæi, ὕπωσπιδῖαι, ij sunt, qui quod ob id vinculum, quod ad finem virgæ habent, eis meatus seminalis est contortus, generare non possunt, non quod semen fecundum non habeant, sed quod in virgæ flexibus hærens ferri prorsum nequeat, quâ rem curatio ipsa comprobat, vinculo enim abscisso generant, 15. de vsup. cap. 3.

Hypostasis, siue sedimentum est id, quod in vrina residet, tanquam crassior vrinæ portio, secreta & subsidens, lib. de vrinis c. 16. licet generaliter quicquid subsidet, atque in imo, cuiusque liquidioris excrementi subsistit, hypostasis est; quæ crassior vrinæ pars, si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula, si ad mediam regionem Suspensum, si profundiore parte inferiorem locum occupet, dicitur Hypostasis, ibidem cap. 21. Quæ si diuulsa non sit, sed continua, apud Hippo. dicitur plana, quod si per omne tempus sui similis est, ita ut si vno die sit cocta, sit etiam

etiam postero die, & quæ sedimentum & humorem
vrinarium habet non distantem à se, sed totum sibi
æqualem; quæ quæ continuo sibi similis perseuerat,
æqualis apud Hippoc. dicitur, ibidem cap. 38.

Hypsiloides, uide Hyoides os.

Hypothenar, idest subuola, pars ea manus est, quæ
opponitur volæ manus, quæ Thenar dicitur, lib. In-
trod. cap. 10.

Hystera, idest uterus, vulua, Matrix, vas fœtus
gestandi; foris neruosum, intus carnosius, dicitur quæ
à Grecis ὕστερα, quod postrema sit partium omnium;
lib. finit. Vnde Hysterica mulier, idest ab utero suf-
focata, siue hunc affectum vteri suffocationem, siue
spirationis ob vterum ablationem vocites, quo inter-
dum mulieres, sine sensu immobiles iacent, cum nul-
lo aut paruo, aut obscurissimo pulsu, interdum sen-
tientes & moueri potentes, atque integra ratione; ta-
men animi defectione, & difficili spiratione laboran-
tes, alias etiam crura & brachia contrahunt, 5. de
loc aff. 5. quas etiam vterarias vocāt, idest vtero la-
borantes com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. vnde Hyste-
ralgia, vteri dolor: Hystericus Typus, & morbus, ac-
cessionis est retardatio cum posterior accessio serius
inuadat quàm præcedens.



I



IANITOR, uide Pyloros.

Ianitrix vena, idest vena Porta, 6. de placit. c. 5.

Ichor

Ichor est tenue excrementum *ulceris*, ut *sordes* crassum, 3. metho. 3. vocat etiam *Ichores* Hippoc. tenues acres, & mordaces sanguinis humiditates, 4. de rat. vict. 2. Appellat adhuc *Ichores*, superfluas sanies, quas corpus acervat, ex quarum vapore non solum capitis dolores non nullis oboriuntur, sed etiam suffusorum, quos *Hypocheomenos* vocant symptomata, aliquibus verò & *Comitialis* convulsio, 6. de sanit. tuen. cap. 9. Dicuntur adhuc *Ichores* fluentes humiditates ex *Coryza* & *Catarrho*, 2. de rat. vict. 44. Græcè igitur ἰχὴρ dicitur, ex Latinis quidam vertūt, serosum humorem, quidam aquosum, quidam tenuē, alij uerò saniem interpretantur. *Ichoroides* autem sanguis non simpliciter tenuis & aquosus ab Hippo. vocatur, sed qui uenenosa aliqua & maligna facultate præditus sit, unde *Galenus* ex *Platone*, *Ichor* autē sanguinis quidem serum, mitis: nigra uerò bilis, acris & ferus. *Ichoroides* itaque sanguis uocatur, in seipso prauā ac tenuem humiditatem continens, mordacem & erodentem, non aqueam & morfu carentem, com. 2. in 6. de morb. vulg. 38. uide *Sordes*.

Icteros est inflammatio ex flaua bile, sui seruante naturam, unā cum sanguine per totum corpus delata, 2. Glauc. 1. sic dictum hoc malum, uel ab aue quae Græcis *Icteros*, Latinis uerò *Galbula* dicitur; hæc. n. si spectetur, sanari malum dicunt, & auem mori, uel ab aue, quae *Ictinos* ἰκτινός Græcis, *Milvus* Latinis appellatur, oculi siquidem hoc uitio laborantium, milui-

*miluini oculis similes, hoc est auri colores videntur; vel à mustella syluestri, quae auricolores oculos habet, & Grecis *Λυτρίς*, Latinis *Viueria* nominatur, qui & Regius morbus dicitur, quoniam mulso, quod genus potionis in Regum delitijs erat, curabatur, rebusque omnibus hominis mentem exhilarantibus.*

Aurigo quoque nominatur à Celso, ab auri colore, quem bilis per uniuersum diffusa corpus, refert. Arquatus denique nuncupatur, quod caelestis arcus similitudinem, colore, agat.

Ictus, est arteriæ motus tactui occurrens, interuallum autem est tempus interpositum inter duos ictus, quo distenditur, contrahiturque arteria, de Pulsib. ad Tyrones cap. 4.

Idea morbi, idest morbi essentia, 3. de cris. 4.

*Idiopathia *ιδιοπάθεια*, proprius affectus est, qui & *πρωτοπάθεια*, idest primarius affectus dicitur, ex aduerso diuisus ab affectu per consensum, seu per uiciniam, & secundarium, seu posteriorem; Ei uero qui per consensum infestat, qui *συμπάθεια*, *συντεγοπάθεια* dicitur proprium opponimus, 1. loc. aff. 3. Per consensum autem affici tribus modis membrum aliquod dicitur, uel propter uiciniam, uel propter familiaritatem generis uel operis, generis ubi neruosum neruoso, uenosum uenoso consentiat; operis cum mammae & thorax, partibus genitalibus, co. 3. in 3. de morb. vulg. 4. uide Sympathia.*

Idiosyncrasia, idest corporum proprietates & conuenien-

uenientia, 3. metho. 2. & 7.

Iecur, vide Hepar.

Iecoraria vena, vide Cava vena.

Iecoris vena, vide Choledochos.

Ieiunum, secundum est intestinum in ordine, quod à Duodeno intestino quod vocant, multifariam in orbem conuoluitur, vasorum complurium serie contextos, dicitur autem Ieiunum, quod semper cibo vacuū reperiatur, 6. de anat. adm. cap. 9. quia propter Νήστις hoc est ieiunum appellatur, quod semper inane permaneat, nec tantillum quidem, in se ipso alimenti continereat, 5. de vsup. cap. 3.

Ignem suo more Hippoc. febrem vehementissimā appellat, com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Ignis sacer, idest Erysipelas 8. de placit. 4. & lib. de purg. med. fac. cap. 5. vide Sacer ignis.

Ile, idest, Κενεόν, locus appellatur, qui est inter thoracem, & os coxæ, propterea quod Κενεόν, idest, cassum & uacuum, idest depressum est, 2. de his que in medic. 16. quem locum etiam Græci Λαπάρεν, appellant, qui inter thoracis, & iliorum ossa subsidet, propterea quod eo loco cingulum circundatur, vnde & Λαγόνας ισχίων etiam nominant, 2. de fract. 70.

Ileon εἰλεόν, intestinum est ordine à uentriculo tertium, quod incipit ubi ieiunum desinit, diciturque εἰλεόν, à multis anfractibus & circumuolutionibus, idem uerò & λεπτόν, hoc est tenue, simpliciter dicitur, nomine duobus etiam superioribus communi.

Aqua

A qua parte affecta obstructa & inflammata, nomē desumpsit is morbus peracutus, qui Ileos, Graece εἰλεὸς appellatur, sed nihil vetat in crassiori subsequēte intestino, eundem affectum, progigni, sed mitiorē & minus mortiferum, com. 2. in 3. de morb. vulg. licet aliqui eundem in pleniore intestino factum vocent εἰλεὶν, in tenuiori εἰλεὸς, (cum prius χορδαίος diceretur) quod per eum intestina conuolui videantur vnde quidam Latine Voluulum dixere, Chordapsium autem; quod qui manum loco dolenti admone-rit ex tensione, chordam attingere uideatur, 3. aph. 22. & 6. aph. 44.

Ilingus, est tenebricosa vertigo, quæ fit cum humor, cum crasso spiritu, in capite mouetur, & iccirco præcedit Epilepsiam & Apoplexiam, 3. aph. 17.

Illegitimæ costæ, quæ Nothæ, spurie, & mendosæ dicuntur, 5. de anatom. adm. c. 1. cartilagineæ admodum existentes, sunt quatuor vltimæ costæ, quæ ad pectoris os non pertingunt 8. de anat. adm. cap. 1.

Illisio, vide Collisio.

Illosis & Strabismus seu Strabilismus, sunt inuitæ musculorum palpebras mouentium, concussionēs, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Iliū, λαγύνων ὀστέον, est apophysis ossis sacri superna, & ampla continens intus ventris imi partem plurimam, tangensque ilia. Os enim sacrum tres habet apophyses rectas, nec deorsum, nec sursum repentes, ilium, coxæ & pubis, tamen os totum, saepe os

Illium vocamus, quod id inter cetera magnitudine et crassitie præpolleat.

5. *Imas, vide Gargareon.*

5. *Imbecilla corporis pars est, vel quae natura est in temperantior, vel quae ex precedente aliquo morbo, intemperiem contraxit, vel quae in praesenti tempore, in hanc sit perducta, promptius vero in iis superuacuum, quaecumque id sit, in agram partem fertur, 1. meth. 20.*

3. *Immutatus morbus est, cuius longior est accessio, & minor satis remissio, quo genere antiqui Typum quotidianarum, & semitertianarum reponebant, lib. de Typis, cap. 3.*

1. *Impetigo λεχῖν, est summe cutis asperitas cum multa prurigine, lib. finit. Agrestes vero impetigines nominant, cum à medicamentis imbecilliter siccantibus, nihil iuuantur, à validis irritantur, 6. de comp. med. per gen. cap. 2. Ea autem impetigo, quae cū pruritu fit, & si non aspera, lenior quam vel Psora, uel lepra est, adeò ut si sola salina quotidie defricetur, sanescat; sed ubi increuerit, extremam cutem in furfures resoluens, in psoram transit, atque deinde in lepram, ubi pro furfuribus, piscium quasi squamulae concrescunt, 5. de comp. med. loc. cap. 5. & cap. 7. (Nec est is morbus, quem Gallicum, seu Neapolitanum, seu Hispanam scabiem vocant, ut alibi mihi forte ostendendum erit.) Ceterum λεχῖνος, Lichenis nomine, illum etiam Impetiginosum morbum, Mentagran*

tagram Romanis appellatum; multo magis ferum & agrestem, Plinius comprehendit; non squamis ut tepra; sed fædo cutis furfure; totos primum vultus; deinde verò & Collum pectusq; & manus occupante, oculis tantum immunibus. Celsus liehenem, non impetiginem interpretatur, sed Papulam, cuius duas, quas habet & Liehen; differentias statuit, feram et mitiorem, Nam quæ ab eo describitur Impetigo, Lepra est.

Impetum facientia, uide Continentia.

Implicatus affectus est, in quo multe sunt affectæ partes, nam potest idem homo, non solum laborare ex Thorace, sed etiam ex pulmone, Capite, uentre Iocinore, com. 2. in 3. de morb. vulg.

Imum uentrem vocat Hippoc. regionem ventris imam; quæ umbilicum ac Pudenda interiacet, ita ut in hæc tria totum abdomen diuidatur, in Hypochondrium, & loca ad umbilicum attinentia, & Imum ventrem, 2. aph. 35.

Inequalis & Inordinatus pulsus est, cuius circuitus nullus prorsus seruatur; Est uerò inæqualis & ordinatus, quando ictus pari semper numero, paribus pulsibus procedentes, intercurrit vnus impar, qui equalitatem corrumpit, proportionem circuituum, quemdam ordinem seruante, de puls. ad Tyron. cap. 6. Inæqualis autem deficiens pulsus est, in quo nulla seruatur equalitas, motuq; ipso semper deficitur, 1. de differ. puls. cap. 12.

Inanes illas corporis partes vocari in more est, quæcunque inter extremam Thoracis costam, & femoris Ἀκρόες ossa habentur; atqui inanis uidetur omnis talis sedes, si eam cum supernis, infernisque partibus, utrisque osseis conseras, 2. progn. 1.

Incesiones, Hippocrates uocat, Inflammationes, unde etiam nomen calidis tumoribus impositum est, 3. de his quæ in medic. 30.

Incidentes dies, uide *Decretorius*.

Incisio, uide *Vnionis solutio*.

Incisorij dentes, uide *Dentes*, & *Tomi dentes*.

Incoctionem vocat Galenus, non coctionis tantum in ventriculo frustrationem, sed in uasis quoque & Iecore, & mole vniuersa, lib. de med. art. const. cap. 15.

Incrementum morbi, uide *Ascensus morbi*.

Increescens, uide *Continua*.

Incubus, uide *Ephialtes*.

Incuruatio, quæ & *Gibborositas* dicitur, est distortio spinæ in posteriorem partem, ex Panis & Tuberculis immnaturis in spina exortis magnis & duris, & diuturnis existens, ut non nulli arbitrantur, 3. de artic. 2.

Index digitus est, qui prior à Pollice est, qui nomen ab usu sortitus est, lib. Introd. cap. 10. Dicitur et *Index* is dies, qui eam habet naturam, ut qualis nā dies, cuius est index sit futurus, indicat, 1. prorrh. 1. & 2. aphor. 24.

Indi-

Indicatio, est iuuantis comprehensio, simul cum comprehensione nocentis adueniens, sine obseruatione & ratiocinio; ad Thrasib. cap. 11. Quippe ipsam sequentis, siue agendi insinuationem, indicationem dicimus. Ergo ex ipsa rei natura exordiri, atque ipsa quod sequens sit, citra experientiam inuenire, id est indicatione inuenire; Vt si queratur de sanitate, quid sentiendum sit, primum perpendere oportet, sanitatis naturam, quæ quia bona omnibus mortalibus videtur, facit ut iudicemus eam, à nobis seruandam esse, quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem uero et in morbo agendum, qui quoniam totus præter naturam est, & toto genere malus, indicat et ostendit, se tollendum esse.

Indicatoria, uide *Prognostica*.

Indices, & spectabiles dies consueti more appellat Hippoc. in quibus signum aliquod indicationis apparet, alio quopiam ex diebus decretorijs future, quos ipse, 3. progn. 4. per quaterniones digessit, singulis septimanis bipartito sectis, 2. aph. 24. qui Graece *ἐνιδικοί*, & *θεωρητικοί*, hoc est indices & contemplabiles nuncupantur, quod maiorem uim & potestatem habeant, ad præfagiendam, contemplandamq; futuram crisin, quàm ad iudicandam, licet in eis aliquando perfecta crisis possit accidere, ut dies quarta, undecima, decima septima.

Indicia, & signa certa illa sola nominantur, ex quibus licet certo colligere aliquid de salute & inter-

necione infirmi, quae comprehendens uno capite dicit aliquis esse significationes uirium gubernantium corpus, quo pacto robore ualeant, aut deficiant, in quibus scilicet cruditatis etiam, aut coctionis signa continentur, 3. progn. 39.

Inflammationis nomine solent Graeci, uti ad partes quae in maiori tumore sunt, carnosas, intentas, renitentes, pulsanti & calido dolore dolentes, & rubentes, lib. de tumor. cap. 2. quae fit uel propter coincidentiam, uel propter impactionem, obstructionemque omnium uasorum, siue ob circumstantiam quandam molium, quae meatus occupant, siue abundantia quaedam sanguinis oborta inflammatione, in particula constituitur, lib. de totius morbi temp. cap. 3. Dicitur adhuc Inflammatio Phlegmone, & Phlogosis, idest inflammatio. Est igitur inflammatio nomine generis, immoderata caliditas; nomine autem speciei, idem nomen cum genere obtinentis, est cum sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obtinente ad particulam aliquam uniuersim fluente, atque ob multitudinem conculcato, uehemens dolor arripit hominem, nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit, pulsusque in profundo molestus accidit, tendique omnino ac contundi membrum apparet, & uehementem calorem persentit, adeo ut comburi uideatur, & refrigerari desideret; talisque rubor per summa uiget, qualis ex balneis accidit, aut ex igne, aut quouis alio modo calefactis. Multaeque sunt huius species, nam fluente
sanguis-

sanguine altera, flava bile altera, ambobus que simul humoribus alia tertia, 2. Glauc. 1.

Inflammen, uide Inflammatio.

Inflammata lassitudo musculorum est affectio, que manibus, cruribus, lumbis, spine & musculis ubi plurimum laborem pertulerint, accidit, ijsque qui ex uehementi clamore, organa uocis, idest arteriam, eius summum & fauces oblesas habent, uocemque rauca effecerunt, 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Inflatio, uide Physis, 14. meth. 7.

Infundibulum, uide Choana.

Infractiones oculorum, idest cum palpebre inuertuntur, com. 5. in 6. de morb. vulg. 2.

Inion, est ea capitis pars quae occiput dicitur, principium medullae spinalis, ad stipitis modum in multos ramos diuisa, in sexaginta ferè, iuxta numerum, neruos, 2. de comp. med. loc. cap. 1. Το ινιον terminatur sutura λαμβδωειδῆ.

Initiatrix, uide Antegressa.

Innominatus morbus est, qui medio loco, inter Lethargum & Phrenitim collocatur, in quo aegri conuiuent oculis, somnolenti stertunt, oculis fixis intuentur, difficiles & tardi ad respondendum, stulte loquuntur, & temere nugantur; lib. de Puls. ad Tyron. cap. 11. quem affectum cum longo tempore perdurauerit, Typhomaniam uocant, 1. prorrh. 1.

Innominata Charilago, uide Cricoides.

Innuens, circumnuens pulsus est, qui inaequalis

est in una distentione, 1. de differ. puls. cap. 20. & 4. de caus. puls. cap. 10.

Inordinata febris est, quae non certo quodam circuitu redit, 5. de placit. cap. 2. quae & Erratica dicitur, 8. de placit. cap. 6. vide Erratica.

Insanire, est desipere citra febrem.

Inspiratio est externi aëris intus attractio, 4. loc. aff. 7. ad nativi caloris conseruationem, & spiritus animalis nutritionem, 7. de usup. cap. 9. quae duplex est, lenis, & coacta, lenem & non coactam appellant, quae in bene ualentibus, nullaue uehementi agitatione motis cernitur; Coactam uero quae tum in morbis non nullis, tum in exercitationibus paulo uehementioribus accidit, in qua protinus omnes etiam scapularum partes simul attolli conspiciuntur, 2. de placit. c. 4. Inspiratio et expiratio, ἀσπρὸν καὶ ἐκπρὸν, oppositi motus sunt; ille est, quo distensus Thorax per asperam arteriam, necessario in os aërem exteriorem attrahit, tribus de causis, ut refrigeret, ut uentilet calorem natium, & ut spiritum animale gignat; Hic quo thorax contractus eundem aërem exprimit, ut quicquid in ipso fuliginosum, fumosumque ex humoribus creatum fuerit, id exprimendo elidat: Vtriq; nomen Respiratio & Respiratus ἀναπρὸν, 4. de loc. aff. 7. Per inspirationem autem, attrahit in se homo exteriorem aërem, per os in pulmonem, per raritatem autem cutis & carnis in arterias. Horum motuum uterque, tam quo per os, quam quo per cutim fit aëris attra-

attractio, uno nomine Inspiratio appellatur, Per expirationem verò per eosdem meatus, per quos aerem recipit, adhuc remittit; qui cum per os remittitur expirationis, cum per cutis meatus transpiratio, Perspiratio, disflatio, Transpiratus, Perspiratus, disflatus, *Ἀπνοὴ* dicitur, 8. de placit. cap. 8.

Instrumenta prima censentur, quæcunque ex similibus partibus coalescentibus, vnius operationis gratia sunt constituta, quæcunque verò rursus ex his componuntur, etsi uni totius instrumenti actui quàm maxime obseruiant, inter secunda connumerantur; musculus enim et uena et arteria, inter prima instrumenta numerantur, digitus verò inter secunda, atq; hoc magis pes, & pede magis trus. lib. de morb. tēp. cap. 4. Vnde Instrumentales corporis partes sunt, Cerebrum, Cor, Pulmo, Hepar, venter, Splen, Oculi, Renes, ibid. cap. 3. Instrumentales autem morbi sunt, uel naturali harum partium formatione permutata, uel non seruato numero partium opportuno, aut unicuique parti conuenienti magnitudine, vel quod non ut naturalis positus expetebat, ipsæ cohereant, ibidem cap. 6. vide Similare.

Insultus accessionis, est indiuisibile illud tempus, quo accessio primum inuadit, quod alij febris significationem, annotationem, & Episemiasiam vocant, lib. de morb. temp. 6.

Intemperies morbosa, Græcis vocātur *διονόμοια*, partium similarium morbus est, sitque ubi qualita-

tes prima, seu elementa ipsa, à naturali symmetria, & commodatione defleunt. Non autem citra rationem, adiectum est morbosa; duplex enim existit intemperies ex Gal. 2. de temperam. alia enim est naturalis seu sanitatis, & alia morbi (ut nos tetigimus in nostra Synopsi medicinae quâ anno superiori typis dedimus, tabul. 5.) Sanitatis siue naturalis est, quæ à media tēperie paululum abest, vel in qua nulla functio animalis adhuc manifeste læditur, licet imbecillior reddatur, intemperatior sane erit, sed non egrotabit homo. Quod si quis hoc denegauerit, horum alterum fateatur necesse est, uel omnes homines egrotare semper, uel unam esse omnium intemperiem, utrunque uero absurdum est. Morbosa uero Intemperies est, cum animal intemperamenti uitio agrotat, quæ si omnibus corporis partibus æqualiter insit, ut in Hethica febre, equalis intemperies appellatur, & dolorem non efficit, secus doloris sensum efficit, & inæqualis dicetur, ut docet Gal. de inequali intemp. 1. de sanit. tu. lib. de constit. art. et cap. 8. artis paræ.

Interceptiones venarum, quæ Apoplepsis Græce dicuntur, sunt oppletiones quæ à copia exoriuntur, quæ cum supra modum oppletæ fuerint, premi virtutem, grauarique est necesse, atq; in extinctionis agi periculum natiuam caliditatem, quæ ob multitudinē, copiamque suffocationi quippiam simile patitur, 4. apho. 23. Vbi uero intercipiuntur quæ sunt in animali arteria hoc est, ita oppletæ sanguine fuerint, ut

nul-

nullus in ipsis vacuus relinquatur locus, in quem diu
attolluntur, aërem externum attrahere possent, tunc
strangulatur atque extinguitur calor innatus: at qui
ita affecti sunt, subito sensum & motum totius corpo-
ris amittunt, lib. de caus. morb. cap. 3. nequeuntibus
spiritibus naturales pertransire meatus, atque ob id
ab Hippoc. interceptiones spirituum nuncupantur,
4. rat. uitt. 27.

Intercidentia, uide Coincidentia, & Parëptosis.

Intercidentes, uide Decretorius. Intercidens aut
pulsus est, cum inter duos ictus, qui ordine proprio
inferuntur, ictus medius intercurrit, lib. finit.

Intercipientes membranae, uide Cingentes, et Hy-
pezochotæ.

Intercostales muscoli, μεσοπλευροὶ μύες, sunt mu-
sculi inter medias costas siti, quorum bini sunt in sin-
gulis costarum interuallis, alter externam partem spe-
ctans, alter interiorem; externi thoracem dilatant,
ad inspirationem; interni contrahunt ad expirationem,
5. de caus. respir. 8. de anatom. adm. & 7. de vsup.

Intercurrens pulsus est, qui inequalis est, inequa-
litate crebritatis, 1. de diff. puls. cap. 12.

Interfemineum, quod Perineon Græci uocant, est
media illa pars corporis, quæ inter totum id, quod
inter inguina utriusque cruris est, (quod gressuram
solet Hippoc. appellare) interiacet, quod duobus fe-
minibus sit interpositum, quæ est intercapedo, quæ
ab exortu pudendi usq; ad anum pertinet, ubi etiam

vesi-

vesicae collum collocatum est, 4. de artic. 45. 2. de
fract. 43.

Intermissionem febris, uocat Gal. cum febris in
quietem desierit, 1. de cris. cap. 3. & ad infebriticati-
onem deuenierit, 3. de cris. cap. 4.

Intermittens pulsus est, qui inequalitate constat,
raritatis & paruitatis, alio atque alio utrobique mo-
do, in raritatis inequalitate, quod quies sit longissi-
me producta, in paruitatis, quod distentio minimum
dilatata, 1. de differ. puls. 12.

Internodia, uide Phalanx, & Digiti.

Intersepientes, uide Hypezochotes.

Interseptum, ea est pars narium, quae alas, seu
pinnulas narium nominatas, discriminat, lib. Introd. 9
cap. 10.

Interstitium est duodecim horarum spatium, in quo
febris terminatur, 2. de cris. 9.

Intertrigines, uide Hidroa.

Intervallum, uide Ictus, Ablatio.

Intestinum, uide Entera.

Intestinum cecum $\tau\omicron\phi\lambda\acute{o}\nu$, est intestinum à Ventrì-
culo, ordine quartum, quod quidem uelut uenter est.
Vnde figurà à reliquis differt, nec enim ut reliqua ob
longum est, sed in modum ventriculi rotundius, ex qua
figura efficitur, ut una tantum parte pertusum videa-
tur, & uno foramine tanquam oculo praeditum esse;
peruium tamen est, quodque ad ipsam ex tenui inte-
stino descendit facile in Colon delabitur.

Inte-

Intestinorum difficultas, est velox exitus eorum, quae comeduntur & bibuntur, quae talia deiciuntur, qualia fuerunt deuorata, 4 aph. 12. quae & lienteria dicitur, 6. loc. aff. 2. quae duabus potissimum notis à Cœliaca dispositione discernitur, si quidē lientericis alimenta prorsus cruda, protinus ut sumpta sunt infernè prodeunt, tanta, tamque manifesta cruditate, ut alimenti assumpti genus aperte dignoscatur uerum in Celiacis iam adepta sunt aliquam coctionē, & diutius in uentriculo morantur, neque tam cito per aluum descendunt. Cruda tamen sunt & aliquando fetida, non mordacia, sed saepe animi deliquium inducunt.

Intumescencias, quas ἰσχυρά Græci uocant, Hippoc. omnes tumores preter naturam hoc nomine vocare consuevit; cum ceteri posteriores, in inflammationes & durities, & intumescencias, eos distinguūt, 3. de his quæ in med. 30.

Inuiolata membrana, uide Membrana dura.

Inniscatio oculi, est quaedam uiscositas, palpebræ cū pupilla iungens, siue in eius albedine, siue in eius nigredine, uel utrasque palpebras simul iungens, qualis fit propter vulnera in oculis, lib. de ocul. cap. 9.

Inuolucrum Cordis, uide Membrana Pericardios, lib. de ven. & art. diff. cap. 2.

Inuolutum intestinum, quod & Ileon & tenue dicitur, uide Ilion, & Tenue.

Inustio in uentre oritur, propter acrem eorum, quæ inge-

ingesta sunt caliditatem; ob quam & febrile contingit, colliquatio uero fit, absumpta, contabescitque; propter febrem morosam, uel pinguedine, uel molli carne, 4. acut. 112.

Ionthos Græce, Latine Varus, tumor parvus & durus, in faciei cute ortus, a crasso uidelicet succo congregatus, 5. de comp. med. loc. cap. 3.

Iris oculi, quem alij Stephanon, alij Coronam uocant, est medius ille oculi locus, quo committuntur inter se tunicae uniuersæ, 14. meth. 19. siue Iris est oculi tunica mollissima, alba, desinens in circulo, ubi & aliæ omnes subiectæ sunt, ubi album nigro coniungitur, 10. de usup. cap. 2. inditum nomen, ab arcus cælestis similitudine.

Isatodes bilis, vide Bilis pallida.

Ischias & Ischion, vide Coxa, & Arthritis, 2. meth. 2. & 15. de usup. 8.

Ischiadica uena est, quæ superne descendens, ad partem cruris syluestrem tendit, quæ occultatur, quousque ad malleolum ueniat exteriore, lib. de anat. viu. quæ uena, externa malleoli dicitur, & Ischiadica, quod secta Ischiadicis conferat.

Ischēma medicamentum est ad sanguinem continendum, 5. de comp. med. loc. c. 14. Græce ἰσχαιμων, paulò diuersum ἀπὸ τοῦ ἰσχυμῶν, hoc enim non sanguinem modo suppressit, sed & inflammationem arcet, illud uero rationem habet tantum sistendi sanguinem.

Ischuria ἰσχυρία, est urinae suppressio & retentio,

Dysu-

Dysuria, in qua urina fertur cum difficultate, Stranguria cum guttatin distillat, quam & urine stillicidium appellant, de const. art. 6. & 8. de placit. 6. Fit autem urine suppressio, uesica vel excernere non valente, vel eius collo occluso; vocat autem vulgus medicorum, non secus Ischuriam, quanquam Ischuria non sit; illud quoque symptoma, cum urina in vesicam omnino non uenit, perdita scilicet renū actione, & permittendi profecto sunt ita nominare, cum propriam appellationem non habeant; Collum si quidem vesice clauditur, uel propter obstructionem à sanguine concreto, tum crasso pure, tum calculo, tum topho, tum aliquo germine, ibidem enato, uel propter conuiuentiam, ab aliquo tumore præter naturam, aut cum immodice est repleta, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Isis emplastrum, est Cephalicum emplastrum, 2. de comp. med. per gen. cap. 18.

Isthmus est regio cōmunis gulæ & gutturi, in qua utriusque osculum ascendit, angusta & longa, corpus uerò hunc locum ambiens, Pharynga, idest fauces uocant, lib. de musc. diss. cap. 15, Isthmus ea pars corporis est, quae os & gulam interiacet, quae per metaphoram quandam ita nominatur ab ijs, qui propriè dicuntur Isthmi; sunt autem angusti quidam terre processus, inter duo maria siti, Vnde Paristhmia, idest Tonsillæ sunt inflammationes locorum, ad hunc Isthmum pertinentiū, 2. apho. 26. quia ratione ἰσθμὸς καὶ φάρυγξ, idem erunt, hoc est quae inter stomachū

& laryngem, idest guttur, interiacet latitudo.

Ithmoidea ossa, uide Caernosa.

Iudicium, siue Indicatio, uide Crisis.

Indicatoria signa ab Hippo. vocata sunt, sudores, rigores, sanguinis fluxus, multum alui profluuium, si milis uomitus, dolor capitis repente inuadens, uehemens spirandi difficultas præter rationem, Cordis morsus, quaedam in Hypochondrijs citra dolorem tensio, uigiliæ vehementes, delirium, nox absq; ratione molesta, accessio anticipans, lacrymæ inuoluntariæ nihil patientibus oculis, neque ex tristitia prouenientes, rubor faciei, labrum inferius agitatum, liuida, uel obscura & tenebrosa, quaedam ante oculos obuersantia, hallucinationes quaedam, male uel nasus repente rubescences, parotides aut omnino, alicuius in articulum decubitus generatio, & similia, quæ secundum eorum substantiam Casus nominata, quatenus subitam mutationem ostendunt, Indicatoria signa appellantur; ita enim morbum iudicant, ut cocto morbo futuram sanitatem, crudo autem vel perniciem, uel morbi longitudinem decernant, 1. aph. 12. uide Decretorius.

Iugale os, uide Zygoma.

Iugulares vene, $\Sigma\phi\acute{\alpha}\delta\iota\tau\iota\varsigma\ \phi\lambda\acute{\epsilon}\beta\acute{\eta}\varsigma$, sunt duo rami magnæ uenæ caue à gibbis Hepatis exorte postquam ad dextram Cordis aurem sanguinem tulerint, ab eo tãquam ab initio progressæ, ad collum recto tramite festinantes; In quo sunt due magnæ & insignes venæ,
quæ

quæ ob id Iugulares uocantur, 2. acut. 10. & lib. de ven. & art. diff. cap. 7. quæ dicuntur, externæ, superficiariæ Apopleticæ, Guidez, manifestæ, à quibus superficiariæ ferè omnes colli, & capitis partes nutriuntur, 2. acut. 10.

Iugulum, uide Claues.

Iuleb, uide Zulapium,

Iuxtangina, idest Cynanche, 1. aph. 12.

Ixiæ, Varices, sic dicuntur ab Aristotele, οἱ κίβοι; sunt tamen qui differre putent, uocantes κίβοις, uenas omnes dilatatas, in quacunque corporis parte, ἱξίαις verò, eas modo quæ cruribus habentur, sed discrimen nullum censendum est.



L



L A B O R ab Hipp. sæpius cōsuevit sumi pro exercitatione, interdum pro dolore, aut absolute pro qualibet noxa, com. 5. in 6. de morb. vulg. 10.

Labrum, siue labium χείλος, est oris extremitas musculosa, ipsum uicissim claudēs, & aperiens, quod in labijs prominet πρὸ χείλου dicitur, 11. de usup.

Labyrinthus, uide Cæcum foramen.

Lactes, apud Hermolaum barbarum, & Plinium significant molliora intestina, quæ primum in homine & oue occurrunt, per quæ cibus labitur; sed apud Aristotelem, Gazam, Budeum, & Galenū, 5. de loc. aff. cap. 7. significat Mesenterium, idest pingue illud quod intestina superiora ambit; quod nostrates in pi-

scibus

scibus lactantiis, & lactumas vocant.

Lacuna, uide Choana.

Laues arteriae sunt, quas omnes natura per anostomofin, ad unum principium applicuit, sinistrum Cordis ventriculum, in quo natiui caloris est principium ut per eas refrigeratio continua Cordi comparetur, 7. de vsup. cap. 9. vide Arteria.

Leuitas intestinorum, quae Λευιότης dicitur, est velox, & sine ulla omnino transmutatione, ciborum deiectio, aut propter exulcerationem, in superficie ventriculi, aut intestinorum, aut propter potentiae re-tentricis imbecillitatem; quorum primum ex mordacibus substantiam tenuem habentibus humoribus fit, quae in pueris, Graeco uocabulo Aphthæ, idest, oris ulcera nominantur; alterum uero ex magna ventriculi, atque intestinorum prouenit intemperie, 3. aph, 22. vide Intestinorum difficultas.

Lagochilos, uide Lagophthalmos.

Lagonas, uide Ile.

Lagophthalmos, idest Leporinus oculus, est quæ cum superior gena adeo retrahitur, ut oculum, dum clauditur, totum non contegat, estque affectus in partibus instrumentalibus, non magnitudine, sed defectu alienus, non ut superuacaneum, sed ueluti deficiens, cuiusmodi mutila, & curta omnia, sicut in labris et oculis cernitur; sic etiam lagochilos dicitur, qui leporina habet labia, lib. Introd. cap. 3. & lib. finit.

Lambdoides sutura capitis posterior est, et transuer-sa, qua

sa, qua occiput incipit quae à lambdæ literæ Græcæ similitudine nominatur, lib. de ossib. cap. 1.

Lambdoides os, uide Hyoides.

Laminas communi vocabulo Anatomici appellare consueuerunt, instrumenta secandi corpora, scalpella, spathomelas, amphismelas, spicilla, oricularia, melotidas, quae, & ex ligno densiori, & aliquando ex buxo, confici solent, 6. de anat. adm. c. 10.

Lana succida, idest non lota, quae & æsyperon dicitur, 14. meth. cap. 7.

Laparon, Græcis molle & Vacuum, Hypolaparon autem subuacuum & submolle significat, 3. de diffic. respir. cap. 12. aliquando verò laparæ uentris dolorē significant, com. 3. in 6. de morb. vulg. 32. uide Ile.

Lapideum os, uide Lithoides.

Lapis specularis, uide Diaphanes.

Lapis in uesica propria passio eorum est, qui ob edacitatem non paucos crudos humores coaceruant; ex quibus pars crassior unâ cum urinis ad uesicâ perueniens, sit lapidum generationis materia; aceruatür verò hic crudus humor, sæpe ob edacitatem & ingluuiem, ut in pueris, sæpe ob potentiæ concoquētis imbecillitatem, ut in senibus, 3. apho. 26.

Larynx siue guttur est superior brôchij terminus, seu bronchij caput, prima asperæ arteriae pars, primum vocis instrumentum, summo ori continua, lib. de vocal. instr. diss. cap. 2. ex chartilaginibus, musculis, nervis, & substrata membrana constans, cap. 4.

quae collo extare apparet, tangentibusque dura sentitur, sursumque nobis transglutientibus fertur, 7. de v'sup. cap. 5. Λάγυξ Græcè.

Lassitudines κόποις, Græci homines vocant affectus, ex multo, uehementiùè motu corporibus vel totis, uel particulis quae amplius laborarunt, oborientes, vnde Acopa medicamenta, quae talem lassitudinem tollunt, appellantur, 7. de comp. med. per gen. cap. 11. Cuius lassitudinis species tres sunt, ἐλνώδης, τενώδης, φλεγμονώδης, vlcerosa, tensiva, inflammatoria; quae notis distinguuntur; in vlcerosa lassitudine, vlceris sensus cum mouentur, se exhibet, in tensiva, incendi, tendique sibi videntur qui laborant, in inflammatoria, accendi, & inflammari.

Lateralis morbus, vide Pleuritis.

Latum os, vide Dorsum.

Latus musculus, siue musculosa natura, uel substantia, vel μυοειδὲς πλάτυσμα, apud Gal. lib. de muscul. diss. cap. 1. est latus ille musculus, qui sub cute in collo habetur, qui incipit in priori quidem parte ex labrorum ac buccarum, in posteriori verò ex spinæ regionibus toti cuti, quae circa collum est, in orbem subtensus, membranofusque existens, ut interdum membrana potius, quàm musculus videatur. Sed apud eundem, 5. de anat. adm. cap. 6. latus musculus est, qui totius frontis cuti, connatus subiicitur.

Latus pulsus est, qui pulsu naturali, in latitudine maior est, longus qui in longitudine, altus qui in profunditate.

funditate ; è contra , angustus , brevis , humilis , depuls. ad Tyron. cap. 2.

Laxius intestinum , idest Colon, 2. aph. 40.

Lea, seu lenia medicamēta sunt. quæ partes asperas leniunt , de Dynam. in præmio.

Lemmata , sunt propositiones per se credibiles , quas uocare consuevit Aristoteles , dignitates , uel proloquia, vel postulata, 2. acut. 20.

Leno , siue Linon , Græce Λινὸν est regio quadam in summo vertice Cerebri, ubi duæ venæ inuicē congregiuntur , à torcularis similitudine propter tenuem membranam . Est & alius leno, idest exilium in superficie venarum sibi incumbētium congressus , propter crassam membranā , similiter factus, 9. de anat. adm. cap. 1. vide Torcular .

Leporinus , vide Lagophthalmos .

Lepidoides suture Λεπιδωδεις, vel conglutinationes (quas Galenus suturas iuxta aures vocat) sunt duæ lineæ à media sagittali , quæ recta in longitudinem fertur, æqui distantes , per capitis longitudinem à posteriore in priorem partem super aures feruntur, quæ in ossibus ad squamæ similitudinem structis, habentur, quæ fiunt duobus inter se ossibus coherentibus , non per suturam quidem , sicuti Coronalis & lambdoides , sed paulatim syncipitis os, instar squamæ attenuatum descendit, atque in id os , quod infra ab auribus ascendit , subintrat. lib. de ossib. cap. 1. quæ & Squamosæ agglutinationes nuncupantur, 9.

de vsup. cap. 18. mendosa adhuc & temporales dicuntur.

Lepra Λίπα, est cutis mutatio, in habitum qui præter naturam sit, cum asperitate & pruritibus, et doloribus, non nunquam & squamis decidentibus, interim secus, pluresque corporis partes depascitur, lib. finit. lepra & Psora, seu scabies, affectus sunt valde affines & congeneres, ut non aliud psora sit, quam mitior lepra, est enim psora ad lepram prævia, ut lepra ad Elephantiasim, si magis humor vratur, malignior euadat, & morbus diutius protrahatur. Uterque affectus pruritem habet inseparabilem, sed in lepra tantus est, ut æger etiam vehemētissime scalpendo, nullo modo iuuetur, sed omnis potius generis vlcera & phlegmonas accersat, quod cutem exasperet, & subiectam illi carnem, multo quàm in psora profundius, Vnde & squamulas procreat, quales in psora non generantur, quae furfuracea tantum corpora ex se remittit, ut quae à minori gignatur intemperie, & humore minus crasso, terrestri & maligno. Dicitur Λίπα, ab his squamulis, quasi Λεπίδα, idest squamosa; Ab Auicenna dicitur Albaras nigra, & Impetigo excorticatina, quod cutis per cortices squamasque resoluatur. Lepram hanc Celsus uocat Impetiginem, non eam quidē quam superius nos Λάχλο appellauimus, sed quam ipse declarat, lib. 5. quam in quatuor species distinguit, quæ à superiori Impetigine plurimum distat.

Lethargus Græce *Λήθαργος* καὶ *ληθάργια* passio est *Phrenitidi* contraria, si quidem in ea marcor, & in expugnabilis dormiendi necessitas adest, sic dicta, quod ea correptis omnium rerum obliuio accidat. Somnus, si quidem, si longius producat, difficilē q̃; habuerit expergesactionem *Coma* dicetur; si uerò solo tempore naturæ modum conuenientem excefferit, et nō habuerit difficilē expergesactionē, somn⁹ longus rectē nominatur, qui fit refrigerata prima parte sensitiua, hoc est Cerebro ipso; quæ refrigeratio cū fortis fuerit, mista quidem humiditati facit lethargicas passiones, cum siccitate uerò eas quæ Græco vocabulo *Catalepsis*, idest *Deprehensiones* vocantur, 2. aphor. 3.

Leuce Λεύκη, idest alba *Vitiligo*, 2. meth. 2. sex corporis & pilorum in album colorem mutatio, præter naturam, lib. finit. & 1. de comp. loc. cap. 1. neq; uerò ad solam cutem, sed ad subditam eius carnē vitium hoc pertinet, sit q̃; cutis & caro alba & pituitosa, qualem *Polypodes* & *locustæ*, ceteraque crustacea, exangui, & alba carne prædita obtinent. Id malum uidetur esse, quod nostrates *lepram albā*, *Auicenna*, *albaras* album nuncupauit; Differt à *lepra*, & *Elephantiasi*, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis, leuce uerò cutē habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma Λευκώμα, idest oculorum albugo, de remed. par. fac. Estque cicatrix oculorum altior, ma-

gis q̃;

gis que profunda ; nam que superficiaria est νεφέλιον dicitur .

Leucophlegmatia , idest alba pituita, quedā aque inter cutem, species est, vel quod sit etiam aliqua pituita liuida , vel quod sui quidem ratione semper sit alba , sed propter mistionem quorundam aliorum humorum, uerum mutet colorem, 7. aph. 29. quā eandem dicit esse cum ea Hydropis specie , que Hyposarcidium, siue Anasarca dicitur, Ὑδρεος φλεγματίας ; lib. Introd. cap. 13.

Lichene affectio, uide *Impetigo* .

Lien, uide *Splen* .

Lienteria, uide *Intestinorum difficultas* .

Ligamentum , quod Græci σύνδεσμον vocant, est corpus neruosum , ex osse quidem omnino ortum habens , insertum in os , aut in musculum , cui nomen ab usu est inditum, 1. de motu musc. cap. 1. quod et *Copula* dicitur, lib. Tegni, cap. 9.

Ligatio, idest obstricti articuli, & difficiles artuum motus, quos Græci *Ancylas* uocant, 7. de comp. med. per gen. cap. 6. Est & affectus qui interdum naturaliter accidit , membranis linguam continentibus durioribus & breuioribus statim à primo ortu factis ; Interdum ex acquisitio, ob cicatricem quāpiam diu riorē, sub ipsa ex ulcere contractam ; Quam Græcē ἀγκυλόγλωσσον , vocant, qui hoc malo laborant, tarde sermonem explicare incipiunt, Atque ob id hoc vitij genus , Latinis *ligatio lingue* dici potest.

Lin-

Lingula, vide Epiglottis.

Linon, uide Leno, & Torcular.

Linospermon, idest semen lini, 1. aliment. fac. 32.

Lipodermus, idest, (translato ad morbum nomine,) appella, defectus est pelliculae tegentis glandem Colis, adeò, ut distrahi amplius non possit, lib. finit.

Lipopsychia, idest animi deliquium, idem quod Lipothymia, Λιποψυχία καὶ Λιποθύμια, solo differunt, quod & si ex ipso nominis Etymo Lipothymia, vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significet, attamen utriusq; facultatis defectu; omnium virtutum exolutio contingit, ut sensu motuque destituantur ægri, non minus quàm animo, quale aduenit ijs, qui nisi frequentius nutriantur, resolvuntur; vnde aliud est à syncope, 12. meth. cap. 5.

Lipothymia, uide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum album rubescit, & palpebrae attolluntur cum dolore coniuvent, & aegrè manus admotas ferunt, lib. Introd. cap. 15. uide Ophthalmia.

Lippitudo dura, uide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, uino; Igne liquefcit propolis, cera, resina, ladanum, seuum, chalbanum; Aceto citra ignem, ammoniacum, sagapenum, oppoponacum, 3. de comp. med. per gen. cap. 5.

Liqui-

Liquida aluus, in qua liquida deijciuntur, com. 2. in 2. prorrh. 3.

Lithiasis, idest calculi morbus, renibus adueniēs, in quibus generatur, lib. de renum aff. dignot. cap. 2. Et si quidam λιθίασι dicant esse calculi generationē in vesica, quamuis ille etiam in renibus generari possit; Dicitur & λιθίασις, oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in qua alba quaedam & crassa callis aut lapillis similia apparēt, oculum pungentia.

Lithoides os, λιθοειδές, idest lapideum, 9. de vsup. cap. 10. est quod utrinque ad aures positum, petre speciem referens, lambdoides sutura finibus terminatur, in quo inest processus columna similis, ad acus, styliue similitudinem, vnde Styloides, Belenoides, et Graphioides στιλοειδές, βελονοειδές & γραφιοειδές appellatur, sub quo auditorius meatus continetur, lib. de ossib. cap. 1.

Lobi, idest fibræ, quibus tanquam digitis Hepar ventriculum, & Pulmo Cor ad vnguem complectitur, 4. de vsup. cap. 8. & lib. 7. cap. 10. & 7. de anat. adm. cap. 11. Dicitur & lobos, ima & carnosae aurium pars.

Localia medicamenta, quae Topica dicuntur, medicamenta sunt quae extrinsecus applicantur corporis particulis, quibus non prius vtendum, quam totum corpus purgaueris, si redundantia in toto corpore subest, alioquin, implebis potius corpus quam vacuabis, 13. meth. 22.

Lochia,

Lochia, Λοχία, dicuntur omnia quæ à puerpera post fatum & secundas exeunt, quæ Aristoteles vocat purga nenta, sunt autem reuera τὰ ὑπερμηνία, à quibus tamen sola ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum, sic appellantur; lib. de atra bile, cap. 8.

Locus à recentioribus medicis, corporis particula quaelibet appellatur, 1. loc. aff. 1.

Longaon, siue longanon intestinum, uide Rectum.

Longitudinalis sutura est quæ à medio posterioris Caluariæ per capitis longitudinem ad mediam vsque anteriorem, extenditur, vnde Græcis ὀβελία, idest recta, vulgo sagittalis, & longitudinalis appellatur à lambdoide ad Coronalem finiens, lib. de ossib. c. 1.

Longus pulsus, vide Latus.

Lopidoides suturæ, quæ & lepidoides, vide Lepidoides.

Lordosis, idest excavatio facta per vertebrarum luxationem, ad internas corporis partes, 4. loc. aff. 3. vide Cyphosis.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis excrementum attraxerint, utilem qui in eo est sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur, excrementum verò ipsum serosum à facultate segregatrice, ceu inutile expellitur, sed quandiu in uenis atque arterijs hoc cū sanguine currit, excrementum serosum, cum segregatum est lotium & vrina dicitur, lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Lyctus.

Luētuosa respiratio est, interrupta inspiratio, stante interim thorace, deinde rursus id quod deest adijciente. qualis infantibus accidit, quo tempore plorat, quæ est duplex intus aëris reuocatio, ueluti super inspirantibus, 6. aph. 54.

Lumbrici, vide Elminthes.

Lumbi, ὀσφὺς, propriè pars est totius spine, quinque vertebris omnium crassissimis, maximisque cōpacta, inter dorsum, & os sacrum medijs, estq; dorsum ea pars qua cingimur, uide Dorsum.

Lupus, Græce Λυγιστὴς, seu strangulator dicitur, affectus ijs eueniens, qui sperma diu præter naturam retinuerint, quod veneni naturam sapiens, crescēsq; in venis & arterijs, dum nequit descendere in sanguinis massam, nimiam generat passionem in faucibus, quasi suffocando, lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo affectu qui Nyctalops dicitur, uexatur, 10. de simplic. Μύωψ is dicitur, qui à primo ortu, oculis propius admota videt, eaque propè oculis contingit, et limis semiclusisq; oculis aspiciat, etiam si parua sint; remota verò quāuis magna, videre non potest. Vitium oculorum est congenitum ab imbecillitate spiritus visui, eamq; ob causam incurabile, eo differt à Nyctalope, qui non natura, sed ex morbo talis euasit. Μύωπας Græci uocant, quos minus videntes, Latini Lusciosos, & Nuscitiosos, appellant, ipsa verò affectio μύωπια, & μύωπίας appellatur.

Lutea bilis, idest Vitellina, 8. de placit. 4. vide Bilis pallida.

Luxationes, quas excidentias, exarticulationes, & exarticulata interdum uocat Hippoc. sunt ossium à propria sede excessus, qui sine fractione fiunt, 1. de fract. 1.

Lycanthropia, Grece Λυκανθρώπια, Λυκανθρώπος, Κωκανθρώπια, Κωκάνθρωπος, Λυκίων; Arabice Catrab, Cutubut; Latine Lupina, uel Canina insania species est melancholice ut testantur Aëtius & Paulus, quæ agri mense Februarij, quo presertim humor melancholicus redundat, noctu domo egressi, urbem circumcumeunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monimenta queritant, adaperiunt, cadauerum frustra arripientes, secumque collo gestantes, fugiuntque die uiuos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides, vide Lupus.

Lyparia febris, uide Febris lyparia.

Lytheria, idest solutoria signa, quæ magni & uehementis morbi solutionem firmam solent præcedere. 1. de diebus decret, cap. 1.



M



M A D A R O S I S, Μαδαγάρτις ἢ Μαδάρωσις, idest, Glabrities, Caluitium, capillorum defluuium est, à vitiosis humoribus proueniens, sicut quæ Ophiasin & Alopeciam nominant; quæ omnes

passio-

passiones sanabiles sunt, uitiosis humoribus qui ad radices capillorum hèrebant, uel resolutis, uel alio translatis; Vnde aliud sunt à Caluitie, 6. aph. 34.

Madorē & Pladorem, idest superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippoc. siue ex tenuibus, siue ex crassioribus humoribus constent, cuiusmodi et pus est, 3. fract. 19.

Magma, mirobolanorum fæcem vocant, 7. de cōp. med. per gen. cap. 7. aliqui uerò omnem unguenti fæcem, quæ expressa reliqua liquidiori materia relinquitur μάγμα vocant; extenditur significatum, ad omne unguentum spissum, pauco liquore subactum.

Magna arteria; uide Arteria aorta.

Magna febris, uide Febris magna.

Magnus morbus, uide Affectus grauis.

Magnus pulsus est, qui naturalem omnibus tribus dimensionibus superat, qui uerò iisdem dimensionibus à naturali superatur, paruus dicitur, de puls. ad Tyron cap. 2.

Male, carneꝝ partes sunt, quæ inter nasū, & aures iacent, quæ priscis Genē dicuntur, lib. Introd. c. 10. quæ ad mali similitudinem sub oculis leniter rotundæ prominent, 1. de artic. 3.

Malactica medicamenta, induratorum corporum sunt, ea nimirum, quæ ipsorum soluunt duritiē, quæ ad modum & relaxantia quæ tensioni medentur, 7. de comp. med. per gen. cap. 9. malacticum autem emolliens dicitur, non omni indurato corpore, sed de eo

tan-

tantum quod congelatione induruit, magisque etiam si in eo contentus sit humor præter naturam, uelut in Scirrhis, quod uerò à siccitate induratum est, humectari postulat, quod à Congelatione calefieri, Græce μαλακτικὰ φάρμακα, 5. simpl. 5.

Malagmata vocant quam plurimi medici omnia pharmaca, quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, quæ uox emolliutionis significationem habet, uerum nos permittemus ipsis etiam si non propriè appellent; 8. de comp. med. loc. 5. Propriè autem malagmata vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exiccantia aut humectantia manifesto. Nam, cum exactè mollientia, medium quodammodo ordinem, inter humectantia, siccantiaque sortiantur, indurescentiū substantiæ ueluti fusionem quandam molliuntur, quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit; ubi uerò diutius diffusa fuerit, digredientium medicamentorum usus ueniat, 7. de comp. med. loc. cap. 1. Vnde quidam nullum discrimen constituunt inter μαλαγµατα, ἐμπλάστρα, Τροχισµους. Verum, & malagma tum in ijs admouendis differētia est, aut enim medijs corporis regionibus (quæ propriè ἐνθέµατα, Paulus appellat) ut Ventriculo, iecinori, lieni, Cordi imponuntur, aut extremis partibus, ut Capiti, et articulis.

Maligna, vide Cacoethe.

Malleoli, sunt imæ ab utroque latere tibiæ, suræq;
par-

partes gibbe ex parte exteriori, intrinsecus caue, carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utrinque talus continetur, lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli uena duplex est, altera interna ad anteriorem tibiæ partem (cream Latini uocant) procedēs, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibiæ extremū peruenit, quae & Saphena corrupto uocabulo, pro Saphæa, idest manifesta, dicitur; altera externa, & superficialiaria per anteriorem alterius ossis tibiæ, quod πρὸνλον uocant Græci, producit, ad pedis pertingens articulum, unde externa malleoli, & Ischiadica aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, idest, mollicinum, quo genere Hippoc. omne medicamen uocat, quod connatam humiditatem habet, qualis in pingui est, singulisq; oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera, 4. de comp. med. per gen. c. 9.

Malum granatum, et malum punicum, uide Charitago ensiformis.

Mamma, (Μαστὸς καὶ τῆθὺς Græce) est carnosus in pectore eminentia, ad utrumque latus pectoris glandulosa, semicircularis sita, in cuius medio papilla Græce θηλή, extuberat, quam ambit circulus quidā subniger qui φῶς dicitur, gignendi lactis vim à natura habens, 1. de sanit. tuen.

Mammillaris, Μαστοειδὴς, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarū, similis; Extuberat, & cauus est, quo aër ampla, & anfra-

anfractuosa eius cavitare conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur, & à quibusdam vteri Cornua, *Κεραίας* vocant *μαστοιδικαί απόφυσεις*, propter similitudinem, quam habent cum mammis.

Mancum & Mancinitatem hoc est Cyllon, & Cyllonem non nulli, de omni longorum membrorum distortionem intelligendum censent, generaleque ei attribuunt significatum, alij eam tantummodo distortionem significare asserunt, in qua in interiorem partem membrum inclinatur, quod cum accidit, necesse est, ut summum eius, idest, pes intro contortus, quasi mancus & mutilus appareat, 3. de artic. 87. uide Cyllum.

Mandibularij, Manducatorij, Mansorij, masseteres musculi, Græce *μαστωτήρες μύες*, alij sunt à temporalibus, quos *Crotaphitas* vocant; nam posteriores dissectores, eos temporales, seu temporinos nominant, qui ex ossibus temporum capitis exoriuntur, quos cum intenduntur, committere ac claudere os manifeste conspiciamus; alios uero qui latis inferioris maxillæ partibus superiecti sunt, utrinque alter, propterea quod in manducando, maxillam circumagunt, manducatorios uocant, cum illi qui è superiori parte deferuntur, efficere id minime valeant; attrahunt enim sursum eam tantummodo, non traducere etiam hanc illac queunt; Vnde in committendo quoque ore, ipsorum auxilio indigemus, 2. de artic. 5. à mandendo sic dicti, quos etiam mandibularios masticatorios & mansorios vocant, 4. de anat. adm. cap. 2. & cap. 4.

R

Mania

*Mania, furor, Insania, Μάνια, species Paraphro-
sines, 2. de caus. sympt. ut enim τὸς παραφροσύνῃς, seu
delirij est circa febrem insanire, & mente alienari,
ita si huic insania adiungatur magnitudo & vehemē-
tia symptomatum ut quod calcitrent, mordicus impe-
tant vel ingredientes, uel quoscunque obuios, ferarū
more, mania dicetur ex assata, uel atra; uel flaua
bile procedens 3. loc. aff. cap. 7. quod si à sanguinis
copia non putrente originem ducat, erit quidem ma-
nia, sed cum risu, hilari vultu, & perpetuo cantu
Aliquando Hippoc. manie nomine pro melancholia
morbo propriè dicto usurpauit, ut testatur Galenus,
6. aphor. 21.*

*Manifesta uena, ramus est venæ à Corde ad fur-
culas ascendentis, quae per faciem oculos, caput, &
nares diuiditur, ut omnia membra nutriat, quæ inde
manifesta vocatur, lib. de anat. vii.*

*Maniode sunt vehementes insania, propter atrae
bilis malignitatem, cum flaua bilis Cerebrum ap-
prehenderit, febrisque vehementia assatum hunc
succum melancholicum reddiderit, com. 1. in 1.
prorrh. 10.*

*Manna, mel roridum, uel aërium dici potest; Mel-
lis species est non ignota veteribus Galeno, Plinio,
Dioscoridi, sed mellis nomine, & titulo comprehen-
sa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, pro
ditamque putet, sic enim de ea scriptum reliquit Ga-
lenus, In folijs inquit stirpium adnascitur quip-
pam,*

piam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nec tamen continenter, neque copiose prognasci soleat. Nec me præterit, per æstatem, in arborum, fruticum, herbarumque folijs plurimū fuisse inuentum, sic ut à ludentibus rusticis Iupiter diceretur melle pluuisse; Præcesserat tum nox frigidior pridie calida, siccaque cœli constitutio diluxerat; qua propter inter rerum naturæ peritos conueniebat, halitus quos terra uel aqua prospirasset extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra rarius euenit, in Libano monte quotannis, adeo ut extensis pellibus arbores succutiāt, receptoque quod profluit, ollas, & fictilia compleant, priuatoq; nomine vocant *Ἀερομέλι*, id est ros cidū mel, & ἐτ̄ *ἀερομέλι*. i. mel aeriū. Hæc Galenus, 3. alimēt. facul. c. 39. de melle. Cuiq; igit patere debet, notā Galeno mannā, quæ gustu prorsus mellea sentit, Dicitur itē et māna thuris (quæ et succussio, et Pollen nuncupatur, 2. de artic. 44.) id est thuris micæ concussu elisæ, item corticis parum participes, adstringendi nim totam & qualitātē possidētes, 5. de comp. med. per gen. cap. 2. Videturq; aliquibus mannā thuris nihil à thure trito ac leuigato differre; mannā enim proprie appellant, id quod excussū est à thure circa magna onera confractō; auferuntur enim ab ipso fragmenta quædam parua, corticis thuris,

4. de comp. med. loc. 4. & 13. meth. cap. 5.

Manus (quas homo pro corporis nuditate, quod armis nudum sortitus est, armorum loco obtinuit,) sunt iuxta Aristotelem organum ante omnia organa, cum nullum sint eorū quæ particularia organa sunt, sed quodlibet eorū possint recipere, 1. de usup. c. 4. *Manus* autem nunc totū crus, brachium, scilicet, cubitum & manum significat, nunc extremam manum tantum, 2. de vsup. cap. 2.

Manus dolor, Græce *ῥυγάρα*, arthritis species est, quæ manuum articulos occupauit, vt *Genagra*, quæ genu, & *Podagra* quæ pedes.

Mansorij musculi, vide *Mandibularij*.

Marasmus, siue ex morbo senium, est frigidum, & siccum corporis temperamentum, non natura, vel annorum multitudinis ratione comparatum, sed febrili morbo, quod non in animalibus modo, verum et in stirpibus supra modum arefactis, uisitur, 5. de sanit. tuen. cap. 9. *Marasmus* autem idest *Tabes*, quæ non idem morbus est ac febris *marasmodes*, idest *tabida*; *marasmus* enim absque febre in decrepita ætate solet accidere, extincto natiuo calore, quod nihil aliud est, quàm mors, quæ sine sensu doloris ac secūdum naturam ex siccitate contingit; sicuti his qui præter naturam tabescunt altera aduenit species, quæ ex egritudine senectus uocatur, in quam non solum senes, sed etiam pueros uidimus incidisse quāplurimos. *Tabida* verò febris, non tantum sicca, sed calida

lida est, 1. de differ. feb. cap. 8.

Marcor, *Marcor frigidus*, *torridus*, *syncoposus*, vide *Febris marcida*, & ex egritudine senectus.

Marisce venule sedis sunt, quę aliquādo foris extuberant ore hiantes, & stato tempore sanguinē melancholicum excernentes, unde hæmorrhoides dicuntur, quibus plus iusto fluentibus, aqua inter cutem subsequitur; interdum superius delitescunt, & cecę *αιμορροϊδες* appellantur, vide *Sycosis*.

Marmarygas, idest oculorum hallucinationes, 3. crisi. 11. & cap. 7.

Masseteres, vide *Mandibularij*.

Mater dura & pia, vide *Membrana dura*.

Matrix, idest vulua, foris nervosa, intus carnosior, vas fœtus gestandi, quæ à Græcis *Hystera* quoque appellatur, quod omnium partium sit postrema, lib. finit.

Maxillares dentes, vide *Dentes*, *Tomî*, *Incisorij*.

Maxilla sunt illę faciei partes, quę genis subiiciuntur, quæ ad mentum vsque descendunt, & hæc in mucronem desinunt, lib. Introd.

Meatum siue Porum simpliciter Herophilus appellat, neruum illum, qui à Cerebro ad oculum pertinet, sensibilis spiritus uia, quod eius solius foramen clare cernitur, 1. de sympt. caus. cap. 2.

Meatus auditorius, auditus instrumentum est, qui in osse lapidoso est, satis inuolutum, ne quid eorum quæ extrinsecus incidunt, ipsi noceret, in medium

R 3 situs,

situs, extrinsecus quidem conuexarum, intrinsecus autem cauarum, ne quid meatui incideret, uel aures facile afficerentur, 11. de usup. cap. 12. Constituitur autem in medio nervi quintæ coniugationis, qui unâ cum dura Cerebri membrana, inde exoriente, in auditus foramen incidit; dicitur autem & hic meatus cæcum foramen, propterea quod anfractû illum, per quem nervus foras post aures excidit, hâud possunt dissectores perfectè perforare, lib. de ner. diss. cap. 6. Vide Cæcum foramen.

Meatus genitalis est, qui geniturâ à testibus hauritam, ad Colis radicem desert, qui meatus iuxta radicem vesicæ varicosior conspicitur, Unde ei nomen inditum est, Varicosus assistens, 1. de sem. cap. 15.

Meatus Varicosus, uide Meatus genitalis.

Meconium, excrementum est, ex toto fœtus nutrimento in utero, estque humoris qui in Urinaculo est; lib. quod animal sit id cap. 5. Est quoq; μαινωιον, papaueris succus concretus, qui & ὀπίον appellatur, 3. simpl. 20.

Media, seu Mediana cubiti uena est, quæ communis est ei, quæ humeralis nominatur, & ei quæ per axillam fertur, 3. loc. aff. cap. 7. quæ & purpurea, et nigra uocatur lib. de anat. uin. uide Cômunis uena.

Medianum, seu mediastinum, sunt duæ membranae utraq; parte singule totum thoracem διασπάρτοντες, idest intersepientes, quæ posteriore parte spinæ uertebreis, anteriore uero ossi medio pectoris insiguntur,

tur; sursumque ad Claves, & deorsum ad ensiformē, chartilaginem porriguntur, in duas partes totum thoracem diuidentes; unde vulgo mediastinum, siue medianum uocant; his enim medius thorax dirimitur, 6. de vsup. & 5. de anat. adm. quę membrane nō aliter differunt, nisi quod in costis *ὑπεσπώνοτες*, idest succingentes appellantur; vbi uerō rectę ad Claves feruntur, *διεσπώνοτες*, idest intersepicientes, 5. de anat. adm. vide Diaphrattontes.

Medicari, non de omnis medicamento exhibitione intelligit Hippoc. sed de eorum tantum quę purgāt. 2. de fract. 29.

Medicamentum omne id dicimus, quod nostram naturam alterare potest, 1. simplic. cap. 1.

Medulla spinalis, (quę & Dorsi medulla, & Rhachitis, Gręce *μύελος*, & vulgo Nucha nominatur) est quę omnibus, & singulis vertebris inest, 8. de vsup. cap. 4. estque Cerebro continua, eiusdem cū eo generis & naturę, nisi quod ipso multo est durior, potissimum in infernis spine finibus; eam tamen perperam medullam appellarunt, cum medulla ipsa non modo spinali hac, verum etiam Cerebro ipso sit humidior mollior, & pinguior; quod uerō in spine ossibus contineatur, coloremque habeat medullę assimilē, ob id ipsam medullā nominant, quo modo quidam ipsum Cerebrum vocitarunt, 3. de aliment. fac. cap. 10. Atqui sepe eam spinalem vocant medullam, addita scilicet medullę appellatione, interdum uerō sine ad-

ditione simpliciter, spinam nuncupant, 3. loc. aff. 10.
vide Myelon.

Megalosphachnos vocat Hipp. non eos, quibus magna ex natura ipsa sunt uiscera, sed quibus ea ex affectu aliquo intumuerunt; siue scirrhum, siue phlegmonem, siue œdema, nacta sunt, 3. acut. 9.

Melancholia morbus, est insanie species ab humore melancholico, (à quo nomen sortitus est) in ipso Cerebri corpore contento proueniens, qui si assetur Maniam facit, & furorem, 3. loc. aff. 7.

Melancholica & flatuosa hypochondriaca affectio, morbus est ex tertia melancholice specie, indicante nomine humorem, qui ipsius causa est; Cumq; circa uentriculū prima inceperint accidentia, ipsisq; auctis melancholica sequatur affectio, deinde alui deiectione, uomitu, proba coctione, ructibusq; leuetur is qui laborat, Hypochondriacum, flatuosumq; morbum ipsum nominabimus, 3. loc. aff. 7.

Melancholicam ecstasim vocat Hipp. motionem mentis, aberrationemq; intelligit uehementem & ferinam, quæ irrigante Cerebrum asata flaua bile oritur, quæ in nigram permutari solet, 1. prorrh. 14.

Melancholicus humor, alter est qui propriè melancholicus succus, siue melancholicus sanguis à Galeo dicitur, estque veluti fœx sanguinis, satis crassus fœcibus vini non absimilis, qui in terram affusus nō inducit fermentationem nisi forte in ardenti febre assetur, neq; ullius acidæ qualitatis est particeps; qui
in mea-

in meatibus Cerebri contentus, Comitiales morbum in Corpore Cerebri melancholiam morbum generat, vide Nigra bilis. Alter est tenuior, gustu acidus, qui terram radit, attollit, fermentat, ampullasque excitat, qui atra bilis appellari potest, quique pressa atra bile nascitur, ferinaque deliramenta, modo cum febre, modo sine febre inducit, 3. loc. aff. cap. 7. & 2. de diff. feb. 9.

Meliceris, μελικίς, est apostema, humorem melli similem, membrana conclusum habens. species est apostematis, ut & αθήρωμα, & στεάτωμα, quorum hoc adipe, illud à pulicula intra membranam conclusa, nomen habet. Sic Meliceris humorem continet, melli similem, eumque membrana comprehendit, qui ea secta non aliter, quam mel è fauis diffluit, vide Atheromata.

Melicratum, siue aqua Mulsa, siue Hydromel est mellis & aquae compositio, vel æqua vtriusque portione, ut viam aquæ paret, & ad distributionē agat, vel altera alteram superante, 3. acut. 13. licet quidā uelint μελιγκράτον ἀπὸ τοῦ ὑδρομέλιτος, vetustate differre, quod melicratum sit aqua mulsa subita et recens, hoc est ex tempore parata, hydromel autem inueterata, & recondita.

Melon, est tertius modus egressionis vucæ oculi, cū tantum egreditur, ut palpebræ minus preualeant, & pili palpebrarum pungentes, iungendo dolorem inferant, lib. de ocul. part. 4. cap. 11.

Mem.

Membrana, quam Greci nunc *μῆνρα*, nunc *χρῆνρα*, nunc *μλεωγγα* uocant, vide *Tunicarum*.

Membrana Adelon, quasi minus apparens, est quarta oculi tunica, à nonnullis inuecta, quam Amphiblastroide tunica, quasi in summo excipit, membrana minima simul & tenuissima, quam Hippoc. non cognouit. lib. Introd. cap. 11.

Membrana dura inuiolata. crassa, cuticularis (idē enim significant) est quæ primum caluariæ ossibus exemptis, Cerebrum in orbem contegens apparet, (quæ vulgo dura mater appellatur,) Cui altera tenuis, mollisque subnectitur, (quæ pia mater nominatur) 9. de anat. adm. cap. 1. Vtranque meningem vocant, solis Cerebri membranis nuncupatione hæc reseruata; cum ueteres non has solum membranas, sed omnes etiā, Meningas uocarent, ibid. cap. 2. quas etiam Vaginas uocant, 3. de artic. 33.

Membrana Pericardios, quæ & Tunica, & Domicilium, & securum vallum Cordi circumiectum dicitur, est membrana in cuius medio Cor est suspensum, quæ ex capite ipsius ampla valde exoriens, post autem paulatim coarctans sese modo quo Cor ipsum, in quandam Coni acutiem, & ipsa desinit. ossi pectoris annexa, 16. de usup. cap. 16. quæ Capsula Cordis, & Cordis inuolucrum vulgo appellatur.

Membrana Periostios, est inuolucrum tenue, fibrosum, uelut in lumentum ossium, à natura condita, lib. finit. per quam ossa sentiunt, (si modo
quid

quid sentiunt) generaleque quidem nomen est , habetque pro varietate partium, specialia quadam nomina , in Cranio enim *περιεπαιος*, in costis, *ὀστεον* dicitur , vide *Periostios* .

Membrana pinguis, idest *Mesaraeum*, & *Mesenterium*, 10. meth. 8.

Membrana secundiformis, vide *Choroides*.

Membranae Sigmoides sunt tres illae mēbranae in vena arteriosa , à qua Pulmo alitur , intus foras spectantes, quas à figura literae Sigma , Sigmoides appellarunt, 6. de vsup. cap. 14.

Membranae subcingentes, vide *Hypozochotes*, *Cingentes*, *Diaphragmatodes*, & *Medianum* .

Membranae Triglochinae, sunt membranae arteriae venosae , quae in pulmonem distribuitur foris intro pertinentes, quas Triglochinas appellarunt, non à figura aliqua , sed à mutua inter se ipsarum compositione , quae Cuspidum , telorum eminentijs , atque angulis quos glochinas vocant, penitus est similis, 6. de vsup. cap. 14.

Membranae spiritualia sunt , Pulmo, Cor, Thorax , & duplex arteriarum genus, laeve, & asperum, 7. de anat. adm. cap. 1.

Membrum simplex est , cuius quamcunque partē sensibilem assumpseris, erit illi toti communicans in nomine & definitione , ut caro, & os, oppositè verò membrum compositum, lib. de anat. vii.

Mendose costae, vide *Illegitimae* .

Men-

Mendose suturæ, uide Lepidoides.

Meninx Græce μένινξ, uide Membrana dura.

Meningophylax, idest membranæ custos; Lamina hænea est, firma, paulum resima, ab exteriori parte leuis, quæ chirurgi in Vulneribus Capitis utuntur, quoties excidendum & attollendum est os, metusq; imminet, ne in ipso opere Cerebri membrana, negligētius et ultra quam res expostulat, premendo, ledatur, ex quo sopores & graues inflammationes cum mortis periculo oriuntur, propterea quod membranam à curationis iniurijs tueatur, μενιγγόφυλαξ appellata est
4. loc. aff. 2.

Menses, idest mēstruæ mulierum purgationes, quæ per uterum singulis mensibus sunt, lib. de atrabile, cap. 8. quæ & muliebris fluxus, & uteri Rheuma appellatur, 3. de caus. sympt. cap. 4. Vnde menses mouentia medicamenta sunt, quæ in pessis, aut fomentis aut quouis alio modo vuluæ admota, non habent uim familiarium succorum attractricem, sed hoc solo nomine bibuntur, ut sanguinem extenuent, & meatus uteri obstructione liberent, 5. simpl. 20.

Mentagra, uide Impetigo.

Mēti eruptiones sunt affectiones ulcurose & asperæ, in mento sua sponte nascentes, quæ & menti papulæ & mentagræ appellantur, 5. de comp. med. loc. cap. 6. & cap. 7.

Mentum, quod Græci γένυον dicunt, id omne est, quod labro inferiori, lōga orbiculari figura subiacet, lib. Introd. c. 10.

Meri

Meri Arabibus, Gula Latinis, Græcis propriè ὀσφάγος dicitur, & communiter Στόμαχος, omni .n. ventri, collum præpositum, instar Isthmi cuiusdam angustum, nominatur stomachus. Meri autem communis quædā uia est, quæ ab ore fert ad Ventriculū, inter hūc, et fauces media, 4. de usup. et 13. meth. c. 4

Mesenteriū (quod et Mesaræon, dicitur) utroq; nomine ab accidentibus ipsi indito; Mesenterio quidē à situ, Mesargo autē à peculiari substantia, nā & medium inter intestina sitū est, et oēs uenas ex iecore in ipsum descendentes (quæ ob id Meseraicæ dicuntur) vicinis arterijs, & nervis, in orbem complectitur, quemadmodū intestina singula, 6. de anat. adm. c. 6.

Mesenterij appendiculum nominant, illud vnum principium in quo mesenterij venæ ac arteriæ, quæ ueluti radices in arboribus ad concauam anfractū partem, inseruntur, inuicem coeunt, (in quo totum mesenterij cū intestinis continetur) ligamenti natura præditum, sursum tendens, adiacentes sibi habēs venas ad Iecoris portas; arterias autē ad eā spinę partē, q̄ in septū trāsuersum & renes habetur, 6. de anat. adm. c. 6.

Meseraicæ uenæ, uide Mesenterium.

Mesopleuria, idest, Intercostalia loca, lib. de musc. diss. cap. 23. vide Intercostales musculi.

Metacarpium, uide Brachiale.

Metalepticus, idest, trāsumptiuus, uel trāslatiuus motus, quē natura musculis quibusdā cōcilauit, 7. de usup. cap. 14. vide Transumptiuus, & Euthyporos.

Meta-

Metaptosis, transitus est, siue transmutatio, alicuius morbi, vel febris in aliam speciem, ut si ex acuto fiat non acutus, *ἐκ τῆς μεταπλῶσεος* fieri dicitur.

Metaphrenum, idest, Dorsum, media est scapularum pars, cui Stomachus intus subiaceret, lib. Introd. cap. 10. cui Thorax configitur tanquam ad carinam navis, lib. tegni, cap. 29. vide Spina, Dorsum.

Metaporopæsis est exiguorum meatuum status mutatio, ad naturalem statum, nomen est, idem plane potestate significans, quod *μεταρρύγξις*, à quo *μεταποροποισις*, nihil differt, 14. meth. cap. 4. Unde *Metasyncriticum* medicamentum, quod à dolore tollendo, etiam anodynon nominatur, confirmatorium est, & persanat, lib. de dynamid. in proæmio, et 7. de cōp. med. per. gen. cap. 11. ex alto adhuc humores euocat ac transfert, 1. de comp. loc. cap. 8.

Metasyncrasis, vide *Metaporopæsis*.

Metastasis morbi, propriè appellatur, cum ex parte una in alteram malum migrat, per abusionem aut ipsius etiam solutio, ita nominatur, 5. aph. 7.

Metopon, *μέτωπον*, pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usque protensa, substantia musculosa, & osse subiecto constans; Alijs frons tantum dicitur quantum inter supercilia & capillos patet, pilis nudum. Alij totum id spatium quod ab oculis, ad coronalem usque suturam interiacet, frontem appellant, quod totum illud frontis os nuncupetur.

Metrenchytæ, idest uteri clysteres instrumentum est, per

est, per quod in vterum medicamentorum idoneorum aliquod immittimus, quemadmodum & Otenthytæ, idest auricularij clysteres; per quos in aures & Recti Syphiones, quos Catheteras vocant, instrumenta quibus in vesicam aliquid infunditur, 5. meth. 11.

Methodica medicina est, quæ communitatibus, et similium speculationi adhaeret, omnes enim particulares affectus, ad generales duos reducunt, adstrictum & fluentem, quas communitates vocant; lib. Introd. cap. 3.

Milphosis, *Μιλφώσις* idem est, ac Madarosis, pilorū defluuium est è palpebris, ab acri fluxione, vide *μαδάγρωσις*.

Mina Attica & Aegyptia, habet uncias sexdecim, Romana uncias viginti, lib. de pond. & mens. cap. 3. dicitur etiam Mina, Cordis capsula, & glandula, lib. de anat. vii.

Mochlia, traductio est ossis, aut ossium ad naturalem locum, ab eo qui præter naturam sit, lib. finit.

Modus morbi, vide Morbi mos.

Mola, *μῶλα*, est os latum & rotundum, toti generi suprapositum, ob figuræ similitudinem sic dictum, à quibusdam patella, rotula, *πίτυον* dicitur; Est adhuc mola, caro informis & inutilis, in muliebri utero concepta; quem conceptum inutilem in utero concretum, si subdurus sit, *μῶλον*, siue *μῶλον* Greci appellant, idest scirrhum.

Molares dentes, vide Dentes, & Toni.

Molli-

Mollicinum emplastrum, uide *Malthacode*.

Mollientia medicamenta, uide *Malagmata*.

Mollis pulsus est, in quo arteria quasi carnosior in occurſu apparet, durus ubi ſiccior, rigidiorque in modum Corij, de pulſ. ad Tyron. cap. 3. *mollitudo autem & durities ſunt tunicæ arteriæ qualitates*, ibid.

Mollities oculorum (quæ & *paralyſis oculorum* dicitur) morbus eſt, cum illorum voluntarius motus, omnino aufertur, quemadmodum cum minuitur, tremor et titillatio dicitur; Cũ verò deprauatur, ipſiusque lacerti, non ut decet, mouentur, *Spasmus* nuncupatur, lib. de ocul. par. 4. cap. 7. uide *Paralyſis*.

Monoculum, uide *Cæcum inteſtinum*.

Monohemera collyria ſunt, quæ unius diei opera, lippitudines apta ſunt curare, 4. de cõp. med. loc. c. 2.

Moram, ideſt *Triuon*, ſiue attritionem dixeris, *Hippoc.* appellat, callo obduratam ſedem, quæ ex diuturna capitis brachij immoratione efficitur, in ea carnis circũiecta parte, in quam id prima prolapſione incubuerat, 1. de artic. 21.

Morbidus rigor, perfrictio eſt ſanis eueniens, cum à nulla exteriori cauſa violenta corpus, ſed ex ſe talem obtinet diſpoſitionem, at cum aqua frigida corpori ſupra infuſa rigor excitatur, non eſt morbidus rigor, ſed cum ex ipſa corporis diſpoſitione ſuſcitatur, lib. de trem. conu. cap. 6.

Morboſum (vocatæ) dicitur, ut corpus, ut cauſa, ut ſignum, nam corpora quæ morbos continent, cauſa quæ

ſæ quæ hos efficiunt, & ſigna quæ ipſos indicant, *vōō* Au Graecis, nobis morboſa dicuntur, Gal. initio artis parua.

Morbus, *vōōs*, eſt diſpoſitio præter naturam lædens operationes, 2. criſ. cap. 2. primò & ſecundum ipſius ſubſtantiæ rationem, lib. de Sympt. differ. c. 1. præter naturam dicere, ſine contra naturam, nihil prorsus refert, utrunque enim vno uerbo *παρά φύσιν*, Graeci dicunt, nam & fœdus Ictericorum color, & lentigo, et alius quiuis etiam leuiſſimus affectus, contra naturam eſt, nec tamen morbus dicitur ſi propter ſui exiguitatem, actionem non laedat.

Morbus Herculeus, vide Comitialis.

Morbus magnus, vide Comitialis.

Morbus puerilis eſt Comitialis affectus, cum à naturali intemperie prouenit, quibus humidum natura eſt Cerebrum, teſte Hippoc. lib. de aëre, aqua & locis, ita ſcribente, pueris accidere conuulſiones & ſuſpiria, quæ putant puerulum efficere & ſacrum morbum eſſe, ubi per puerulum, intelligit affectum, com. 1. in 6. de morb. vulg. 5. vide Comitialis.

Morbus regius, qui Arquatus, Aurigo, & Icteros dicitur, eſt bilis reſuſio in cutem, quo fit ut ſuperficies tingatur, luteaque fiat, & vitictur cutis, albe quoque in ventre deiectiones fiant eo morbo affectis, lib. finit. vide Icteros.

Morbus ſacer, vide Comitialis.

Moria & Morofis, eſt deſiciens functio, ratiocina-

S natri

natricis facultatis, quae etiam fatuitas dicitur, Graece *μωγία*, *μωγωσις*, de sympt. diff. c. 3. vide Fatuitas.

Mortifera facies est, de qua in Prognostico dixit, *Naris acuta, oculi cōcavi, collapsa tempora*, 3. acut. 54. vide Facies Hippocratica.

Morbi mos, siue paroxysmi, quem etiam modum vocant, ut si benignus, uel malignus sit, tum ex propria morbi specie, tum ex superuenientibus ei symptomatibus, spectatur, 1. de crisi, cap. 3.

Motòs, *μωτòς*, linamentum, seu linteum carptum, quod vulneribus, ulceribus, apertionibus corporis, seu siccum, seu medicamentis quae ob id *ἐμμωτα*, vocantur oblitum, inditur; vel ad sistendum sanguinem, vel ad detergendum, siccandum, exedendum; Adhuc Motus linamenta vocant, & medicamenta sunt, quibus foris impositis, vel eschara ulceribus inducitur, vel meatus obstruuntur, uel cum carnosae partes quae circa vlcus sunt, ulceribus super imponuntur, aut ipsa cutis, aut quaecunque ipsi comminiscimur, 5. meth. 3. vide Emmota.

Motus naturalis, uel secundum naturam ac eius carentia est, quādo uoluntatis imperium sequuntur, si inuoluntariè in corpore fiant, praeter naturā sunt. Ad Thrasib. cap. 26. Motus enim sensibiles in animalium corporibus, cum sana sunt, duplices genere apparent, ex arbitrio sane, ac uoluntate, ac impetu, aut quomodocunque nominare uelint, nominum quidem periti, rerum autem scientiam negligentes, qui
nervo-

neruorum, musculorumq; ministerio fiunt; atque has medicivoluntarias actiones appellare solent; Alij verò motus in animantium corporibus existunt, qui arteriarum, & Cordis officio obeuntur, quos vitales nuncupant. Ac aliud quoddam tertium motuum genus in uenis habetur, quod et naturale dicitur, & sensibus non percipitur, lib. de trem. palp. cap. 2. Unde motus naturalis & genus & species motus est.

Mox apparentia symptomata, vide Affidentia.

Mucor, uide Coxendix.

Mucosum humorē, eū consuevit appellare Hippo. qui lentore quodam, & albedine præditus est, qui ad exangues partes, hoc est ossa, & chartilagines cogi consuevit, cum imbecilla ita natura est, ut bene consistere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctū quid relinquat; Non secus atque in oculis membranae relinquunt, cum lippitudine laborant; Euadit autem natura imbecillior, aut ex propria intemperatura, aut ex multitudine humoris, qui illuc confluxit, ut in præter naturalibus tumoribus, 3. de artic. 65.

Mucro est inferna corporis Cordis pars, quæ tantum protenditur, quantum Cordis magnitudo occupat spatij, 2. de placit. 4. vide Basis Cordis.

Mucronata chartilago, uide Chartilago ensiformis.

Mucus, siue Grauedo, siue Coryza, non est pituitæ species, ut quidam falsò asserunt, sed excrementum est quod à Capite disillat, 2. natur. fac. 9. Mucus

siue Blena est crassior pituita, 2. de sem. cap. 6. Prodigus, mucum vocat phlegma frigidum & humidum albi coloris, 2. de natur. fac. 9. Mucum adhuc vocat Hippoc. 4. de artic. 42. quem alibi vocauerat mucorem, vide Coxendix, Blena, Phlegma.

Muliebris fluxus est humorum delatio, per uterū, ad multum tempus perdurans, quam eius facit excretio, lib. finit. Vnde muliebria, idest menstruārū purgationum uacuatio, quæ per circuitū repetit, 3. prorrh. 50. 5. aphor. 28. uide Menses.

Mulsa, vide Melicratum.

Multitudinis (quæ & Plenitudo dicitur) notæ sunt, vasorum distentio, rubor, grauitas vniuersæ corporis, pigritia ad motiones, & tentiones membrorum, vlcerosa, & lassitudinaria sensio, traducta in otio prior uita, non sine ciborum ac potuū largiore ingestione, & solitarum excretionum suppressione, lib. de multitud. cap. 1. & lib. de cur. rat. per san. cap. 4. Est autem multitudo, omnium humorum æquabilis redundantia, uel ut alij, solius sanguinis; nō qui syncerus sit, et alijs humoribus impermixtus, sed cum ijs naturæ modo confusus, qui cum in hominum corporibus exuperat eius excessus πλεθώρα vocatur; Ea autem duplex est, una πρὸς αἷμα, vel ut alij vocant πρὸς τὸ ἔγχυμα, hoc est quo ad uasa, quoniam humoribus per uasa infusis, consistit; quæ & vasorum plenitudo dicitur, cum uenæ tunice in tumorem impletæ supra naturalem cuiq; modum se attolunt,

lunt, praeterque id tensio accidit, lib. de mult. cap. 10. Altera πῆξ τῆν Ἀλωαῖν, idest quoad vires, cū nonnulli qui consueta etiā nūm munia obeunt, senti re sese graues, pigros, segnes, atque egre mobiles re ferunt, lib. de cur. rat. per san. cap. 4. illa propriè Plethora dicitur, qualis athletarum est.

Musculus, lacertus, μῦς, nervosum corpus est, per mista huic carne, ad partium corporis motum pro creatus, lib. finit. Estque proprium instrumentum, mo tus uoluntarij in animalibus, 16. de usup. cap. 2. cuius substantia duobus constat, carne & fibris positu sim plicibus, & secundum longitudinem vt plurimum ex porrectis. Cuius tres sunt partes, caput quod & prin cipium appellant, in quod neruus & ligamentum in feri solent, venter carnosus magis, & musculum pre cipue circumscribens, & finis ex quo tendo & Apo neurosis oritur, atque in partes mouendas inseritur, 1. de motu musc. & 12. de usupar.

Musculi carnosī, sunt musculi recti, quibus nulla caro subest, vnde ambientibus musculis candidiores sunt. 5. de anat. adm. cap. 7.

Musculi cremasteres, idest suspensores, sunt duo graciles musculi, in utrumque testem peruenientes, quorum alter à pubis, alter ab ilium osse, per mem branosum ligamentum tenue exoritur, illic per mea tum qui ad testem deuenit, perferuntur, qui testem sursum attollunt, lib. de musc. diff. cap. 27.

Musculi masticatoriij, vide Mandibularij.

9. Musculi Rhachytæ, idest spinales, lib. de musc. diff. cap. 24.

10. Musculi temporales, uide Crotaphitæ & Mandibularij.

11. Musculus cuticulosus, uel carnosus cutis, qui extre-
mis cutis sedis partibus, admiscetur, lib. de musc.
diffec. cap. 30.

12. Musculus latus, μυῶδες πλατύς, uide latus
musculus.

13. Musculus maximus qui Psoa dicitur, est qui ab
imis regionibus exortum habens, ad humeri de arti-
culationem ascendit, lib. de musc. diff. cap. 31. vi-
de Psoa.

14. Mydesis commune nomen est, partium quæ ex pu-
trefactione corrumpuntur, lib. Introd. cap. 15.

15. Mydriasis dicitur, cum pupilla quidem, nihil co-
lore variat, dilatatur autem magis quam natura pos-
cat, ut Iridis circulo fiat proxima, & visioni noceat,
est enim pupillæ nimia dilatio, 3. meth. 2. & lib.
Introd. cap. 15.

Myelos, quasi medulla μέσλος, familiare ossis
nutrimētum est, 2. de usup. 16. substantia simplex est
humida, pinguis, alba, sensus expers in cauis ossium
contenta, exanguis quidem, sed ex sanguine in ipsas
cavitates per uenas illabente ortum habens, quæ si in
Cerebro spectetur, dicitur μέσλος ἐν σφαίρῃ, idest
medulla spinalis, uel σπονδιαίος, uel διασχενίος, uel ψοί-
ντος, ad alterius differentiam.

Myela

Myla, vide *Patella*.

Mylphæ appellantur, defluvia palpebrarum, 4. de comp. med. loc. 5. Adhuc sunt pharmaca arida, quæ scabris palpebris conueniunt, & ad palpebrarum defluvia conducunt, & obtusè cernentibus, siue per ætatem, siue crassitudinem, aut frigiditatem humorum in oculis, aut flatus caliginosi redundantiam, id accadat, ibidem.

Mycephalon, idest, muscæ caput, est exigua vuae tunicæ porrectio in nigro oculi, muscæ capiti similis, per ulcerationem facta, lib. finit. species est τῆς ἀποτρίσεως, idest procidentiae oculi.

Myodes platysma, vide *Latus musculus*.

Myopiasis, est dispositio ab ortu contracta, quæ propinqua cernimus, remota vel parum, uel omnino nihil, lib. finit. μυῶπια affectio, μῶψ, qui afficitur; differt à *Nyctalope*, qui non natura, sed morbo talis euasit; uide *Lusciosus*.

Myracopa, medicamenta sunt, quæ lassitudines tollunt, cum quadam odoris suauitate, 6. de comp. med. per gen. cap. 11. μυράκωπον Græce.

Myrmecia μὲν μύρμηκα καὶ ἀνθρώπων, utrunq; malum, cutis exigua est excrescentia callosa, & magna ex parte rotunda. Sed *Myrmecia* latiore basi & sessilis est, ac in scalpendo & attritu mordentis formicæ sensum efficit, ideoque Latinis formica appellatur.

Acrochordon autem basim angustiore obtinet, ut chordæ nexu suspensa esse uideatur, Latini verrucā

vocant simpliciter, aut cum adiectione pensilem. 2. meth. 2. quas Clauos, Callos, & Pylus uocant, quas aceto acri macerantes corticem arboris Itæa combustum, tollunt, 6. simplic. vide Formica.

Myxis, idest meatuum conuientia, vide Stegnosis.

Myurus pulsus, siue Sorici cauda, est qui Soricis, murisue caudam imitatur, quæ in acutum terminatur, ut cum secundus ictus primo est paulo minor, tertius secundo, quartus tertio, 1. de differ. puls. cap. 11. à figuris nomen, quæ in acutum terminant; mutantes, ibid. Adhuc myuri pulsus dicuntur, qui ex maiori adaueto fiunt minores, ex frequenti rariores, ex celeri tardiores, lib. finit. μυουρίων σφύγμων Græce.

Myxa, Græce μύξα, est humor ex naribus fluens; Latinis mucus, & pituita narium dicitur.



N



NARCOTICA, quæ & hypnotica, stupefacientia, somnifera, Græce ναρκωτικά φάρμακα (Colica etiam appellantur, 5. de comp. med. loc. cap. 9. & lib. 7. cap. 5.) nuncupantur, hoc est somnii conciliantia medicamenta, quæ temperiem sortiuntur, uel summe aduersam iis quæ reuera sunt anodyna; refrigerant siquidem omnia corpus, & sensum eo usque obstupesciunt, ut si paulò liberalius ebibantur mortem afferant, 5. simplic. 19. vide Anodyna, Colica, Hypnotica.

Nares, μυττήρες propriè dicuntur, concauæ nasæ par-

partes vtrinq̃ue posite, quæ meatum præbent spiritui
 & odoribus, veruntamen quandoque totum etiam id
 membrum ~~interius~~ à medicis appellatur, qui Latine
 Nasus dicitur, odoratus instrumentum, quippe si oc-
 clusis naribus spiritum ore adducimus, odorem nul-
 lum sentimus, sin autem spiritum apertis naribus at-
 trahimus, odor sensum protinus mouet, in medio oculo-
 rum prominens, lib. de instr. odor. cap. 1. Nasus ue-
 rò in se septum quoddam per media loca diductū ha-
 bet, duoq̃; foramina satis conspicua, hæc inquam,
 quæ cernuntur, & in singulis naribus singula sunt,
 nares dicuntur, ibid. cap. 2.

Narium alæ, vide Alæ narium.

Nasus, uide Nares.

Nates, quas ~~πυγὰς~~, & ~~γλουτὸς~~ Græci uocant,
 sunt inferiores corporis partes, quibus natibus carno-
 sa corpora substrata sunt, quarū gibbæ partes, quod
 orbiculares sunt, spheromata, ceu modo orbium fa-
 cte Græcis appellantur, lib. Introd. cap. 10.

Nates Cerebri, vide Glutia.

Natiuus calor, (quem & calidum innatum uocāt,
 cuius ui omnium animantium vitam natura modera-
 tur) apud Galenum est aut anima, aut pri-
 mum & præcipuum animæ instrumentum, quo om-
 nia, quæ sunt ad vitam necessaria, administrat; cuius
 caloris præsentia, uita est, vt absentia mors; inæqua-
 liter in singulis corporis partibus dispersus; In Corde
 flagrantissimus, in uentriculo & præcordijs mode-
 ratio

rator, in capite & Cerebro adhuc minor, in ossibus perexiguus, pro ut natura unicuique particula expedire adiudicauit. Hic fixus insitusq; dicitur, hoc est à natura, in prima conformatione singulis partibus certa mensura inditus; Cui calor fluens aduentitiis opponitur, quem natura in Corde tanquam in quodā penu collocauit qui ab eo per arterias cum spiritu & sanguine suis vehiculis & pabulis continenter depromitur, ferturque in singulas partes, ut earum calorem natium, fixum, insitumq; foueat, atq; instauret; qui calor fluens, in mœrore, metu, uerecundia initio, frigore, accessionum principijs & somno, intrò cum sanguine & spiritu ad Cor recurrit, ob idq; per eos affectus, & cutis & subditę illi partes frigent et pallent, contra in gaudio, uerecundia iam uigente, statu accessionum, vigilia, ad cutim copiosior effunditur, cum spiritu, & sanguine, à quibus, calor, rubor, tumor & nitor inducitur.

Natura nomine, temperamentū intellexisse Hippocratem, atque id esse præcipuum, & maxime proprium Naturæ significatum, ab ipsa naturæ substantia desumptum, cum sepiissime, tum libro toto de natura humana, Galenus testatur, 3. aphor. 2. ubi naturarum has dicit æstate, has hyeme, male beneuē se habere.

Naturalis motus, uide motus naturalis.

Naturalis uirtus, quomodo ὁὐκ ἀπορίᾳ, à Galeno in arte parua, distinguitur, in primas, seu principes, & in se-

in secundarias, siue ministras; primæ statuuntur tres generatrix, auctrix, nutrix. His omnibus singulis, aliæ quatuor inseruiunt, attractrix, retentrix, concoctrix, expultrix, quæ non in iecinore modo, sed in omnibus vel minimis corporis partibus, insunt.

Nauiforme os, uide Scafoides.

Nausea, uide vomitus.

Nauseationes in uenis, idest, ναυστίας appellat Hippocrates quas prius vocauerat exuccationes hoc est sugillationes, cum venæ (more eorum qui nauseâ patiuntur, & euomunt,) sanguinem expuunt ac quasi euomunt, tum ex propria imbecillitate quam ex inflammatione contraxerunt, tum ex ipsius sanguinis copia, & prauitate, 2. de fract. 24.

Nebulæ, Græce νεφέλαι, sunt utriusque oculi membrana ex aliquo ulcere tenues & superficiariæ albedines & caligines, nam si crassiores sint & profundius petant Λευώματα, & albugines dicuntur, lib. de re med. par. fac. cap. 12.

Nephritis dicitur omnis affectus, quo ren laborat, siue is similis sit ut intemperies, siue instrumentalis, ut Calculus, siue communis, ut ulcus inflammatum; propriè tamen Lithiasis, idest calculi morbus, nephritis appellatur, lib. de ren. aff. dign. cap. 2. Omnes verò homines qui subinde difficulter meiunt, aut etiam suppressam urinam omnino habent, ubi circa lumbos dolent, ac arenosa meiunt, nephriticos dicunt, quo calculo emisso, eorum protinus dolor, & urine

urinae suppressio desinit, 1. de placit. cap. 13. Vnde nephriticas antidotos, & compositiones appellant, quas renibus affectis accommodant, ut ex ipsa appellatione manifestum est; nephritice enim nihil aliud, quàm renales sonant, 10. de comp. med. loc. cap. 1.

Nervum quidam appellant, omnia similarium corporum genera, in animalibus quæ & exanguia, & si nūcarentia videntur, ut quæ ex ossibus ab Hipp. Copula vocata, quæ ex Cerebro & dorsali medulla ab eodem propriè Nervus & Tomus, dicta, quæque ex musculis Tendo, dicti, prodeunt, quidam igitur omnia hæc nervos appellant, primum ipsorum genus colligatorium esse aiunt, secundum autem sensibile, atque electorium, tertium aponeurosim, hoc est nervorum propaginem, cognominant, cō. 1. in 6. de morb. vulg. νεῦρον igitur, ἀπὸ τοῦ νῆναι, Græcis dictum est, quod nutare & flectere significat, ut docet Gal. initio libri de motu muscul. vide Tonos.

Nervum colligantem medici vocant, νεῦρον συνδεδεµένον, quem Hippoc. vocat ligamentum seu σύνδεσμος, Copulam, ex ossibus ortum ducit, vide Nervū.

Nervi duri & molles non eadem substantia sunt, molles enim ad sensum, duri ad motum sunt destinati; non quidem quod duri non sentiant, sed à duris hebetior & obtusior sit sensus, quàm à mollibus, mollium principium est Cerebrum, lorum spinalis medulla; ab hoc principio singuli in suas sedes à natura mittuntur, molles quidem in organa sensuum, duri in
muscu-

musculos; dicuntur autem molles, uel duri, sibi & ad Cerebrum, collati.

Nervos opticos, seu visiuos, vide nervos sensificos

Nervos sensificos in genere uocant, qui ad sensum instrumenta mittuntur, alijs quidem qui mouent membrum molliores, 7. de plac. 5. proprie autem sensificos uocant nervos siue Poros, nervos à Cerebro ad oculos descendentes, qui soli sunt conspicua & sensibiles via spiritus, 10. de usup. 12. eosdem Opticos vocat, 16. usup. 3. eosdem & uisiuos ab actione nomen imponentes, lib. de nervor. diff. cap. 2.

Nerui uocales sunt nerui gutturis, qui ad instrumenta vocem concinnantia proprie pertinent, quos Galenus, & inuenit, & eo nomine donauit, quibus vel incisis, vel laqueo interceptis, uox perit; qui alij sunt à nervis apud arterias existentibus, quos recurrentes nominant, ipsorum enim essentia pars sunt, utriusque enim vocem efformant, 1. loc. aff. 6.

Nervus caucernosus, vide Nervosum.

Nerui uoluntarii (ne equiuoca nomina obscuritatis aliquid afferant) qui ex Cerebro, dorsi que medulla ortum ducunt, qui ex musculis tendones, qui ex ossibus ligamenta à nobis appellantur, lib. de ossib. in proœmio.

Nervorum coniugatio dicitur, quoniam nervus non unus aut simplex aut ἁπλῆς, à suo principio proficiscitur, sed omnes coniugati feruntur, ideoque ab anatomicis nervorum paria appellantur, ac septem qui-

quidem paria à Cerebro, triginta verò à spinali medulla proficiscuntur.

Nervi recurrentes, νεῦρα παλινδρομοῦντα, sunt ramī duo nervorum sextæ coniugationis à Cerebro prodeuntium, quorum dexter circum arteriam quæ axillam adit, sinister verò circum magnum arteriæ descendētis truncum obvolutus, sursum reuertitur in laryngem, ad vocem efformandam, quare Galenus 4. loc. aff. φωνητικῶς, maluit appellare, idest vocales, ita enim sunt necessarij ad vocem, ut secti vel intersepti vocem prorsus aboleant; refrigerati verò tantisper vocem impediunt, donec calefacti, naturalem temperiem recuperauerint, 1. loc. aff. 6.

Nervosum, νεῦρωδες, corpus est spermaticum, & exangue, ad nervi naturam & similitudinem accedens; licet enim Galenus tria nervorum genera dicat initio, lib. 15. de usu part. & com. 1. in 6. τῶν ἐπιδημιῶν, ut verbo Nervum docui; præter illa tamen tria genera, sedes, uterus, vesica, & pudendum nervosa dicuntur, cum tamen nullo prædictorum generū contineantur, aut cōponantur; sed quod nervosorum corporum similitudinem gerāt, contrahi enim in angustum, & extendi in latum possunt, quæ corpori carnoso & pingui non conueniunt. Unde quidam Penis colem, nervum caavernosum appellant, ab eoque penem & ipsum totum caavernosum uocant, quod contrahi, extendique possit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Nervosæ discriminationes sunt fines membranarum,

rum, quæ orificijs cordis adiacent, 1. de placit. 10.

Nestes intestinum, vide Entera, & Ieiunum.

Neurotonus est is, qui in nervis uel tendonibus, sine discrimine, vulneratus est, 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Neutrum corpus est, vel quod neutrius extremæ dispositionis est particeps, uel quod utriusque, uel quod nunc huius, nunc illius, ut salubre nunc, nunc insalubre, lib. tegn. cap. 6.

Nigra bilis est humor melancholicus, qui dū animal naturaliter se habet, quotidie gignitur, quæ alia est ab ea quæ ex vstione ac uelut assatione conflatur, 14. meth. cap. 9.

Nigra uena, uide Media, Communis.

Nigritia, & Nigror, uide Contusio, & Effusa.

Nodi sunt extrema pars postbrachialis, à quibus digiti incipiunt, quos Condylus Græci uocant, lib. Introd. cap. 10.

Nomas appellare medicis mos est, putrescentia ulcera, ab eo quod putredo depascit, & ad vicinas partes serpat, (ἀπὸ τοῦ νέμειναι, quod pascere significat) una cum primum uitiata, & ipsas corrumpens, 9. simplic. vide Phagedenas.

Nothæ costæ, uide Illegitimæ.

Noton, uide Tergum.

Notyos myelos, uide Myelos.

Nubis nomen, solent medici ab aëre ad urinas transferre, siue Hippocrates, hoc nomen primus pro aliqua

aliqua eorum quæ pendent in urina, specie, vel *Vri-*
narum, siue is alius attribuerit; Vt ergo in aëre inte-
rim tempestas fit, ubi nubibus condensatus sit atris,
caliginosa; interim purus apparet & serenus, uiden-
turque nubes quedam per eum disiectæ, actum aër
nubilosus dicitur; quo quidem tempore nubium cer-
nimus colorem, non exquisite atrum, nec lucidum,
sed inter hos medium; haud aliter nubes in urina,
quam vocat etiam Hippocrates nebulosam suspē-
sionem, alia alba, alia nigra, alia media est, com. 1. in
3. de morb. vulg. 4. quæ dicitur Nubes, Nubecula
sublimamentum, ἐναϊώγημα ἐπὶ τῷ σπέρματι, Ceterum
id omne crudum esse, & à flatuoso spiritu, in altum
efferrī Galenus docuit, quod uerò perfecte concoctū,
secretum, æquale simileque est, id certe quoniam
nihil flatus habet, in fundum uasis urinarij descendit.

Nucha, vulgo appellatur, quæ Latine spinalis
medulla, Græce ναιτιαὶν μυελόν, vide Medulla
spinalis.

Nutrimētum est, quicquid substantiam nostri cor-
poris conseruare, & augere aptum est, 1. simplic. c. 1.

Nutritio est continuo effluentis substantiæ reinteg-
ratio, vnumquodque verò, eā substantia, quā pri-
mum genitum est, ali etiam perpetuò consueuit, 1. de
semin. cap. 16. vide Prothesis. Vocatur autem al-
teratio ipsa, usque quo alimentum in similitudinem
partis, quæ nutritur, transmutatur, concoctio, vbi
verò iā parti apponit, nutritio, 8. de cōp. med. loc. c. 6.

Nyctæ-

Nyctalops νυκτάλωψ, *lusciosus*, is est qui die videt obtusius, sole occiduo acrius, nocte magis adhuc, vel contra, die parum, uesperis aut nocte prorsus nihil, unde nocturna oculorum cæcitas appellatur, 2. meth. 2. 4. de cõp. med. loc. 8. & lib. Introd. vide *Lusciosus*.

Nympha, vide *Colliculum*.



O *B A V D I T V S*, sine *Obanditio*, est vitiosa actio auditricis facultatis, pro portione respondens vitioso visui, veluti cum oculis, colore, figura, magnitudine, vel situ mutata videntur, differens à *Barycoia* quæ est audiendi difficultas, gravis auditus, seu diminuta audiendi actio, ut *surditas* est ablata audiendi actio; Aufertur autem, minuitur, vel depravatur auditus, aut lesa aliqua aurium particula, aut nervo qui in has à Cerebro, pertinet, aut Cerebro ea parte, qua is nervus exoritur, 1. de Sympt. caus. cap. 3. 4. 5. vide *Barycoia*.

Obliquatus pulsus est, qui non constituta in rectum arteria præter situm editur, lib. finit.

Oblongum & depressum dicitur ossis caput, ad cervicem id ipsum cui adnascitur, referentes, lib. de ossib. in proæmio.

Obeleæ sutura, est cranij cõmissura recta, quæ à media syncipitis sutura ad mediã suturã occipitis secundũ longitudinem extenditur, Græce dicitur, ὀβελία, καὶ

παβδολιδὸς παρὰ, utrunque nomen inditum est, quod veru aut sagittæ, aut uirgæ instar recta incedit, Latini rectam & sagittalem vocant, 9. de vsup. 17. et lib. de ossib. in proæmio.

Observatio, *Τήναις*, Empiricorū uox est, qui quicquid obseruassent fieri in morbis, id *ἀπορία*, & quasi axioma nuncupabant; à qua proxime artem constituebant.

Obstipitas est distortio spinæ ad lateralem corporis partē, 3. de artic. 2. quam Scoliosin Græci uocant, vide Cyphosis.

Obstructio, vide Compressio.

Obstruentia corpora, quæ Græce *Stegnotica*, quæque generaliori nomine contrahentia, occludentia, et constringentia dicuntur, sunt quæ ora uasorum occludunt, & quæ sensibiles excretiones cohibent. Corpus enim *stegnoticum*, quod claudit, et continet in se, nec quicquid quod sensu queat percipi, ex se se emittit, Græce *στεγνόν* nuncupatur; Differunt à condensantibus, quod hæc poros & meatus corporis cōtrahāt, obstruentia autem & oppilantia, uasorum corpora. 5. simplic. 14. illa *στεγνωτικά*, hæc *πυκνωτικά* Græci uocant.

Obstupeſcentia est, cum æger iacens, neq; aliquid dicit, neque agit, sed apertis oculis quietus manet, similis ijs, qui ex timore sunt attoniti, 7. aph. 14.

Occiput, *ινιόν*, ea est capitis pars, quæ à uertice tanquam à centro circuli, vnde capillorum prouentus

tus incipit, ad posteriorem Capitis partem, usque ad Tendones, descendit, lib. Introd. cap. 10.

Ochima trofis, idest, nehiculum nutrimenti, simul cum appellatione, usum ostendens, quod Hippoc. uocat serosum recrementum, est aquosa & tenuis sanguinis humiditas, ad crassam substantiam Chymi, per arctas uenas, in totum corpus ferendam, 4. de vsup. cap. 5.

Ochthode ulcera, idest, uerrucosa, quae non maligna & contumacia sunt, sed solum labra callosa & dura habent, 4. de comp. per gen. cap. 5. vide Dulcia ulcera.

Ocrea, uide Tibia.

Odaxismus, ὀδᾱξιμός, est pruritus is, qui conceptis iam intra gingiuas dentibus, & erumpere festinantibus, sentitur; quo solent infantes relatis ad os digitis, identidem eos morderé, & ipsi gingiuas suas confricare.

Odontalgia, idest dentium dolor, 2. meth. 2.

Odontoides, uide Dentem.

Odontophya, puerorum est dentitio, ubi scilicet & gingiuis prorumpunt dentes.

Odoratum, nominant, non solum odoris sensum, sed etiam vim ipsam, cuius odorandi officium est, lib. de Instrum. odor. cap. 1. ὀσφῆνους Graecè.

Oedema, ὄδιμα, uidetur Hippoc. omnes prater naturam tumores, hoc uocabulo nominare, siue dolore careant, durique sint, quos scirrhus Graeci ap-

pellant, siue dolorem inferant, quos phlegmonias, idest inflammationes propriè uocant, siue absque dolore laxi, atque molles sint, hos uerò solos οἰδυμᾶτα, Græci nominant, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Atqui oedema est tumor præter naturam, qui dolore vacat, & digitis cedit, & si aliquando apud Hippoc, significet durum, & dolentem tumorem, 1. progn. 29.

Oenodes uinum, idest, uinosum, quod multam susinet aquæ mistionem, & imbecilles uires ferit, quod & Polyphorum, & multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam, Contrario autem modo, Oligophoron, siue pauciferum, quod ut bibatur minima eget aquae mistione, 3. acut. 20. & 7. meth. 6. uide Hydatodes.

Oesophagum ueteres nominabant, eam partem, quæ inter fauces, & os uentriculi media est; Aristoteles & qui post eius seculum scripserunt, stomachum, nos gulam appellamus, quæ uia est eorum quæ tum deuorantur, tum uomitione deijciuntur; 5. loc. aff. 5. gula, Arabibus Meri dicitur.

Oesyperus, idest, lana succida, siue non lota, 14. meth. 7. uide Lana succida.

Olecranos, quartus est musculus, qui per profunda adit cubitum, in medio gibberi, interioris, inferiorisque brachij capitis interuallo constitutus, 3. de anat. adm. cap. 4. à quo, & Cubitus, & Cubiti os, Olecranos appellantur, uide Ancon.

Oligophoron, uide Oenodes.

Oligo-

Oligotrophia, idest, parcior nutritio, 3. sanit. uen. cap. 8.

Omentum, ἐπιπλοὺν ἢ ἐπιπλουν, est corpus membranosum ex duplici peritonæi, ceu plexu compositum, procedensque medium inter uasa, quae in ipso continentur, quibusdam aut multo infra quam umbilicus consistens, quibusdam ad pubis ossa descendens, cum in primum, ceu ad Umbilicum, paruae magnorum uasorum soboles, ex alto deferuntur, 6. de anat. adm. 5. ex duabus tunicis densis, & subtilibus sibi incumbētibz, quam plurimis arterijs & uenis, & pinguedine non pauca conflatum, gratia calefaciendi, 4. de usup. 9. quod Epiploon, siue Epiplun, Arabibus Zirbus, Antiquis Rete, quod ita instructum Omentum reti non sit absimile, indeque & γαγγραιὼν, & δάκτυλον à plerisque dictum fuit, lib. de neru. & art. diss. c. 1.

Omiacea uena, idest humeralis, ramus est uenae cauae claviculas supergressae per omoplatā in brachiū descendens, quā Galenus interdum externam uocat, ad differentiam axillaris, quam internam nominat, uide *Humeraria*.

Omotribes, siue Omphacinum oleum, idest crudum oleum, ex oliuis immaturis expressum, 8. meth. 3.

Omoplatæ (quae & homoplatæ dicuntur, & Scoptulae, 8. meth. 8.) idest scapulae quae humeri articulum constituunt; est enim in extremo scapularum insculpta capacitas tanta magnitudine, quanta Capi- si brachij dearticulando, cui inseritur, esset aptissi-

ma, 13. de vsup. cap. 10.

Omos, humerus. Proprie dicitur id totum, quod in articulatione brachij cum Omoplate apparet sensibus, est enim reuera ipse articulus brachij cum Omoplate.

Oncos, apud Hippoc. idem est ac tumor, significatque id, quod est supra id quod est secundum naturam incrementum, lib. de tumor. cap. 1. Onchos uero & Poros quidam nostri corporis meatus uocant, 1. simplic. cap. 1.

Onix, idem quod *πύρις*, lib. finit. est autem puris collectio in nigro oculi, cum phlegmone, iuxta Iridē, Graece *ὄνυξ*.

Ophiasis, est affectus capitis, quo capilli primum extenuantur, deinde decidunt, certis spatijs in Serpentis similitudinem; Idem reuera cum Alopecia malū est, solaque figura ab eo differt, uide Caluities & Madarosis.

Ophthalmia hoc est lippitudo, frequentissima oculorum affectio, estque inflammatio tunicae, seu pelliculae os capitis, & Caluariam ambientis, quam et membranam agnatam uocant, propterea quod alijs quae oculum ipsum constituunt, tunicis, forinsecus adnata sit, ligamentum existens toti oculo, ad circumfita ossa, & ob id omnia quae circum circa oculos sita sunt, usque ad malas, quandoque in uehementi lippitudine attolluntur, 4. de cōp. med. loc. c. 2.

Opium, est papaueris lacrima & succus, 2. de antid. 7.

tid. 7. Unde opiata medicamenta sunt, quibus opium admiscetur, quae Arabes vocant *Alfabiar*, idest *Somnifera*.

Opistotonos, uide *Distentio*.

Opopanacem vocant *Panacis guttam* & liquorē,
3. de comp. med. per gen. cap. 5.

Oppilatio, uide *Compressio*, & *Obstruentia*.

Optici nervi, sunt primum nervorum par, quod cū utroque *Cerebri panniulo*, ad oculos descendit, secū visibilem spiritum ducens, lib. de ocul. par. 2. cap. 3. uide *Nervos sensificos*.

Ordinatus pulsus est, quando ictus pari semper numero, paribusque pulsibus procedunt, quique per circuitum par est, de Puls. ad Tyron. cap. 6.

Orexis, ὀρέξις, appetitus, siue appetentia; est concupiscentia cibi & potus, quam *Hippoc. Λιμὸν*, hoc est famem appellavit, eo aphorismo, quo scripsit, famem meri potione solui, ut in commento *Galenus* annotavit.

Oricularia, vide *Laminas*.

Oroboides Urina, quae habet hypostasim similem orobis, eaq; fit à Colliquatione, & dissolutione Carnis, lib. de urinis, cap. 26.

Oros dicitur à quibusdam τὸ πᾶσι δὶὸν, hoc est pars tota pedis superior, quam alij πολυόσσειον appellant, idest multorum ossium, *Orros* verò tum serum lactis significat, tum *Perinæon*, tum etiam sacri ossis extremum, ad Caudam usque protensum.

Orthocolon, ὀρθόκωλον, quasi rectus articulus est articuli uitium, quando ob durum aliquem tumorem chorda musculos partem aliquam inflectentes, non sequitur, sed perpetuo articulus tenditur, nec inflecti potest, 3. de artic.

Orthopnea, quasi rectam spirationem dixeris, est magna spirandi difficultas, ut non aliter ea fieri possit quam recta cervice & thorace, qualis iis accidit, qui velociter cucurrerunt, unde affectio ὀρθόπνοια, qui sic affecti dicuntur ὀρθόπνοιοι. Idem malum ab alio symptomate Asthma nuncupatur; uiscosis, & crassis humoribus, circa asperas in pulmone arterias sine febre cōgregatis, 1. de difficult. respir. cap. 11. & cō. 4. in 6. de morb. vulg. 4. vide Anhelosi.

Os στόμα, duobus modis dicitur, primum quantum diducta labra patent; secundo & propriè totum id spaciū, quod diductis labris ad imas vsque fauces interiacer, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillæ duæ continentur, quarum omnium partium vna tunica est, etiam naribus communis.

Ossa, ὀστά, partes humani corporis durissime siccissimæ, maximeque terrestres & frigida sunt, quæ se mutuo, & alias partes omnes, tanquàm fundamenta sustinent, & firmant, atque ad vniuersam corporis substantiam sustentandam subijciuntur, quibusq; omnia adnascuntur, & stabiliuntur, lib. de ossib. in proœmio.

Ossa alata, vide Pterigodes.

Os Ballistæ, vide Astragalus.

Ossa cavernosa, vide ossa Ithmoidea.

Os chartilagineum, est quod ad caput Cordis innuitur, ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur, quod aliqui os chartilagineum, alij chartilaginem osseam nominant, 7. de anat. adm.

Ossa colatoria, sine Colo similia, vide Ossa Ithmoidea.

Os cubiforme, vide Os Cyboides.

Os Cyboides, idest, cubiforme, est quod ab externis Tarsi partibus, est locatum; firmumque in terra statuitur, 3. de vsup. cap. 7. & de articulatur cavitati calcanei, ad finem adiacenti, ibid. cap. 8.

Ossa foraminulenta, vide ossa Ithmoidea.

Os frontis, quod vulgus Coronale vocant, vide Coronale os.

Os humeri, quod Arabes, os adiutorij vocant, vide Adiutorij os.

Ossa Ithmoidea, sunt ossa quadam foraminulenta, & cavernosa in meatu olfactorio posita, quæ natura variè pertusa velut spongiam & cribrum apposuit; simul ne aliud corpus durum extrinsecus incidat, simul ne viribus integris aër frigidus inspirantibus nobis, recta in Cerebri ventriculos se se insinuet, simul ut vapor odorem secum ferens per ea foramina à Cerebro recipiatur, simul ut Cerebrum vacuaret repente ac semel si quando vsus inciderit, excrementorum copiam; quæ quoniam ad Cribri & spongiæ similitudinem

Orthocolon, ὀρθόκωλον, quasi rectus articulus est articuli vitium, quando ob durum aliquem tumorem chorda musculos partem aliquam inflectentes, non sequitur, sed perpetuo articulus tenditur, nec inflecti potest, 3. de artic.

Orthopnea, quasi rectam spirationem dixeris, est magna spirandi difficultas, ut non aliter ea fieri possit quam recta cervice & thorace, qualis iis accidit, qui velociter cucurrerunt, unde affectio ὀρθόπνοια, qui sic affecti dicuntur ὀρθόπνοιοι. Idem malum ab alio symptomate Asthma nuncupatur; uiscosis, & crassis humoribus, circa asperas in pulmone arterias sine febre cōgregatis, 1. de difficult. respir. cap. 11. & cō. 4. in 6. de morb. vulg. 4. vide Anhelosi.

Os στόμα, duobus modis dicitur, primum quantum diducta labra patent; secundo & propriè totum id spaciū, quod diductis labris ad imas usque fauces interiaceret, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillæ duæ continentur, quarum omnium partium vna tunica est, etiam naribus communis.

Ossa, ὀστά, partes humani corporis durissimæ, siccissimæ, maximeque terrestres & frigida sunt, quæ se mutuò, & alias partes omnes, tanquàm fundamenta sustinent, & firman, atque ad vniuersam corporis substantiam sustentandam subiiciuntur, quibusq; omnia adnascuntur, & stabiliuntur, lib. de ossib. in proœmio.

Ossa alata, vide Pterigodes.

Os Ballistæ, uide Astragalus.

Ossa cauernosa, uide ossa Ithmoidea.

Ossa chartilagineum, est quod ad caput Cordis inuenitur, ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur, quod aliqui ossa chartilagineum, alij chartilaginem osseam nominant, 7. de anat. adm.

Ossa colatoria, siue Colo similia, uide Ossa Ithmoidea.

Ossa cubiforme, uide Ossa Cyboides.

Ossa Cyboides, idest, cubiforme, est quod ab externis Tarsi partibus, est locatum; firmumque in terra statuitur, 3. de vsup. cap. 7. & de articulatur cavitati calcanei, ad finem adiacenti, ibid. cap. 8.

Ossa foraminulenta, uide ossa Ithmoidea.

Ossa frontis, quod vulgus Coronale vocant, uide Coronale ossa.

Ossa humeri, quod Arabes, ossa adiutorij vocant, uide Adiutorij ossa.

Ossa Ithmoidea, sunt ossa quædam foraminulenta, & cauernosa in meatu olfactorio posita, quæ natura variè pertusa velut spongiam & cribrum apposuit; simul ne aliud corpus durum extrinsecus incidat, simul ne uiribus integris aër frigidus inspirantibus nobis, recta in Cerebri ventriculos se se insinuet, simul ut uapor odorem secum ferens per ea foramina à Cerebro recipiatur, simul ut Cerebrum vacuaret repente ac semel si quando vsus inciderit, excrementorum copiam; quæ quoniam ad Cribri & spongiæ similitudinem

dinem perforata sunt, ideo ithmoidea, & spongoidea dicuntur, 8. de vsup. cap. 6. & 7. quæ ossa Galenus 3. loc. aff. 10. colatoria, uel colo similia uocat, quod per illa crassum Cerebri excrementum purgetur & percoletur; quod Arist. vocat Perittoma; tenuiora autem excrementa, & quæ uapori similia sunt, in sublime lata per caluaria suturas excernuntur; crassiora autem prona feruntur, quorum altera pars in eas vias, quæ ad os pertinent, influit, & per screatum eijcitur, altera quæ mucus dicitur in nares, & per efflatum vehementem, excernitur, lib. de instr. odor. cap. 2.

Os Iugale, vide Zygoma.

Os latum, uide Spina.

Os magnum, vide Spina.

Os nauiforme, uide Os scaphoides.

Os palati, uide Sphenois os.

Os petrosum $\Lambda\iota\theta\epsilon\iota\sigma\acute{\alpha}\varsigma$, ossis nomen, sic dicitur pars ossis temporalis, protensis futuræ lambdoidis finibus terminata, sic dicta, quod petræ vel rupi videatur similis, non duritie modo, sed etiam specie.

Os sacrum, $\sigma\omicron\tau\upsilon\nu\ \iota\epsilon\gamma\epsilon\nu$, duobus modis à Galeno sumitur, vno latius ut Coccygem etiam apprehendat ut 12. de vsup. scribens os sacrum cōstare ossibus quatuor, tribus scilicet proprijs & Coccyge; hæc enim ossa sibi vnita per symphysim, efficiunt vnū os, quod parte superna vocatur sacrum, inferna Coccyx. Altero, sumitur pro ea tantum parte quæ re uera sacra est,

est, idest magna & lata, quaparte hoc os, cum offe alio per synarthrosim iungitur, idest magnum & latū, tuncq; eius reliquū gracilescens semper ac tenuatum, in tres cartilagine acutissimas desinit, & Coccygem vocāt, lib. de ossib. cap. 12. et 3. de artic. 104.

Os scaphoides, vide Scaphoides os.

Ossa spongoidea, uide Ossa Ithmoidea.

Oscitatio & Pandiculatio, sunt mediocres motus uirtutis expultricis Cerebri, 2. de sympt. caus. cap. 6. per quæ contenta aliqua in musculis (per quos quoq; voluntarij fiunt motus) uel humiditate flatuosa, uel spiritu flatuoso expurgantur, 7. aph. 56. Oscitatio tale quidem in solis maxilla inferioris musculis accidit, quale in Pandiculatione in omnibus musculis symptoma est; utraque. n. euacuandorū in musculis halitusorum excrementorū causa fit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 4. & 7. aph. 56. χάσμη illa, ἡ ἐκ ἀναρρίπνυα, Graece.

Osculorum apertio, quæ tum in arterijs & uenis fit per resudantiam, & dicitur Anastomosis, siue Exanostomosis, tū in ulceribus & uulneribus, quæ sinuosa sunt, fistulosa, & angusti orificij, quæq; dehiscunt, 6. de comp. med. loc. cap. 2.

Ostocopi, idest, ossium dolores nominantur, cum membranarum quæ ossibus adiacent dolores & profundi sunt (idest in intimo corpore sensum excitantes) & ossium ipsorum ueluti dolentium inducunt imaginem, qui magna ex parte ab exercitationibus eueni-

re so-

re solent, interdum à frigore & plenitudine, 2. loc. affect. 8.

Ostracoderma, animal omne est, cui pro cute, testa est, lib. 1. de aliment. fac. cap. 1.

Ostraga, instrumenti genus est, quo in ossium fracturis, collisionibus & comminutionibus utimur, 6. metho. 6.

Otalgia, aurium dolor est, non omnis quidem, sed qui ad profundū auditorij meat⁹ pertinet, 2. meth. 2.

Otenchyte instrumenta sunt chirurgica, quibus aliquid in aures infunditur, Aurifusoria spicilla ab aliis quibus, à Celso strigiles, aliàs auriculares clysteres appellantur.

Oxelæum, idest compositio ex aceto & oleo, 1. de comp. med per gen. cap. 7.

Oxycratum, idest compositio ex aqua & aceto, 1. simplic. 29.

Oxydercica facultas, est quæ oculis, ubi nullum insit illis sensibile pathema, male tamen munere suo fungentes, corrigit & in integrum restituit, ac nimirum & in auribus & naribus, & per quemque aliorum sensuum singulatim pro portione talis quædā sit facultas, est necesse, quæ in auribus oxycos dicitur, 5. simplic. 23.

Oxygalax, idest acidum lac. 3. aliment. 16.

Oxymel, non ex aceti, mellisque mitione tantū, compositio est, verum ex mulsa paulū aceti accipiente, 3. acut. 24. & 4. sanit. tue. cap. 6.

Oxy-

Oxyregmia, idest acidus ructus, qui sine aliqua pituita, quandoque in uentriculo frigidior, et in quibusdam leuitatibus intestinorum, quae ex frigiditate ortum habent, unà fiunt, 6. aphor. 1.

Oxyrhodinum, quod & **Rhodinum** dicunt, est frōtis linimentum, ex aceto, oleo, et rosacea capiti phreniticorum, perflusum, 13. meth. 21.

Oxys, idest acutus, à quo ὀξὺς πυρετός, acutas febres, ὀξὺν πυρετόν, & ὀξὺν νόσον dictum est; Consistit autem acuti morbi essentia, non in celeri tantum motu, sed in magnitudine & periculo, 2. aph. 23.

Ozena, est ulceratio in naribus profunda, tetri odoris, atque halitum emittens, lib. finit. & 3. de comp. med. loc. cap. 3. unde ex ulcerum genere est, eoq; à polypo differt, qui in tumorum tantum genere est, nō ulcerum; nascitur influxu humorum acrium & putrescibilem à Cerebro in nares facto, unde uel earum alae uel interstitium, uel aliae partes exulcerantur.



P



P A E D O T R O P I C A, est medicine pars, quae de puerorum sanitate, doctrinam instituit, lib. de part. art. med. cap. 5.

Palatum, partem illam in ore altioris sedis cauā uocant, quae super foramina è naribus in ipsum pertinentia, sublimis est, com. 1. in 6. de morb. vulg. 3.

Palati os, uide **Basim Cerebri**.

Palimvolus homo dolosus est, qui aliud loquitur, aliud

aliud sentit, & qui facile sententiam mutat, eiusmodi quoque morbus appellatur, qui speciem quidē illi facit leuationis, sed tamen intus malignus est, com. 1. in 6. de morb. vulg. 6.

Pallida bilis, vide Bilis pallida, & Amara.

Palma est ea pars manus, quę Metacarpium, & postbrachiale dicitur, 1. de musc. diff. cap. 21.

Palmòs, vide Palpitatio.

Palpitatio, quę & Subsultio, & Palmòs παλμὸς Grace dicitur, similiter atque tremor, motus est, quo partes palpitantes, citra voluntatem nostram, nobisque inuitis attolluntur, & deorsum aguntur, à crasso & uaporofo spiritu, cui non adsit exitus; differūt verò palpitatio à tremore, quod nemo qui artus mouere non instituerit, tremet; palpitantes autem particulae etiam si in quiete fuerint, siq; nullum illis motum induxeris, palpitant; Etenim supercilium palpebrae & oculus sub inde citra omnem voluntatem attolluntur; tremor autem totius & integri membri motus est, ut totius manus, brachij, capitis; palpitat verò pars membri, ut uel sola cutis, uel sola arteria, ut censebat Praxagoras, uel solus musculus ut Herophilus. Tum & quę tremunt totum mutant locum, quę autem palpitant partes, eundē obtinent, sed modo ampliorem, modo minorem; in seipsas enim concidunt partes palpitantes, dum contrahuntur, aliò autem mouentur, quę tremunt. lib. de trem. palp. cap. 4. & 5. Adhęc Palpitatio est contractio quā-

dama

dam præter naturam, in illis corporis partibus, in quibus distentio, dilatatio, & contractio accidere possunt, 2. de sympt. caus. cap. 2. non enim os, vel chartilago palpitant, quod dilatari non possint. Adhæc palpitatio motus est à toto genere præter naturam, tremor autem mistus ex motu secundum naturam, membrum mouente, & motu præter naturam, uirtutē ad violenter mouendum proritante & cogente, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Palpebre sunt externæ oculi partes, supercilijs subiacentes, superius, inferiusq; interiores tunicas cōtegentes, hæc inferior, illa superior, lib. Introd. c. 19.

Pancænus, vide Endemus.

Pancratium, vide Pancreas.

Pancreas, corpus glandulosum, uel caro glandulosa est in medio mesenterio sita, quam natura quatuor vasis, venæ, arteriæ, neruo, & vesicæ bilis in orbem substrauit; diuisionesq; inter se mutuas repleuit, ne ullum ipsorum facile scindatur, propter vehementem motum, sed molli cedente corpore, cōquiescat, 5. de vsup. cap. 2. quod corpus, vocat etiam Pancratiū, 1. de motu musc. 6. Idemque & Pancreon, & Caliceon, dicitur, lib. de ven. & art. diff. cap. 1.

Pancreon, vide Pancreas.

Pandemus, uide Endemus.

Pandieuulatio, vide Oscitatio.

Panus, idest tuberculum immaturum, quod aliquando & magnum, & durum, & diuturnum exoritur.

ritur, 3. de artic. 2. est enim tumor, non altus, sed latus, in quo quoddam pustula simile est, panis similitudinem habens, hinc Latini Panum etiam appellant, vide Phygethon.

Papilla mamme, idest extremum mammae mulieris, quod ori infantis inditur, 15. de usup. cap. 7.

Papula, nomen est ijs, quę sponte extuberant in cute, conueniens, quę superfluis constant humoribus, atque qualitatem etiam non iniuria subsequuntur, cū tenues humores sunt, exulcerationem potius; quàm tumores creant, at crassi in tumorem pellem attollūt, com. 3. in 3. de morb. vulg. 51.

Paracentesis, idest punctio, quę Hydropibus, & Herniosis adhibetur, ad aquam euocandā, 14. meth. 13. & 6. aph. 27.

Paracmastica, uide Continua.

Paracynanche, uide Cynanche.

Paralysis (quę & Paresis à medicis dicitur) est neruorum resolutio, cum nerui, alicuius ex non præcipuis corporis partibus omnino sensus, & motus, expertes sunt, 1. de sympt. caus. cap. 5. fitque cum humorum multitudo indissolubiliter in aliqua corporis parte ex non præcipuis impacta fuerit, ut & Epilepsia, & Apoplexia partis dici possit, 4. acut. 27. Exquisita autem Paralysis est, in qua nerui omnino sensum & motum perdiderunt; imperfecta, in qua, motus quidem perit, seruato sensu, imperfectior in qua incolumi motu, sensus aboletur, est enim paralysis
motus

motus potius, quàm sensus affectio; quæ si fiat in uniuerso corpore apoplexia potius dicenda est, quam uera paralyfis. Acciditque Paralyfis oculis, ubi & mollities dicitur, cum oculus vel motu, vel visu, uel utroque priuatur, leso vel Cerebro, uel nervo concauo, uel spiritu visibili, lib. de ocul. par. 4. cap. 13. Estq; Paralyfis etiam imaginatricis facultatis affectio qualis, quæ et Caros, et Catalepsis nominatur. de sympt. differ. cap. 3. vide Resolutio.

Paramesus digitus, idest digitus anularis; lib. de muscul. diff. cap. 22.

Paraphrosyne, prauus quidam, erransq; motus virtutis imaginatricis Cerebri est, qui & delirium dicitur, de sympt. differ. cap. 3. differt verò ab Aneæ, & amentia quod illa sit imaginatricis, aut ratiocinatricis deprauatus vel diminutus motus, hæc uerò eandem facultatum paralyfis, & resolutio.

Paraphimosis, vitium est Phimosi contrarium, cum videlicet ea quæ naturales meatus concludunt, ita diducta sunt, ut reduci nequeant; propriè tamen dicitur de præputio retrorsum adducto, ut glandem tegere nequeat; quod malum ex nervi contractione maxime contingit, fit & ex immodica præputij siccitate; ei contrarium vitium Phimosi appellatur, lib. finit.

Paraplegia, est alicuius corporis partis immobilitas sensusque priuatio, quam etiam Apoplexiam per abusum vocat Hippoc. com. 2. in 1. prorrh. 50.

V quod

quod utraq̃ue à frigidis & pituitosis fiat humoribus. Paraplegia affectio vnius partis corporis talis est, qualis paraplexia totius, com. 3. in 1. prorrh. 26. Interdum facta absque conuulsione apoplexia, in partis alicuius resolutionem finiens, paraplexia appellatur, 4. acut. 27. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 59. Apoplexia, à paraplexia, ut à toto pars differt; apoplectici nanque prorsus & paraplectici sunt; Paraplectici verò, non omnino & Apoplectici. Adde sanos mentē paraplecticos, resolutos parte vna corporis dextra, vel sinistra, Apoplecticos & mente, & toto corpore resolutos esse constat, lib. finit. Ex quibus omnibus locis nunc videtur idem significare paraplexia, & paraplegia, quasi vnam apoplexiæ speciem, nunc paraplexia genus esse ad paraplegiam, suam speciem.

Pararhythmus pulsus est, qui (cum quæque ætas proprium pulsum agnoscat) non conuenit illi ætati in quo est ille pulsus, sed alterius proximioris, quemadmodum heterorhythmus pulsum vocamus, qui alterius ætatis habet rhythmum, lib. finit.

Parastatæ, qui et seminarij meatus dicuntur, quasi Latine astites nominentur, sunt qui ex vena & arteria constant, in vnam naturam consertis, semen cōfouentes, lib. finit. vide Glandulosi assistentes.

Pararosis, est deprauata visus actio, cum oculis, colore, figura, magnitudine vel situ, mutata videtur veluti Amblyopia est diminuta actio visus, & cecitas,

tas, ablata; 1. de sympt. caus. cap. 5.

Parasynanche, vide Cynanche.

Paregorica, idest mitigatoria medicamenta, quæ non sanant, sed mitigant, ne malum crescat, lib. de Dynamid. in proæmio.

Parempptosis, (quam & Periptosis, hoc est incidentiam & casum vocat 3. κατὰ γένν) est intercidentia, siue coincidentia, cum ea plenitudo, quæ ex ingestione eorum quæ comeduntur & bibuntur in venis gignitur, à venis in arterias delabatur, lib. de caus. procatarct. cap. 3. atque vniuersim parempptosis est, quando aliunde in aliud vas humor fluit, 7. de anat. adm. cap. 16. speciatim, transumptus spirituum ex arterijs in venas, parempptosis dicitur, lib. de venæ sect. contra Erasistratum, cap. 2. vide Coincidentia.

Parencephalis, quod & Cerebellum, & Encracion dicitur, est posterius Cerebrum, quod à priori (anterius enim propter sui magnitudinem, nomen totius sibi vindicauerat) crassæ meningis duplicatione est diremptum, 8. de vsup. cap. 1. vide Cerebrum.

Parenchymata (quasi affusiones dixeris) Græci vocant carneam illam substantiam, quæ inter vasorum intercapedines recipitur, 7. de anat. adm. cap. 5. ut quæ in visceribus, ceu Iecinore, renibus, liene, & pulmone uisitur, quam substantiam Galenus non vult vocari carnem; ea enim solum caro dicitur, quæ in musculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci, sed quæ in vi-

scrib⁹, ceu Iecinore, renibus, liene et pulmone visuntur, eas parenchymata, (quasi affusiones dixeris) Græci uocant; quæ verò in intestinis ventriculo, stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt, 10. metho. 11.

Paresis, idem quod paralysis, idest resolutio, vide Paralysis.

Parietalia, vide Bregmata.

Paristhmia; quæ & Tonsillas, & amygdalas vocant, sunt locorum ad Isthmum (idest eam oris regionem quæ os & gulam interiacet) attinentium inflammationes, 3. aph. 26. Paristhmia, Tonsillæ & Vuæ; nihil aliud sunt, quàm inflammationes, Vuæ quidem Gargareonis, Tonsillæ verò adenum, qui in principio faucium inter se oppositi sunt, Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt, lib. de tumor. c. 17. quo nomine non solum inflammationē, sed etiam faucium partem illam nominant. Sic autem eam appellauerunt Græci, quod locus ille cui adiacent, cui veluti Isthmus quispiam angustus est, quum inflammatione tumet, multo quàm antea angustior fiat. Latini Tonsillas diminutiua voce à tolles, hoc est tumore appellant. Alio nomine etiam ἀντιάδας vocant. vide Isthmus.

Parocheteusis, idest deriuatio, est cum sanguis auertitur, atque ad alia membra proximiora conuersus, deriuatur, si verò ad contraria reuellit, Antispasin Græci vocant, 5. meth. cap. 2.

Para-

Paronychia, abscessus est, qui ad latera unguiū adnascitur, 8. de comp. med. loc. cap. 2. quem Arabes panariticum uocant, Latini Reduiias.

Parotides, vide *Eparmata*.

Paroxysmus, vide *Accessio*.

Partes inanes corporis sunt quæcunq; inter extremam thoracis costam, & femoris ossa habentur, 2. progn. 1.

Partus rēus; actio est partim uteri, ipsius adaucti fœtus grauitate, et excrementorum redundantia, lesi & distenti, vi propria expultrice, fœtum in cutem eicientis; partim eiusdem fœtus grandioris effecti, & maiori alimento, quàm quod in utero recipere possit, indigentis, atque ex uteri angustia & adaucto natiuo calore suffocationis imminētis periculum auersantis, quum non sufficiat spiritus maternus, quē illa per arterias subministrat, ad exitum repente concitati.

Parulides, uide *Epiludes*.

Parygron, idest, humidum, seu liquidum medicamentum, quod medetur particulæ, parua adhuc phlegmone conflctanti, non multo post confectionem tempore, sed protinus impositum; ubi duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit, vel paulo recēti uetustius utile est, quemadmodum etiam si phlegmonoso affectu, omnino sit libera, 7. de comp. med. per gen. cap. 2.

Passio, πάθος πάθημα, generaliter quidem dicitur,

omnis motus qui ab altero in alterum fit, siue secundum naturam fiat, siue præter naturam, qua parte ab altero recipitur, hinc visio, auditio, calefactio, frigefactio, humectatio, delectari, dolere, gaudere, tristari, passiones dicuntur, quorum essetia in fieri est, cum motus sint; cuius nullæ sunt partes permanentes sed dum fiunt solum sunt; solumque in verti & mutari generationem habent; Cum motus autem desit, non affectio aut passio, sed affectum esse & passum dicitur, Græce πάθος, speciatim verò non solum dum fit alteratio passio dicitur, sed dum facta est, quæ motu absoluto superstes est, quam etiam πάθος appellant, ut ex vulnere cecitas, ex contusione nigror, ex febre tabes, ex continuis uigilijs sapientia, Tertia adhuc significatione specialius, non modo passio quæ fit nec quæ facta est, sed quæ est præter naturam tantum facta affectio, ut ex vulnere cecitas, qua significatione morbi & symptomata à medicis passiones dicuntur; uide affectus & symptoma.

Pastilli Græci τροχίσκοι, seu rotule & orbiculi ab efformationis figura, dicuntur medicamenta plana in rote aut circuli formam coacta, 5. de med. per gen. 11. & 1. de antid. cap. 9.

Pastio, idest ulcus depascens, 5. med. per. gen. c. 3.

Patella est os cartilagosum & rotundum, gibbum, qua femur Tibiæ cōnectitur, aliterq; Mola dicitur, lib. de ossib. 23. quæ et Rotula et Myla et Epigonatis, idest supergenualis appellatur, 3. de usup. c. 15.

Pathe-

Pathema, idest passio, uide *Affectus*, *Passio*, *Symptoma*.

Pathognomonica syndrome, idest concursus affectuum index, 1. loc. aff. 1. *Pathognomonica* autem signa sunt, quæ & homoidæa, & homogenea dicuntur, idest, eiusdem speciei uel generis, quæ in una aliqua fiunt affectione, quæ perpetuò & soli illi, insunt, tanquam soli propria & inseparabilia existentia, ueluti quæ per sputa excernuntur, affectionis tum pulmonum, tum thoracis, tum asperæ arteriæ, tum gutturis, & tandem respirationi subseruientium instrumentorum, signa sunt, quæ & in respiratione uitium per se & primum contraxerunt, non per consensum, atq; hæc signa sunt certissima, non autem ea quæ perpetuò, sed non soli insunt, uel soli sed non perpetuo, com. 1. in 1. prorrhæ. 2. quæ & inseparabilia dicuntur, uide *Affidentia*.

Pathologica, siue *Aetiologica* medicinæ pars est, quæ causas & symptomata, & morbos inquirat, uide *Aetiologica*.

Pauciferum uinum, uide *Oenodes*.

Pechys, uide *Cubitus*.

Pecsis, idest *Congelatio*, πῆξις Græce, idem quod ἀσθένεια, hoc est firmitas stabilitas, fixio; quum uerò illa quæ frigore concreescunt & congelant, firma quoque fiant ac stabilia, ob id malum hoc, ubi corporis partes præ frigore rigent, adeoq; stabiles sint, πῆξις, idest *congelatio*, dicatur.

Pecten est sinus ipse, quo muliebri pudendū clauditur, lib. Introd. cap. 10. Est adhuc pecten, ea plantae pedis qua terram contingimus pars, quae post concavum ad digitos assurgit; dicitur & Pecten ea pars manus, unde digiti procedunt; ibidem.

Pectorale os, quod medio pectore situm, costis utrinque alligatum est, constat autem septem parvis ossibus, per synarthrosim colligatis, quibus singulis singulae costae connectuntur; quae tota pectoralis ossis figura à non nullis, quia gladii similitudinem representat, Xiphoides nominatur, quasi ensiformis, lib. de ossib. cap. 13. quod & Sternon appellatur, 7. de anat. adm. cap. 2. vide Sternon.

Pectus ea est corporis pars, quae inter medias costas, & utrumque latus iacet, lib. Introd. cap. 10.

Pedem summum, partem eam pedis vocat Hipp. quae à planta & solo usque ad digitos & ungues porrigitur, 3. de artic. 106.

Pedicularis morbus, vide Phthiriasis.

Pedion, idest planum, planities, seu planta est pars pedis, quae est ante digitos, quae uero pars ante hanc sita est, Tarsus dicitur, 3. de usup. 5. Arabice Raschetta; illud metacarpio manus, hoc Carpo pro portione respondens, cap. 6. Atqui & interiorem summę manus regionem, & quantum infra pedem est, pelma Graecè, plantam Latine dicunt, 3. de anat. adm. cap. 1.

Pelignus est color lividus, 14. meth. 9.

Pelma

Pelma, vide *Pedion*.

Peluis, vide *Infundibulum* & *Choana*.

Peltalis chartilago, vide *Cricoides Chartilago*.

Pemphygodes febris, vide *Febris Pemphygodes*.

Penis στῆμα, virile membrum, quod & αἰδοῖον, & καυλὸς dicitur, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Pensilis Verruca, (vide *Acrochordon*) dicitur, quod in imo vsque adeo sit angusta, ut pendere videatur, tota enim foras prominet, adeo ut excisa nullam radicula relinquat, angustiore basi prædita, atque ob id pēdere videatur, summæ chordæ similis; à *Myrmecia* differt, quæ basim habet latiore, & nigro colore præditam, atque ubi à chirurgo tollitur, sanguinem fundit copiosorem, quæ & sessilis *Verruca* appellatur, vide *Myrmecia*.

Pepasmus, πεπασµὸς, morbi est, & eorum quæ præter naturam sunt veluti coctio quædam & maturatio, in qua quod assimilatur paucum est, quod autem semicoctum & superfluum, multum; Quanquā alibi πεπασµὸς significatum latius extendit Galenus, dum omnem deductionem in mediocrem temperiem πεπασµὸν appellat, & alibi omnem morborū πῑψιν, idest coctionem in succorum alteratione consistere scribit.

Pepsis, vide *Pepasmus*.

Peracutus morbus, vide *Acutus simpliciter*.

Per consensum morbus, vide *Idiopathia*.

Perditio, vide *Aborsus*.

Per-

Perfrictio est natiui caloris frigiditas sine sensu doloris, longiori temporis spatio, & paulatim facta, lib. de tremor. conuul. cap. 6. quæ natiuam caliditatem, ab humorum multitudine grauari ostendit, 4. acut. 26. vide *Frigus*.

Perforatio, est sectio, quæ in spatiosam pulmonis sedis capacitatem penetrat, reliqua vero omnis diuisio ipsius, vulneratio quidem dicitur, perforatio non item, 7. de anat. adm. cap. 14. Nominatur adhuc & perforatio, magnus quidam ventriculus, & meatus qui ab anterioribus duobus Cerebri vetriculis, in ipsum Cerebellum prorumpit, per quem parencephalis Cerebro, est communis & connexa; cum enim Cerebrum sit à parencephalide, crassæ meningis duplicatione diremptum, ipsumque oporteret aliqua parte illi coniungi, quo prædictum meatum produceret, in vnum prius locum utrosque ventriculos terminauit, quem sane quartum totius Cerebri ventriculum non nulli nuncupant, alij rectius non ventriculum, sed perforationem nominant, ex qua cauitate animalis spiritus parencephalidi transmittitur, 8. de vsu. c. 11.

Periapta medicamenta, sunt capitis dolori conferentia, quæ latinis *Amuleta* appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligentur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. vide *Amuleta*.

Pericardium, quod & membrana, & tunica dicitur, membrana à substantia, tunica ab usu, 7. de anat. adm. cap. 2. vide *Membrana Pericardios*.

Peri-

Pericranios membrana, tunica est cranio superposita, quæ ex duplicatione duræ meningis connata undique & adhærescentis intrinsecus cranio, per suturas extra cranium egressa, ut cranium duræ meningi & Cerebro arctius vinciret, ipsi cranio extrinsecus in orbem circumfunditur, 8. de vsup. cap. 9.

Pericharia, hoc est, subitum, & vehemens gaudium, contrarium Ecplexi, quæ est subitus timor, amborum occasione scimus multos interuisse, 12. meth. cap. 5.

Pericholus, idest, biliosus, siue is homo sit, siue deiectio, siue urina, siue morbus, com. 2. in 1. prorrh. 18. Consueuerunt autem excrementa bilem, substantia tenuem circiter habentia, atque ea circumuoluta, uocare Perichra, idest circiter colorata, ibid.

Perincæon, quod & Perincæum, semen, & interfemineum dicitur, vide Interfemineum.

Periodus, vide Circuitus.

*Periostios membrana, & tunica est ea quæ singulis ossibus adiacet; aggenerauit enim natura ac circumiecit omnibus ossibus carnes, simulq; ipsa pinguis-
sima quoque parte succu extracta; terrestria atq; arida, necnon pinguedine omni prorsus carentia reddidit; atque ex eo quod extraxit lentum ac tenax singulis, & in capitibus colligamina, quibus inter se connectuntur, & in longitudine circum vndique tenues membranas produxit, quæ circum ossa, hoc est ossium innolucra, & periostia nuncupantur, quibus carnes
agge-*

aggeneravit, 1. de semin. cap. 10. Est quæ perioſtios membrana, ſuccingentem coſtas circumdans, quæ coſtis intus tenditur, ita ut inter coſtas & ſuccingentiẽ, media collocetur, 8. de anat. adm. cap. 10. Est quoq; p̄rioſtios oculi tunica, ſeptima in ordine, quæ totum oculum cum oſſibus colligat, ſimul autem & mouentes ipſum muſculos, operit, 10. de uſup. cap. 2.

Peripneumonia, ſeu Pulmonia, pulmonis inflammatio eſt, quam ſemper acuta febris comitatur, qui cum viſcus ſit laxum & molle, fiſtulisquæ inanibus v̄ndique infinitis cauum, cordi vicinum, à pituitofiore atque craſſiore ſanguine inflammatur, cum ſubtilis, bilioſusquæ ſuat ferè nec cum viſcere vlla ratione cohæreſcere poſſit, 4. de cauſ. pulſ. cap. 12. eadem pulmonia appellatur, 2. progn. 64. quam ſequitur ſpirandi difficultas, tantaquæ anguſtia ut ſuffocari laborantes videantur, ac recti ſedere conentur, calidamq; ſentiunt expirationem, multumq; aërem frigidum at trahere concupiſcunt, atque inter tuſſiendum ſputum varium colore eijciunt, inſuper grauitatis cuiuſdam, thoraci incumbentis ſenſum ſape percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipſum peruenire, & ad os pectorale, & ad ſpinam, 2. loc. aff. cap. 9.

Periptofis, vide Paremptofis.

Peritonæum, membrana eſt à Græci vocabuli etymologia dictum, quod alimenti vaſis prætendatur, quæ & Peritonæos membrana, peritonæos tunica, et tegumentum appellatur; tenuis ſubſtantiæ membrana eſt,

na est, ex simplicium & primorum corporum numero, prætenditurque tum visceribus, tum intestinis, tum vasis, quæ inter septum transversum & crura habentur, tum etiam ijs quæ interiacent, quale est vulua, & vesica, tenue admodum corpus, latis araneorum telis simillimum 6. de anas. adm. cap. 4. abdomini substratum, 4. meth. 6. Arabibus Siphac.

Peritonæi vertex membrana est, telis araneorum similis, inferioribus septi partibus obiecta, sibi continua, totam inferiorem septi transversæ regionem sublevariens, eidemque circum hærendo, & simul serpendo, 6. de anat. adm. cap. 8.

Perittoma est id, quod post completam coctionem, nec confectum, nec assimilatum relinquitur, quod corpori nec adnascitur, nec accrescit, sed per ipsius laxiora intus spatia tanquam supernuacaneum errat; Unde nomen quoque recte à maioribus ei, Perittoma est inditum, (1. de sanit. tuen. cap. 3.) idest excrementum, siue id spiritus, siue corpus aliud solidum sit, *περιττώμα* Græce.

Perniones, quæ & Chimethla dicuntur, sunt intertrimenta, & scissuræ manuum, & pedum, hyberno tempore à summis algoribus, factæ, lib. de med. fac. par. cap. 203.

Perona, sura, fibula à quibusdam; est alterum os tibiæ exterius & tenuius, alterum enim quod crassissimum est, & interiori in parte situm, *πύρνα* Græcis; eodem cum tota parte nomine, Latinis Tibia appell-

appellatur . Galenus autem ex Hippoc. in τῶς γλῶσ-
σῆς dicit , Peronam diuersa significare , aliquando
quidem os totum membri , aliquando ipsius ossis epi-
physim , interdum eius protuberantiam , idest mal-
leolum .

Perosis , hoc est oblesio , est priuatio & impedimē-
tum naturalis functionis , aut alicuius particule mu-
tilatio , lib. finit.

Persistentes morbi sunt , qui eisdem hōris accedūt
acremittunt , lib. de Typis , cap. 3.

Perspiratio , & Perspiratus , uide Inspiratio.

Per viciniam affici , uide Idiopathia.

Pes , πῆς , pars infima cruris est , quæ multiplici
osse constat , malleolis , talo & digitis definitur , ex
Aristotele .

Pessarium , Pessus , πῆσος , est lana concerpta ,
aut pannus , aut bombax , aut linamentum , ad digi-
ti figuram , rotundum factum , demersum in medica-
mentum aliquod , inuolutum serico , filoque appensum
tum præsertim vtero accommodatum .

Pestilentia , febris pestilens , morbus pestilens ,
Λοιμὴς , idem significant , estque morbus Epide-
mius , contagiosus , perniciosissimus , commu-
nis , è communi causa natus , aduentitiuus , (non pa-
trius , aut familiaris) , præsentis periculi , ut qui ma-
ligna & venenata putredine humores , vitales spiri-
tus , & substantiam Cordis labefactet , quam aër to-
ta sua substantia putris & corruptus siue quod is in-
clusus

clusus non diffletur, siue à non humatis cadaueribus, siue à vaporibus, & halitibus putridis non discussis, excitarit. An verò corporum celestium influxus pestilentes reddant aërem, dubitare malim, quàm credere, præsertim cum medico sensus magis sequenti, aëris mutationes pro omni sint. Astrologia, ut ex Hippoc. conijcere licet, 3. apho. & initio progn. & lib. de aqua aëre & locis.

Petaloides vrina est, quæ habet hypostasim similem squamis piscium, lib. de Urinis, cap. 27.

Petia oculi est sanguis fluens de aliqua arteria, uel vena, quam patitur ex ictu, lib. de ocul. par. 4. c. 7.

Phacos, faciei macula est nigra, lentis similitudinem obtinens, Latini lentiginem & lenticulā vocāt.

Phagedenas antiqui nominant, vlcera quæ semper maiora & deteriora fiunt, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, resoluta, uel propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem longo tempore factam, ex influentibus humoribus, vel ob aliquā dispositionem ossis in eo loco corrupti, sed nobis sufficiat ex ijs, quæ aliquid loci circumstantis occupent, alia nominare herpes, quæ summam cutem tantum infestant, alia Phagedenas idest exedentes, quæ carnem subiectam corrumpunt; nam quod putridum atque depascens à non nullis vlcus vocatur, non est propria vlceris differentia, sed passio implicita, ex ulcere atque putredine, 6. apho. 45. quas adedentes vocat, lib. de aqua aëre loc. c. 2.

Adhuc

Adhuc phagedæna sunt illa ulcera, quæ partes vicinas continuo depascunt, non tamen eas putrefaciunt, febresq; inferunt; quod si depastionem cum putrilagine sustinent, Nomæ dicuntur, idest depastiones, 6. de comp. med. per gen. cap. 1. φαγδαίνας Græce.

Phalacroasis φαλάγγωσις, caluitium, seu caluities, pilorum capitis defluuium est, propter humoris penuriam, non autem humoris vitio, nam tunc diceretur Alopecia, vel Ophiasis, vide Madarosis.

Phalanx, articulus est, tum maxime quo magnus digitus ossi Carpi propinguo, dearticulatur, 2. de vsup. cap. 9. Græce ἐκντάλιδες, φαλάγγες, vide Digitus.

Phalangosis, affectus est, quo pilorum subnascētium, duplex, triplexue acies, vel in superiore, vel in inferiore palpebra, prouenit; lib. Introd. cap. 15. Ex quo videtur autor Introducōrū phalangosin, idē facere, cum distichiasin, quod falsum est, quoniam in hac noui pili, & non naturales succrescunt, in illa soli naturales pili sunt, qui inuersi negotium oculo faciunt; in qua cilium intro spectat, pilorum acie simul cum eo inuersa, ut inquit Paulus, sic enim oculum compungunt; quibus duobus affectibus, commune genus est Trichiasis, idest noxa oculis à pilis proueniens, qui pili si recenter exoriuntur, distichiasin efficiunt, si natiui, & naturales, phalangosin.

Pharmaceutica medicina pars est, que medicamentis per os assumptis medetur; 3. de comp. med. per gen. cap. 2. altera therapeutica medicina pars.

Phar-

Pharmacia, purgatio, *νάραξις*, *ἀνανάραξις*, duplicem habet apud Hippoc. & medicos significationem, vnam qua significat, humorum qui sua qualitate molestant, euacuationem siue naturā, siue arte fiat, per quamcunque regionem, vomitum, sudorem, urinam, nares, tussim, aluum, vterum; alterā quae eiusdem humoris sit euacuatio per aluum tantum ope medicamenti, prior significatio habetur, com. 4. in 6. de morb. vulg. posterior in eo aph. qui bene corpore habent, difficulter ferunt purgationes; & corpora sana cum purgantur, exoluantur.

Pharyngethron, apud Galenum, nunc pro Pharynge sumitur, nunc pro osse hyoide, quod sit portio maxima Pharyngis, vide Hyoides.

Pharynx, duo significat, & fauces, idest regionem intra os, vbi tum gula tum asperae arteriae extrema concurrunt, idest medium illud spatium inter laryngem & gulam; & ipsam asperam arteriam, cuius summum laryngem vocant; veruntamen loci vicinia effecit, vt pharyngis nomine, nunc pro medio inter laryngem & gulam spatium, nunc pro aspera asperia, nunc pro ipsius asperae arteriae summo capite, idest larynge, indifferēter sumatur, ut ex pluribus Galeni, & Hippoc. locis elicere est.

Phathnia, sunt ossa dentes continētia, lib. de ossib. vel ut alij sunt alueoli, & prae-sepiola, & cavitates quibus dentes inseruntur, quas Graeci *σώδεια* vocant, vnde videntur hae duae voces *φάθνια* & *σώδεια*, idem
X signi-

significare.

Phaulon simplicem et vulgarem victus rationem vocat Hippoc. ita eam quæ huic contraria est, exquisitam, inter utranque autem mediam, hypophaulon, idest subvulgarem nuncupavit, 1. de fract. 45.

Phimos, & Phimosis, vitium quoddam in masculis est, ut docet Cels. lib. 7. cap. 25. in quo Colis glâs, ita cutis tegmine contexta est, ut nudari non possit; huic contrarium malum in quo propter cutem curtâ, aut retro abactam glans tegi non potest, *Periphimosis*, vel *parephimosis* appellatur.

Phimosis est, cum cutis palpebrarum extrinsecus valde inflammatur, atque id, eò usque, ut vicina regionis pars aliqua occupetur, palpebra inuertitur, cū verò modica quidem in cute inflammatio est, at membrana quæ intus ad Irim usque extenditur, valde deficit, tunc fit ut intro palpebra conuertatur, quod vitium cum utrisque palpebris accidit *Phymosis* hoc est *Capistratio* nuncupatur, cum diducere eas æger atque aperire ita oculum nequit. Idem morbus interdum in labijs oritur, & præputio & ano, cuius causa eadem est, 3. de ijs quæ in med. 32. vide *Taraphimosis*.

Phleborrhagia, idest venarum ruptio, 4. acut. 86.

Pblebotomia, idest sanguinis per venæ sectionē, missio II. meth. 1.

Phlegma, humor est frigidus & humidus albi coloris, qui tum in senibus, tum ijs qui ratione quævis sunt

sunt perfrigerati plurimus acervatur, autumno abundans, quem Prodicus Blemam & mucum vocat, 2. de natur. fac. cap. 9. vide Tituita, Grauedo, & Coryza.

Phlegmaticæ significant, siue illas quæ propriæ phlegmonæ idest inflammationes nominantur, siue etiam libeat febres vnâ complecti, secundum antiquâ vocabuli acceptionem, 1. apho. 7.

Phlegmone, est abscessus, in quo sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem, procumbens, maiora eius vasa distendit, ab his ad minora procedit, à quibus exudat foras in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, vt etiam omnia quæ in composita carne habentur, loca occupet, 10. meth. 6. Solet et Hippoc. phlegmonas appellare omnes inflammationes, & si tumore præter naturam careant, sed ipso posteriores, nomen phlegmones tumoribus præter naturam attribuunt, quando cum inflammatione & resistentia, & pulsatorio dolore constiterint. com. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Consueuerunt antiqui, in omni caliditate, nomen phlogosis, idest inflamminis, & Phlegmones hoc est inflammationis vti, 2. Glauc. 1. & 4. acut. 21. & 13. meth. cap. 1. φλεγμονή, καὶ φλόγωσις Græce.

Phlegmone erysipelatoza, est tumor præter naturam, à sanguine & bilioso humore subortus, sed sanguine in prædominio peccante, bile in subdominio; è contra Erysipelas phlegmonosum, in quo prædominatur bilis, sanguine in subdominio peccante, ita vt

ab eo quod in mistura exuperat, nomen ipsi indatur, ac dicatur de eo, id quod exuperatur, sic ut phlegmonem erysipelatofam, vel erysipelas phlegmonofum id vocemus; Vbi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones, erysipelatosque medium nominetur, 14. meth. cap. 2. vide inflammationis.

Phlegmone oculi tumor est circa oculos, qui cum rubore & caliditate multa, & motu difficili, & punctationibus gignitur, lib. finit. vide Inflammationis.

Phlogosis, idest inflamminis nomen, saepe Hippoc. affert, pro phlegmones, hoc est, inflammationis vocabulo singulari, 3. prognost. 71. vide Inflammationis, & Phlegmone.

Phlyctenam vocant, ubi per exulcerationem, uel etiam sine hac, exterior Ceratoidis tunice membrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humorem collegerit, aut sub tunice spatio, crassior humor currens phlyctenam pariat. Introd. cap. 16. Inde ad pustulas per corpus erumpentes ob serosos humores ad cutem translatos, nomen transfertur, 2. progn. 60.

Phlyctides sunt pustulae quae in ardentissima febre, per caloris intensiorem, in ore generantur, lib. finit. vide Febris pemphigode.

Phocatos, instrumenti genus est, quo in fracturis caluariae utimur, à lenticulae specie dictum, 6. metho. 6.

Phenigmus, rubrificatio, est ruboris per medicamenta, in aliqua corporis parte excitatio; quædam n. medi-

medicamenta, eam vim habent, ut cuti admota, ruborem, caloremque accendant, atque etiam si diutius immorentur, vesiculas excitent, tandemque exulcerent; ab Arabibus vesicantia, & vesicatoria appellantur.

Phoxòs, est deprauata capitis figura, cum acuminato est vertice, & non ad oblonge spherę similitudinem, qualem secundum naturam humanum caput habet, lib. de ossib. cap. 1.

Phrenitim, mortales omnes eam affectionem appellant, in qua Phrenas, idest mentem laesam esse videant, 1. prorrh. 1. Est verò phrenitis mentis alienatio cum febre acuta, quando Cerebrum propria, primariaque affectione laborat, si uerò Cerebrum per consensum afficiatur, dicitur Delirium, 5. loc. aff. 4. Est autem affectio, inflammatio in meningibus, & in ipsum etiam Cerebrum, aliquando peruadit, estque perpetuum cum acuta febre delirium, 1. prorrh. 1. quod si febrem adiunctam non habeat, tunc non phrenitis, sed vel delirium, uel mania, appellatur, si uerò perpetuum non sit delirium, adhuc phrenitis dici non debet, sed uel paraphrosine, vel paraphrenitis, ut quæ tum à uentriculo, tum à diaphragmate, tum in summo febris vigore, excitatur, tunc enim declinante paroxysmo, cessat mentis alienatio, com. 3. in 3. de morb. vulg. 45. unde omnia signa, quæ eam, vel efficiunt, uel significant, dicuntur phrenitica, com. 1. in 1. prorrh. 4.

Phrenas, vide Diaphragma.

Phrenicæ uenæ, sunt duæ propagines venarum, è trunco vene cavae superioris orientes, insertæ in diaphragma, ipsumque totum nutriendes.

Phtharticum, uide deleterium.

Phthiriasis, est scabies, circa palpebrarum radices, quæ squamas fursuri similes dimittit, lib. finit. Vocaturque morbus pedicularis, cuius generatio quibusdam contingit in capite acervatim, ex multis videlicet humoribus, calidis quidem sed non ad totam caliditatem progressis, ad quantam proueniunt acres Ichores, idest sanies, 1. loc. aff. 7.

Phthisicus Græce φθισικός, is dicitur, uel qui phthisi correptus est & contabuit, uel qui quavis ex causa macilentus euaserit; uel qui ad phthisim, naturâ procliuus est, angusto scilicet adstrictoque existens thorace, ut à tergo, operta scoptula, instar alarum promineant (unde φτεγιστός, hoc est alatus nominatur) tandem cui caput imbecillum est, organaque respiratoria, facile omnem eius fluxionem recipiunt, com. 2. in 1. de morb. vulg. 13.

Phthisis, quæ Tabes Latinis, dicitur, si communiter sumatur, est diminutio, & colliquatio corporis, Tabes uerò, propriè est pulmonis ulceratio, uel thoracis, uel faucium, ut, & iussicula & debiles comitentur febres, & corpus conficiatur; ea uerò quam Phthoën proprio uocabulo appellant, est corporis consumptio ex ulcere, lib. finit. φθῶν Græce, & φθῶν; Phthoën

Phthoë etenim propriè Græci & præsertim Athenienses nominant, ob pulmonis ulcera insanabilia, totius corporis cum parua febre extenuationem, eandemque Hippoc. uocauit *Phthysim*, 7. aph. 16. atque ideo aliquando Gal. sanguinis sputū, uocat *Phthoë*, 5. meth. 15. eandem uocat *Tabem*, 1. aph. 12.

Phthysis oculi, uide *Tabes oculi*.

Phthoë, uide *Phthysis*.

Phthoria, idest medicamenta, quæ ualent ad eijciendos fœtus, uiuos uel mortuos; alio nomine *Ecnolia* appellantur.

Phthoropæum, uide *Deleterium*.

Phygethlon, inflammatio est adenum, quæ in inguinibus, & alis est, calore scilicet & celeritate generationis, ab alijs tuberculis distincta, lib. de tumor. cap. 15. *Phygethlon*, est erysipelas inflammationis particeps, 2. Glauc. 1. figura illi pano similis est, quo textores utuntur, atque ideo panus & panis dicitur.

Phyma est phlegmone glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem, accidens, 13. meth. cap. 5. quæ statim augetur, atque ad suppurationem uenit, 2. ad Glauc. 1. uide *Tuberculum*, *Furunculus*.

Physema est resinæ species, quam & *pityinam*, & *piceam* nominant, expers pinguitudinis, admodū exiccans, 7. de comp. med. loc. cap. 3.

Physiognomonica signa, sunt quæ rei naturam indicant, lib. quod animi mor. cap. 6.

Physiologia, idest naturalis scientia, 1. de elem. 5. qualis medicina censetur, quæ & Physiologica appellatur, nomine sumpto à materia, quæ cognitioni medici exposita est, quæ quæ materialis propriè appellatur, lib. de part. art. med. cap. 6.

Physis, apud Hippoc: nunc naturam, nunc temperamentum significat, 2. acut. 31. uocatur adhuc Physis flatus, flatuosus, siue halituosus spiritus, succis quibusdam pituitosis, uel cibis in uentre à deficienti calore, in halitum solutis; qui cum per os excernitur, ructum creat, cum per sedem, sonorum silentè ue flatum; cum uerò nèutra partè emittitur, symptoma creat, quod Epneumatosis hoc est inflatio uocatur, uentre scilicet impotente ad excrementosum nebulosumq; excernendū spiritum; sed is retentus propter magnam spiritus uiæ & intestinorum latitudinem, grauitè sonat, murmur quoddam quod Græci Borborygmon uocant, causans, 3. de sympt. caus. c. 2. uide Clydones.

Pia & dura mater, uide Membrana dura.

Picatio auxilium medicum est, quo parte aliqua corporis pilos excindente, medicamento utimur, tum maxime cum quidam nouacule præsidium formidēt, præsertim in gutture, ijsq; abrasis pharmacum aliquod applicamus, 1. de comp. med. loc. cap. 5. Aliqui uerò picationem & picā significare inquit, symptoma deprauatæ, uitiosæq; appetentiæ, cum stomachus uitiosos, & à natura alienos cibos concupiscit præter morem,

morem, quo malo mulieres grauidę infestantur, ad extremum vsque secundum vel tertiũ mensem, quarto namque ferę eo liberantur; quod malum & Citta, & Cittosa ab aue quę Pica dicitur, denominatur, vide Cittosa.

Pica, vide Picatio, & Cittosa.

Picea, vide Physma.

Picra simpliciter, siue hiera picra, est idem ac medicamentum ex aloë, 4. loc. aff. 2. quod sui amaritudine, morbos & humores expellit, de Dynam. in proœmio; eadem & amara simpliciter appellatur, de cur. rat. per sang. cap. 18.

Picrocholus homo, idest amara bile abundans, 2. acut. 29.

Pinguedo est affusio alimenti, circa membranas maxime cõcrescēs, sensu carēs, lib. finit. vide Adeps.

Pinnae, seu Pinnulae, sunt alę narium, lib. finit. vide Ala narium.

Pituita, est omnis frigidus & humidus natura humor, qui & phlegma dicitur, 8. de placit. cap. 6. quatuorque humorum vnus est, omnis qualitatis & saporis expers, non nunquam verò & dulcis particeps sit qualitatis, sed hunc humorem qualiscunque fuerit si modo albus existat, pituitam appellant, lib. de atra bile, cap. 2. Scindapson Galenus iocandi gratia, nunc pituitam, 8. de placit. cap. 6. nunc Cerebrum nominat, 8. de placit. cap. 4.

Pityina, vide Physma.

Pity-

Pityriasis & pityra, uide Furfuratio.

Pityroides urina, quæ habet hypostasim similem furfuri, idest furfuraceam hypostasim, lib. de urinis, cap. 28.

Pladarotes, sunt mollia veluti corpora uetusta et maxime decolora, palpebrarum parte interna, non dum aspredinem habentia, lib. Introd. cap. 15.

Plados omnis humiditas redundans superflua, & excrementitia, siue tenuis ea sit, siue in modum puris crassa, 3. de fract.

Plagule, quæ & splenia dicuntur à splenis forma, firmamenta sunt quæ stabiliunt deligationem; luxato enim fracto, uel comminuto osse fasciæ imponuntur, quæ confirmatum ac repositum os continent, prohibentque ab affecta parte inflammationem, præsentem humorem repellendo, & aduenienti obsistendo, quæ fasciæ & subfasciationes, & subligamina appellantur; supra has ne dimoueantur, ac diuertant, plagule imponuntur cerato aliquo intinctæ, quarum duplex est usus, unus ut subligamina contineant, alter ut ea membra circum expleant, quæ in acutum desinunt; Plagulis tertio aliæ fasciæ, quas superligamina nominant, conuoluuntur, quibus ferulæ superponuntur, quæ totam deligationem firmant ac stabiliant, 3. de uis quæ in medic. 11.

Planities, uide Pedion.

Planta, uide Pedion.

Planum, uide Pedion.

Pla-

Platysma, hoc est latius linteam, quod vlceribus extrinsecus superdatur, 4. de comp. med. per gen. 14. *platysma* autem *myodes*, est, dilatatio musculosa, siue latus ille musculus, qui cuti subnascens buccam, siue maxilla, mouet, lib. de nervor. disse. cap. 6. vide *Latus musculus*.

Plectrum, vide *Pharynx*, & *Isthmus*.

Plenitudo, vide *Multitudinis*.

Plenus pulsus, qui arteriam ostendit pleniorē, & occursum humide tumidum, 1. de differ. puls. c. 6.

Plethora est vbi equaliter inter se omnes succi sunt adaucti, id *Plethos*, *plethoran*, & *plethorian* Græci vocant, nos plenitudinem & succorum redundantiam dixerimus; vbi verò uel flaua bile, vel nigra, vel pituita, uel serosis humoribus refertum iam corpus fuerit, eum habitum *Cacochymiam*, quasi suorum vitium dicas, non *plethoram* vocant, 3. meth. cap. 6. & 13. meth. cap. 4. vide *Multitudinis*.

Pleuritis, quæ & *Pleuresis* dicitur & morbus laterialis, est inflammatio illius membranae quæ costas intus subcingit, 6. aphor. 33. quæ membrana mutuato à costis nomine, quæ *Pleura* dicuntur, & *pleura* ipsa dicitur vulgo. Exquisita verò *Pleuritis* fit, ubi cingens membrana costas, primario affectu laborat, proinde dolor, vel ad iugulum, uel ad præcordia peruenit; ad iugulum quidem superioribus eius partibus affectis, ad præcordia verò ubi inferiores afficiuntur, atque vehemens quoque febris hanc inflam-

inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta, & parum distat à Corde, & cum panniculo ipsum inuolvente, ac septo transuerso cognationem habet, 5. de loc. aff. 3. lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus Sofati, Birsen, & Pleuresis, Grecis πλευριτις appellatur. Non exquisita verò pleuritis est, in qua dolor externus est, & contactu mouetur, vel quod sine febre, vel sine sputo, vel sine tussi, uel sine spirandi difficultate sit, vel quod neque tensionem, neq; duri- tiem ullam pulsus habet, quæ tamen singula exqui- sitam efficiunt pleuritidem. Pleuritidem uerò inco- ctam appellant, quæ vel celeriter hominem iugulat, vel non nisi longo tempore finitur, 5. loc. aff. cap. 2.

Plexus choroides, uide Choroides plexus.

Plexus retiformis, seu reticularis, est inuolucrum ex multis arterijs, sub dura meninge collocatum, ad retardandum spiritum animale, ne statim effluat; ubi enim natura voluit diutius morari materias, ibi transitum ipsis difficilem molita est, quemadmodum in Ventriculo quidem Pylorus, in intestinis inuolu- cra, & ante testiculos arteriæ & uenæ multipliciter inuoluuntur, non secus in capite sub dura meninge plexus arteriarum retiformis & reticularis, & Choro- ides dictus, 4. de vsup. cap. 13. & 9. de vsup. cap. 7. quem vulgo rete mirabile appellant, uide Glandulo- si assistentes.

Plexus variciformis, uide Flexus variciformis.

Plixada, idest gressuram, totum id quod inter in-
guina

guina vtriusque cruris est, solet Hippoc. appellare, 4. de artic. 45.

Pneumatias & Pneumatodes, vocat Hipp. anhelosos, qui densum spiritum habent, 3. de diffic. respir. cap. 12. Adhuc pneumatodes vocat Hipp. aliquando eos, qui ventrem inflatum habent, ibid.

Pneumaticus, idest spiritalis, qui omnia spiritibus attribuit, lib. Introd. cap. 9. vel qui de spiritibus agit 3. de differ. puls. cap. 6.

Pneumomphalon, Umbilici est dilatatio, à flatuoso spiritu, lib. finit.

Pnigalion, morbus Incubus Latinis dictus, alio nomine Ephialtes, vide Ephialtes.

Podagra est Arthritis pedum, ut enim Arthritis, vniuersi corporis & articulorum omnium, morbus est, ita si solum pedum sit, ab affecta parte, podagra, si manuum, chiragra nuncupatur, vide Arthritis.

Pollex, est breuior & maior digitus manus, quem Antichira & promanum vocant, lib. de ossib. c. 22. vide Digiti.

Polychresta, medicamenta sunt, quæ multis affectibus conueniunt, quæ contrariis medicamentis constant, etiam iuxta secundas qualitates ac vires, non tantum primas, 5. de comp. med. per gen. cap. 1.

Polychronius morbus, qui longo tempore comprehenditur, qui & Chronius dicitur, cui opponitur Brachichronius, qui breui tempore finitur, 3. dier. decr. cap. 13.

Poly-

Polymorphum, uide *Sphenois os*.

Polypus, tumor est præter naturam, in naribus genitus, polypodis carni assimilis, iuxta substantiæ proprietatem, 3. de comp. med. loc. c. 3. cuius quinque affert species Hipp. lib. α & β παθών.

Pompholix, bulla, est eleuatio in humore facta, à flatuoso spiritu, quo intra humorem concluso bulla excitari solet, præsertim si humor tenax, viscosusq; est, tunc enim bulla permanet, nec facile soluitur, quales sepe in urinis visuntur, renalem & longum morbum significantes. Est & *Pompholix metallicum* medicamentum.

Ponos, nunc laborem propriè dictum, nunc dolorem, seu ut quispiã dixerit malā affectionē, qua in acutis morbis, egri male afficiuntur significat, 2. acut. 47.

Poples, siue *Ancyle*, est articulus ille quo os magnum femoris articulatur ossi tibiæ, in quo pars exterior genu dicitur, interna verò qua crus flectitur, dicitur poples, uel *Ancyle*, lib. Introd. cap. 10.

Porocèle, est ramex callosus siue tophus in testiculo, aut in membrana Erythroide concreescens, multus renitens, durus, & inequalis. His notis ab hydrocele, & sarcocèle distinguitur, lib. finit.

Poromphalon, est concretio tophi in Umbilico, lib. finit.

Poropæia, est exiguorū meatuū status, 4. meth. 4.

Porracea bilis, uide *Bilis pallida*.

Porrigo, idest furfuratio, uide *Furfuratio*.

Por-

Porta vena, vide Cava vena.

Portæ Hepatis, πύλαι ἡπατος, sunt pars sima hepatis, in qua sita est ea vena magna, quam vocant venam portam, uel venā portę quā est ingressus chyli in iecur, sicut in gibba sanguinis ex eo egressus.

Porta Ventriculi, est inferior ventriculi terminus, qui & Pyloros dicitur, 3. loc. aff. 7. vide Pyloros.

Portinarium est primum intestinorum, quod duodenū appellat, lib. de anat. vii. vide Dodecadactylon.

Porus est neru⁹ mollis ex prima coniugatione neruorum oculum mouentium, à Cerebro ad oculos perti-
nens, qui solus manifestum habet foramen, unde & visificus, & meatus absolute dicitur, 4. loc. aff. 2. Porus est exiguus omnis corporeę molis meatus, 1. sanit. tuen. cap. 12. Atqui & porus tophum significat, tum qui in Arthriticis, tum qui in calculosis generatur; cum enim humor crudus lentorem assumpsit, & trāsitus per renes quibusdam natura sunt angusti, id quod crassissimum est, & maxime lentum, diutius moratū tophum gignit, 1. de aliment. fac. cap. 5. Porus adhuc & Callum significat, ad quem gignendum cogi, con-
crescereque aliquid proprii ossium alimenti oportet, quod in fracturis ossium accidit, 6. meth. cap. 5. vide Meatum, & Oncos.

Post apparentia, vide Assidentia.

Post brachiale, vide Brachiale.

Posterius Cerebrum, vide Cerebellum.

Posthia, siue Crithe dicitur, cum parte interna palpe-

palpebrarum, iuxta corollas, suppuratum, oblongum, figura hordeo simile fit, unde appellatum est, lib. Intrad. cap. 15.

Precedentes causæ, uide Antegressa, & Febres putridæ.

Præcognitio, προγνωσις, prænotio est futuri euentus morbi, uel futuri symptomatis eorum quæ necessariam habent generationem solum, non autem omnium quæ circa ægrotos eueniunt; modo nihil aut ab ægro, aut ab assidentibus fuerit commissum, quo medici iudicium iure frustrari possit.

Præcordia, hoc est Phrenas non ipse tantum, sed alij etiam ueteres septum appellarunt, infra uerò hæc præcordia tum uenter, & intestina, tum iecur ipsum sita sunt, 8. de placit. cap. 9.

Prægmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbētia, parte posteriori, ab osse occipitis, anteriore uerò frontis, utrinque ab ossibus temporum lineis fuerunt distincta, quæ & Bregmatis ossa appellantur, 11. de usup. cap. 20. uide Bregmata.

Præincipientes causæ, uide Antegressa.

Præputium, cutis est, quæ glandem pudendi uelut, 5. meth. 15. uide Glans.

Præsepiola, uide Phatbna.

Præter naturam, uide secundum naturam.

Prætextus, manifestissimas causas, & uerissimas uocauit Hippoc. cum tamen, in usu sit ut falsæ causæ prætextus appellentur, 2. de fract. 62. quin & prætextus

textus aliquando non falsas causas, sed ueras dicit,
3. de fract. 46.

Priapismus, (qui & Tentigo,) est auertio pudendi
stabilis in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei
venereę appetentiam, 9. de comp. med. loc. cap. 9. à
flatuoso spiritu, 14. meth. 7. nullo stimulante ad libidi-
nem aut desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdā
accidere consuevit, qui supini decumbunt, ducta de-
nominatione à Priapo animali; nā hunc ut cui suapte
natura huiusmodi Coles esset, ita finxerunt, atq; pi-
ctura descripserunt homines, 6. loc. aff. 6. quem & Sa-
tyriasim & Satyriasum Graci vocant, quod Saty-
ri arrigere semper crediti sint, de tumor. cap. 14.

Prima corpora, vide Homiomerēs.

Prima particula, vide Similare.

Primæ venæ, (q̄ et magna vasa appellāt, & vaso-
rū radices, 5. meth. 3.) sunt, quæ sunt circa iecur &
mesenterium et Cor, 12. meth. ca. 3. vide Radicē uasis.

Primarius affectus, vide Idiopathia.

Primitiua causa, vide Antegressa.

Princeps intestinum, vide Rectum.

Principium morbi triplex dicitur, secundum unū
quidem modum de primo insultu, qui simplex est, &
latitudine caret, secundum alterum verò, de eo quod
ad tertium extenditur diem, & præter hæc etiam id
quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quod
manifeste coctionis signa desiderantur, 1. de cris.
cap. 8. & 19.

Probo-

Proboscis, siue *Pronomæa* est pars quædam pendens angusta, & longa in Elephante animali (quo loco alijs est nasus) adeò ut ad terram pertingat, 16. vsup. 14.

Procatartica causa, vide *antegressa*.

Processus anchoralis, vide *Ancyroides*.

Processus cornicularis, vide *Ancyroides*.

Procidencia oculi, est cum ab ictu aliquo violento, aut strangulatione, cum febre continua, vel capitis dolore, prolapsus oculus fuerit, lib. finit.

Procondyli dicuntur, primi digitorum articuli, *metacarpio proximi*, ut medijs digitorum articuli *condyli*, *extremi vero metacondyli*.

Proëgumena causa interna est, quam antecedentem solent nominare, quam Celsus vocat *abditam*, in occulto positam, & morbos continentem causam.

Productio, vide *Dodecadaëtylon*.

Profundatio sudoris, vide *Chorion*.

Prognostica signa nuncupantur, quæ futura prænunciant, *Diagnosticæ* quæ præsentia declarant, *Indicatoria*, quæ curationem indicant, lib. de Optim. sec. emp. cap. 6.

Prolapsiones, idest ossium integras alternationes, *Dimotiones non integras* appellat, Hippo. 3. de fract. 31. & 2. de fract. 39.

Prolepticus morbus, vide *anticipās* et *Cicumenus*.

Promanus, vide *Digiti*, & *Pollex*.

Pronervationes, vide *Tendones*, & *Aponeurosis*.

Prono-

Pronomœa, vide *Proboscis*.

Prophasis, vide *Antegressa*.

Prophylace, ea est artis medicæ pars, quæ morbi causam adimit, *Prophylactice* verò, quæ à morbo præseruat, 11. meth. cap. 2.

Proprius affectus, vide *Idiopathia*.

Proptosis, idest procidentia appellatur, ubi cum inflammatione moti oculi, sede sua procidunt, lib. Introd. cap. 15.

Prosartesis hoc est appensio, longiorum est membranarum, ad vicina loca applicatio, lib. finit.

Prospheromena, idest sumenda vocantur, quæ intro in corpus sumuntur, ut quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer, 10. meth. 7.

Prospbysis, vide *Prosthesis*.

Prosthesis prior est virtutis nutritivæ facultas, quæ nutrimentum membro, quod nutriri debet, apponit, unde appositio dicitur, quam subsequitur *Prospbysis*, idest agglutinatio, siue unio, quæ nutrimentum appositum agglutinat, & unit membro, Tertia his annectitur, quæ unitum nutrimentum assimilât membro quod nutritur, diciturq; *Nutritio*, 3. de natur. fac. cap. 1. & 13.

Prostethis, est pars carnosâ, quæ in manuum, & pedum cana parte attollitur.

Prothopathia, vide *Idiopathia*.

Prurigo, pruritus quidam est, cum exigua quadâ molestia, qualis puerorum qui iam dentire incipiunt

gingiuis accidit, 3. apho. 35.

Pfallide, vide Fornices.

Pfallioides, siue Pfalloides, vide Camarion.

Psammissmus, curationis genus est, quo Hydropici arena calida, tecto capite, ad aquam ab vniuerso corpore, ciendam & eijciendam, sepeliebantur, & soli ardenti exponebantur.

Philothra medicamenta sunt, quæ pilos & capillos auferunt, vel duos, magnos multos, crassos, & veluti suillos pilos attenuando, et minores reddendo, uel ipsos penitus extirpando, & partes corporis depiles reddendo, 1. de comp. med. loc. ca. 4. differunt à Dropace, quod sint viribus Dropace valentiora, vide Dropax.

Psoa, quasi pulpam, idest lūborum carnem dixeris, est magnus musculus, ab undecima thoracis costâ incipiens, per vniuersa ilia & pubem progrediens. lib. de musc. diss. cap. 31.

Psora, scabies est, cum asperitate summæ cutis cū pruritu, furfuribus, & corporis colliquatione, lib. Introd. cap. 13. quæ omnia & si illi cum lepra communia sint, differunt tamen, quod in psora summa cutis occupatur, in lepra malum altius descendit, adhuc in psora, furfuracea fit cutis, in lepra squamosa; adhuc psora variè figurata est, lepra verò circularibus magis erosionibus cutem depascitur. Quam psorâ Aui-cenna distinxit in excorticatam, & non excorticatâ, scâdam & non scâdam, humidam & siccam; quod forte aliud

te aliud sit Græcis Psora ac Arabibus .

Psoriasis hoc est scabies & duritia scroti, cum intensa prurigine; quandoque verò & ulceratione, lib. finit.

Psorica medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant, 2. de comp. med. loc. cap. 3.

Psorophthalmia, idest pruriginosa scabies à sole, & pulvere orta, lib. de remed. par. fac. cap. 10.

Psychrophous, homo est qui frigida aqua exhibenda est timidus, sicut & hæmophous est, sanguinis mittendi timidus, & hydrophous, qui à rabido Cane morsus, aquam refomidat, 9. meth. 5.

Psyctica medicamenta sunt, refrigeratoria, quæ omnem calorem & lassitudinem mitigant, lib. de Dynam. in proœmio .

Psydracia sunt parvæ efflorescences factæ in capite similes vesicis eminentibus in superficie, lib. de med. fac. par. cap. 5. Differunt à Phlyctænis, quæ toto corpore non tantum capite, ut Psydracia, oriuntur, & si auctor Introductorij forte aliter sentire videatur; tum quod Phlyctenæ à calidiori, acriorique hæc à minus calido humore & acri gignantur .

Pterna, calx, os pedis omnium maximum est, parte qua ingredimur leniter rotundum & latiusculum, posteriore tibiæ rectitudinem longe excedens, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoidi inarticulatum .

Pterygoidea, quæ & alaria ossa dicuntur, vide Sphenois os .

Poly

Poly

genitus

proprius

affert sp

Pom

flatuoso

excitari

est, tur

quales

morbu

cum m

Po

rē, sen

tis m

Po

gnum

terio

dicit

T

lo, a

reni

le, e

T

lib.

superius oculi

angust, & pro-

prie super au-

in p. c. 12.

fines eius

12. eadem

in Eucathi

Pre

11.

palpe-

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

, & de

Publice grassantes, vide Cōmunis, & Endemius.

Puerilis morbus, vide Comitialis.

Pulmo, caro quædam rara tenera, & spongiosa est, in quibus canis aër attractus modice retinetur, et rectificatur à suis prauis qualitatibus, lib. de anat. viii. Vnde respirationis & vocis instrumentum est, 7. de vsup. 1. est quæ viscus quemadmodum hepar, vas quàm plurimis contestum, quorum intervalla carne molli, instar stoebes cuiusdam opplentur, quo omne id quod inter vasa omnia est inane repleret, esset quæ firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipso- rum, ibid. cap. 2. & 8. πνεύμων Græcè, & spongiosus, quò follis instar aëre impleri distendi quæ citra noxam possit, substantia spumam sanguinis referens.

Pulmonia, vide Peripneumonia.

Pulsatius dolor, vide Dolor pulsatius.

Pulsus est sensibilis Cordis & arteriarum motus dilatatione & contractione factus, 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de differ. puls. cap. 3. Hoc nomen pulsus ueteres primùm adhibuerunt designādis motibus dolorificis pulsantibus ex inflammatione & palpitantibus, concitato, uehementi quæ motu arteriarū; Deinde medici ea uoce usurparunt in significando motu secūdū naturā in Corde & arterijs factō per systolē & diastolē, cui naturā Hippoc. uel non callebat, uel ut fallacem neglexit; in quo si medici tactus sua diastole eueritur, aut uiolenter impellitur, & cum renixu quodam pulsat, uehemens pulsus, σφοδρὸς σφυγμὸς dicitur,

Pityriasis & pityra, uide Furfuratio.

Pityroides vrina, quæ habet hypostasim similem furfuri, idest furfuraceam hypostasim, lib. de urinis, cap. 28.

Pladarotes, sunt mollia veluti corpora uetusta et maxime decolora, palpebrarum parte interna, nondum aspredinem habentia, lib. Introd. cap. 15.

Plados omnis humiditas redundans superflua, & excrementitia, siue tenuis ea sit, siue in modum puris crassa, 3. de fract.

Plagule, quæ & splenia dicuntur à splenis forma, firmamenta sunt quæ stabiliunt deligationem; luxato enim fracto, uel comminuto osse fasciæ imponuntur, quæ confirmatum ac repositum os continent, prohibentque ab affecta parte inflammationem, præsentem humorem repellendo, & aduenienti obsistendo, quæ fasciæ & subfasciationes, & subligamina appellantur; supra has ne dimoueantur, ac diuertant, plagule imponuntur cerato aliquo intinctæ, quarum duplex est usus, vnus ut subligamina contineant, alter ut ea membra circum expleant, quæ in acutum desinunt; Plagulis tertio aliæ fasciæ, quas superligamina nominant, conuoluuntur, quibus ferula superponuntur, quæ totam deligationem firmant ac stabiliant, 3. de uis quæ in medic. 11.

Planities, uide Pedion.

Planta, uide Pedion.

Planum, uide Pedion.

Pla-

Platysma, hoc est latius linteum, quod vlceribus extrinsecus superdatur, 4. de comp. med. per gen. 14. *platysma* autem *myodes*, est, dilatio musciosa, sine latus ille musculus, qui cuti subnascens buccam, sine maxilla, mouet, lib. de nervor. disse. cap. 6. vide *Latus musculus*.

Plestrum, vide *Pharynx*, & *Isthmus*.

Plenitudo, uide *Multitudinis*.

Plenus pulsus, qui arteriam ostendit pleniorē, & occursum humide tumidum, 1. de differ. puls. c. 6.

Plethora est ubi equaliter inter se omnes succi sunt adaucti, id *Plethos*, *plethoran*, & *plethorian* Græci vocant, nos plenitudinem & succorum redundantiam dixerimus; ubi uerò uel flaua bile, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum iam corpus fuerit, cum habitum *Cacochymiam*, quasi suorum vitium dicas, non *plethoran* vocant, 3. meth. cap. 6. & 13. meth. cap. 4. vide *Multitudinis*.

Pleuritis, quæ & *Pleuresis* dicitur & morbus laterialis, est inflammatio illius membranæ quæ costas intus subcingit, 6. aphor. 33. quæ membrana mutuato à costis nomine, quæ *Pleura* dicuntur, & *pleura* ipsa dicitur vulgo. Exquisita uerò *Pleuritis* fit, ubi cingens membrana costas, primario affectu laborat, proinde dolor, uel ad iugulum, uel ad præcordia peruenit; ad iugulum quidem superioribus eius partibus affectis, ad præcordia uerò ubi inferiores afficiuntur, atque vehemens quoque febris hanc inflam-

inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta, & parum distat à Corde, & cum panniculo ipsum involuente, ac septo transverso cognationem habet, 5. de loc. aff. 3. lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus Sofati, Birsen, & Pleuresis, Græcis πλευριτις appellatur. Non exquisita verò pleuritis est, in qua dolor externus est, & contactu mouetur, vel quod sine febre, vel sine sputo, vel sine tussi, uel sine spirandi difficultate sit, vel quod neque tensionem, neq; duri-
tiem ullam pulsus habet, quæ tamen singula exquisitam efficiunt pleuritidem. Pleuritidem uerò inco-
ctam appellant, quæ vel celeriter hominem ingulat, vel non nisi longo tempore finitur, 5. loc. aff. cap. 2.

Plexus choroides, uide Choroides plexus.

Plexus retiformis, seu reticularis, est inuolucrum ex multis arteriis, sub dura meninge collocatum, ad retardandum spiritum animale, ne statim effluat; ubi enim natura voluit diutius morari materias, ibi transitum ipsis difficilem molita est, quemadmodum in Ventriculo quidem Pylorus, in intestinis inuolu-
cra, & ante testiculos arteriæ & uenæ multipliciter inuoluuntur, non secus in capite sub dura meninge plexus arteriarum retiformis & reticularis, & Choro-
ides dictus, 4. de vsup. cap. 13. & 9. de vsup. cap. 7. quem vulgo rete mirabile appellant, vide Glandulo-
si assistentes.

Plexus variciformis, uide Flexus variciformis.

Plixada, idest gressuram, totum id quod inter in-
guina

guina vtriusque cruris est, solet Hippoc. appellare, 4. de artic. 45.

Pneumatias & Pneumatodes, vocat Hipp. anhelosos, qui densum spiritum habent, 3. de diffic. respir. cap. 12. Adhuc pneumatodes vocat Hipp. aliquando eos, qui ventrem inflatum habent, ibid.

Pneumaticus, idest spiritalis, qui omnia spiritibus attribuit, lib. Introd. cap. 9. vel qui de spiritibus agit 3. de differ. puls. cap. 6.

Pneumomphalon, Umbilici est dilatatio, à flatuoso spiritu, lib. finit.

Pnigalion, morbus Incubus Latinis dictus, alio nomine Ephialtes, vide Ephialtes.

Podagra est Arthritis pedum, ut enim Arthritis, vniuersi corporis & articulorum omnium, morbus est, ita si solum pedum sit, ab affecta parte, podagra, si manuum, chiragra nuncupatur, vide Arthritis.

Pollex, est breuior & maior digitus manus, quem Antichira & promanum vocant, lib. de ossib. c. 22. vide Digiti.

Polychrestia, medicamenta sunt, quæ multis affectibus conueniunt, quæ contrariis medicamentis constant, etiam iuxta secundas qualitates ac vires, non tantum primas, 5. de comp. med. per gen. cap. 1.

Polychronius morbus, qui longo tempore comprehenditur, qui & Chronius dicitur, cui opponitur Brachichronius, qui breui tempore finitur, 3. dier. decr. cap. 13.

Poly-

Polymorphum, vide *Sphenois os*.

Polypus, tumor est præter naturam, in naribus genitus, polypodis carni assimilis, iuxta substantiæ proprietatem, 3. de comp. med. loc. c. 3. cuius quinque affert species Hipp. lib. πρὶ παθῶν.

Pompholix, bulla, est eleuatio in humore facta, à flatuoso spiritu, quo intra humorem concluso bulla excitari solet, præsertim si humor tenax, viscosusq; est, tunc enim bulla permanet, nec facile soluitur, quales sepe in vrinis visuntur, renalem & longum morbum significantes. Est & *Pompholix metallicum* medicamentum.

Ponos, nunc laborem propriè dictum, nunc dolorem, seu ut quispiã dixerit malā affectionē, qua in acutis morbis, egri male afficiuntur significat, 2. acut. 47.

Poples, siue *Ancyle*, est articulus ille quo os magnum femoris articulatur ossi tibiæ, in quo pars exterior genu dicitur, interna verò qua crus flectitur, dicitur *poples*, uel *Ancyle*, lib. Introd. cap. 10.

Poroccele, est ramex callosus siue tophus in testiculo, aut in membrana Erythroide concreescens, multus renitens, durus, & inequalis. His notis ab hydrocele, & sarcoccele distinguitur, lib. finit.

Poromphalon, est concretio tophi in Umbilico, lib. finit.

Poropœia, est exiguorū meatuū status, 4. meth. 4.

Porracea bilis, vide *Bilis pallida*.

Porrigo, idest furfuratio, vide *Furfuratio*.

Por-

Porta vena, uide Cava vena.

Portæ Hepatis, πύλαι ἡπατος, sunt pars sima hepatis, in qua sita est ea vena magna, quam vocant venam portam, uel venā porte quā est ingressus chyli in iecur, sicut in gibba sanguinis ex eo egressus.

Porta Vētriculi, est inferior uentriculi terminus, qui & Pyloros dicitur, 3. loc. aff. 7. uide Pyloros.

Portinarium est primum intestinorum, quod duodenū appellat, lib. de anat. viu. uide Dodecadaetylon.

Porus est neru^s mollis ex prima coniugatione neruorum oculum mouentium, à Cerebro ad oculos perti-
nens, qui solus manifestum habet foramen, unde & visificus, & meatus absolute dicitur, 4. loc. aff. 2. Po-
rus est exiguus omnis corporee molis meatus, 1. sanit. tuen. cap. 12. Atqui & porus tophum significat, tum qui in Arthriticis, tum qui in calculosis generatur; cum enim humor crudus lentorem assumpsit, & trāsi-
tus per renes quibusdam natura sunt angusti, id quod crassissimum est, & maxime lentum, diutius moratū tophum gignit, 1. de aliment. fac. cap. 5. Porus adhuc & Callum significat, ad quem gignendum cogi, con-
crescereque aliquid proprii ossium alimenti oportet, quod in fracturis ossium accidit, 6. meth. cap. 5. uide Meatum, & Oncos.

Post apparentia, uide Assidentia.

Post brachiale, uide Brachiale.

Posterius Cerebrum, uide Cerebellum.

Posthia, siue Crithe dicitur, cum parte interna palpe-

palpebrarum, iuxta corollas, suppuratum, oblongum, figura hordeo simile fit, unde appellatum est, lib. Inrod. cap. 15.

Præcedentes causæ, uide Antegressa, & Febres putridæ.

Præcognitio, προγνωσις, prænotio est futuri euentus morbi, uel futuri symptomatis eorum quæ necessaria habent generationem solum, non autem omnium quæ circa ægros eueniunt; modo nihil aut ab ægro, aut ab assidentibus fuerit commissum, quo medici iudicium iure frustrari possit.

Præcordia, hoc est Phrenas non ipse tantum, sed alij etiam ueteres septum appellarunt, infra uerò hæc præcordia tum uenter, & intestina, tum iecur ipsum sita sunt, 8. de placit. cap. 9.

Prægmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbētia, parte posteriori, ab osse occipitis, anteriore uerò frontis, utrinque ab ossibus temporum lineis fuerunt distincta, quæ & Bregmatis ossa appellantur, 11. de usup. cap. 20. uide Bregmata.

Præincipientes causæ, uide Antegressa.

Præputium, cutis est, quæ glandem pudendi uestit, 5. meth. 15. uide Glans.

Præsepiola, uide Phatbna.

Præter naturam, uide secundum naturam.

Prætextus, manifestissimas causas, & uerissimas uocauit Hippoc. cum tamen, in usu sit ut falsæ causæ prætextus appellentur, 2. de fract. 62. quin & prætextus

textus aliquando non falsas causas, sed ueras dicit, 3. de fract. 46.

Priapismus, (qui & Tentigo,) est auertio pudendi stabilis in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei venereę appetentiam, 9. de comp. med. loc. cap. 9. à flatuoso spiritu, 14. meth. 7. nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdā accidere consuevit, qui supini decumbunt, ducta denominatione à Priapo animali; nā hunc ut cui suapte natura huiusmodi Coles esset, ita finxerunt, atq; pietura descripserunt homines, 6. loc. aff. 6. quem & Satyriasim & Satyriasnum Græci vocant, quod Satyri arrigere semper crediti sint, de tumor. cap. 14.

Prima corpora, vide Homiomeres.

Prima particula, vide Similare.

Primæ venæ, (q̄ et magna vasa appellāt, & vasorū radices, 5. meth. 3.) sunt, quæ sunt circa iecur & mesenterium et Cor, 12. meth. ca. 3. vide Radicē uasis.

Primarius affectus, vide Idiopathia.

Primitiua causa, vide Antegressa.

Princeps intestinum, vide Rectum.

Principium morbi triplex dicitur, secundum unū quidem modum de primo insultu, qui simplex est, & latitudine caret, secundum alterum verò, de eo quod ad tertium extenditur diem, & præter hæc etiam id quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quod manifeste coctionis signa desiderantur, 1. de cris. cap. 8. & 19.

r Probo-

Proboscis, siue *Pronomæa* est pars quædam pendens angusta, & longa in Elephante animali (quo loco alijs est nasus) adeò ut ad terram pertingat, 16. vsup. 14.

Procatartica causa, vide *antegressa*.

Processus anchoralis, vide *Ancyroides*.

Processus cornicularis, vide *Ancyroides*.

Procidencia oculi, est cum ab ictu aliquo violento, aut strangulatione, cum febre continua, vel capitis dolore, prolapsus oculus fuerit, lib. finit.

Procondyli dicuntur, primi digitorum articuli, metacarpio proximi, ut medijs digitorum articuli condyli, extremi vero metacondyli.

Proëgumena causa interna est, quam antecedentem solent nominare, quam Celsus vocat abditam, in occulto positam, & morbos continentem causam.

Productio, vide *Dodecadaëtylon*.

Profundatio sudoris, vide *Chorion*.

Prognostica signa nuncupantur, quæ futura prænunciant, *Diagnostica* quæ præsentia declarant, *Indicatoria*, quæ curationem indicant, lib. de Optim. sec. emp. cap. 6.

Prolapsiones, idest ossium integras alternationes, *Dimotiones* non integras appellat, Hippo. 3. de fract. 51. & 2. de fract. 39.

Prolepticus morbus, vide *anticipās* et *Cicumenus*.

Promanus, vide *Digiti*, & *Pollex*.

Pronervationes, vide *Tendones*, & *Aponeurosis*.

Prono-

Pronomæa, vide *Proboscis*.

Prophasis, vide *Antegressa*.

Prophylace, ea est artis medicæ pars, quæ morbi causam adimit, *Prophylactice* verò, quæ à morbo præseruat, 11. meth. cap. 2.

Proprius affectus, vide *Idiopathia*.

Proptosis, idest procidentia appellatur, ubi cum inflammatione moti oculi, sede sua procidunt, lib. Introd. cap. 15.

Prosartesis hoc est appensio, longiorum est membranarum, ad vicina loca applicatio, lib. finit.

Prospheromena, idest sumenda vocantur, quæ intro in corpus sumuntur, ut quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aër, 10. meth. 7.

Prosthysis, vide *Prosthesis*.

Prosthesis prior est virtutis nutritivæ facultas, quæ nutrimentum membro, quod nutriri debet, apponit, unde appositio dicitur, quam subsequitur *Prosthysis*, idest agglutinatio, siue unio, quæ nutrimentum appositum agglutinat, & unit membro, Tertia his annectitur, quæ unitum nutrimentum assimilât membro quod nutritur, diciturq; *Nutritio*, 3. de natur. fac. cap. 1. & 13.

Prosthethis, est pars carnosa, quæ in manuum, & pedum caua parte attollitur.

Prothopathia, vide *Idiopathia*.

Prurigo, pruritus quidam est, cum exigua quadâ molestia, qualis puerorum qui iam dentire incipiunt

gingiuis accidit, 3. apho. 35.

Pfallide, vide Fornices.

Pfallioides, siue *Pfalloides*, vide *Camarion*.

Psammissmus, curationis genus est, quo *Hydropici* arena calida, tecto capite, ad aquam ab vniuerso corpore, ciendam & eijciendam, sepeliebantur, & soli ardenti exponebantur.

Philothra medicamenta sunt, quæ pilos & capillos auferunt, vel duos, magnos multos, crassos, & veluti suillos pilos attenuando, et minores reddendo, uel ipsos penitus extirpando, & partes corporis depiles reddendo, 1. de comp. med. loc. ca. 4. differunt à *Dropace*, quod sint viribus *Dropace* valentiora, vide *Dropax*.

Psoa, quasi *pulpam*, idest lūborum carnem dixeris, est magnus musculus, ab vndecima thoracis costâ incipiens, per vniuersa ilia & pubem progrediens. lib. de musc. diss. cap. 31.

Psoa, scabies est, cum asperitate summæ cutis cū pruritu, furfuribus, & corporis colliquatione, lib. Introd. cap. 13. quæ omnia & si illi cum lepra communia sint, differunt tamen, quod in *psora* summa cutis occupatur, in lepra malum altius descendit, adhuc in *psora*, furfuracea sit cutis, in lepra squamosa; adhuc *psora* variè figurata est, lepra verò circularibus magis erosionibus cutem depascitur. Quam *psorâ* *Auicenna* distinxit in excorticatam, & non excorticatâ, scâdam & non scâdam, humidam & siccam; quod forte aliud

te aliud sit Græcis Psora ac Arabibus .

Psoriasis hoc est scabies & duritia scroti, cum intensa prurigine ; quandoque verò & vlceratione , lib. finit.

Psorica medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant, 2. de comp. med. loc. cap. 3.

Psorophthalmia, idest pruriginosa scabies à sole, & pulvere orta, lib. de remed. par. fac. cap. 10.

Psychrophous, homo est qui frigida aqua exhibenda est timidus, sicut & hæmophous est, sanguinis mittendi timidus, & hydrophous, qui à rabido Cane morsus, aquam refomidat, 9. meth. 5.

Psyctica medicamenta sunt, refrigeratoria, quæ omnem calorem & lassitudinem mitigant, lib. de Dynam. in procæmio .

Psydracia sunt parvæ efflorationes factæ in capite similes vesicis eminentibus in superficie, lib. de med. fac. par. cap. 5. Differunt à Phlyctanis, quæ toto corpore non tantum capite, vt Psydracia, oriuntur, & si autor Introductorij forte aliter sentire videatur ; tum quod Phlyctenæ à calidiori, acriorique hæc à minus calido humore & acri gignantur .

Pterna, calx, os pedis omnium maximum est, parte qua ingredimur leniter rotundum & latiusculum, posteriore tibiæ rectitudinem longe excedens, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoidi inarticulatum .

Pterygoidea, quæ & alaria ossa dicuntur, vide Sphenois os .

Pterygium dicitur, nervosa superinnata oculi membrana eminentia incipiens ab angulis, & procedens usque ad corneam; quando verò insuper augetur coeperit et pupillam, lib. de med. fac. par. c. 12. *Pterygia* etiam vocant alas narium, idest fines eius infernos qui mouentur, 11. de vsup. cap. 12. eadem *Vngula* appellatur & *Vnguis*, differens ab *Encanthi* de, quæ est carnis in maiore angulo excrescentia, *Pterygium* uerò nervosa caruncula est, 10. de vsup. c. 11.

Ptilos, glabras, simulque nascentes alias palpebras, quæ pilos non habent, Græci uocant, 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Ptilosis est casus pilorum palpebræ, lib. de med. fac. par. cap. 12.

Ptisana, nunc pro succo hordei percolato, nunc pro iusculo ex hordeacea etiam substantia sumitur, 9. de placit. cap. 6.

Prosis oculi vitium est, quod alio nomine φαλαγγώσις appellatur, vide *Phalangosis*.

Ptyelos, vide *Choana*.

Pubes, pubertas, tempus est ætatis, quo lanugo circa pudenda oriri incipit, quod initio anni decimi quarti incipit, ad uigesimum quintum terminatur, 5. aph. 7. Est & *Pubes*, idem quod pecten, postrema pars hypogastrij; siue *Aqualiculi*, qua pili nascuntur vide *Aqualiculus*. Cuius pubis, seu pectinis ossa, apophyses sunt ossis sacri tenues perforatæ & in anteriora protensa.

Publi-

Publice grassantes, vide Cōmunis, & Endemus.

Puerilis morbus, vide Comitialis.

Pulmo, caro quædam rara tenera, & spongiosa est, in quibus cauis aër attractus modice retinetur, et rectificatur à suis pravis qualitatibus, lib. de anat. viu. Vnde respirationis & vocis instrumentum est, 7. de vsup. 1. estque viscus quemadmodum hepar, vas quàm plurimis contestum, quorum intervalla carne molli, instar stoebes cuiusdam opplentur, quo omne id quod inter vasa omnia est inane repleret, essetque firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipsorum, ibid. cap. 2. & 8. πνεύμων Græcè, & spongiosus, quò follis instar aëre impleri distendique citra noxam possit, substantia spumam sanguinis referens.

Pulmonia, vide Peripneumonia.

Pulsatius dolor, vide Dolor pulsatius.

Pulsus est sensibilis Cordis & arteriarum motus dilatatione & contractione factus, 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de differ. puls. cap. 3. Hoc nomen pulsus ueteres primùm adhibuerunt designadis motibus dolorificis pulsantibus ex inflammatione & palpitantibus, concitato, uehementique motu arteriarum; Deinde medici ea uoce usurparunt in significando motu secundum naturam in Corde & arterijs facto per systolē & diastolē, cuius naturam Hippoc. uel non callebat, uel ut fallacem neglexit; in quo si medici tactus sua diastole euertitur, aut uiolenter impellitur, & cum renixu quodam pulsat, uehemens pulsus, σπασμὸς σφυγῶν dicitur,

citur, cui oppositus, ἀνωδὸς, languidus dicitur.

Pulvis pinguis, est in quo nec asperum quippiam, nec acre subest, 5. sanit. tuen. cap. 3.

Punctio, solutio continuitatis in carne est, ab aliquo acuto incidente & tenui facta; Græce νόγῃς; & νόγῃα dicitur. Est adhuc punctio quæ & compunctio appellatur, incisionis ratio, quæ hydropicis ad ciendam aquam debetur, quæ παγκυστηνὸς Græce dicitur (de qua consule Paulum) Arabibus پuncture.

Punctorius dolor, uide dolor tristis.

Pupilla, Græce κόρη, foramen medium Vneę tunica oculi est, in quo fit visio, lib. de anat. viii. Estq; media totius Iridis pars, lib. Introd. cap. 10.

Purgatio, euacuatio est per propria loca, deriuatio per propinguiora, Reuulsio per contraria, 4. meth. 6. & 5. meth. 3. Vacuationem appello propriè materię ubi quantitate exuperet, purgationem uerò alienę per qualitatem, 2. progn. 14. 1. aphor. 2. uide Euacuatio, Pharmacia.

Purgamenta, λόχεα Græce, dicuntur ea omnia, quæ à puerpera, post factum, & secundas exeunt per uterum, quę & Catamenia appellantur, soloque hoc differunt, quod hæc ante partum sint, illa post partum.

Purgatoriam facultatem non omnes intelligunt, quod duo significat, alterum commune omnium quæ quouis modo animalis excrementa expurgant, alterum uerò per Excellentiam de ijs tantum dicitur, quę aut per uomitum, aut per uentris deiectionem purgent,

5. de simplic. med. cap. 20. vide Cathartica.

Purpurea uena, uide Communis & Media.

Purulentiam, Suppurationem, quæ appellat Hippo. ubi pus uniuersum conlitterit, concocto tumore quopiam præter naturam, 1. progn. 40.

Purulentus & suppuratus, uide Empyus, & Empyus.

Pus, πύον, est humor putris, partium spermaticarum substantiæ magna ex parte assimilis; Estq; humor, quod in humoris modum fluat, atque ex humore habet originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens, & per inania eius spatia diffusus, occlusis undique meatibus, perspiratione intercepta computrescit, perinde atque alia omnia, quæ perspiratu carentia, alieno in loco uehementius incallescunt.

Pustulæ Græcis Hydatides, hoc est exanthemata, 4. sanit. tue. cap. 4. sunt, & pustulæ abscessus in nigro oculi humorem continentes cum phlegmone et fluxu, lib. finit. vide Exanthematum.

Pustulæ latæ, siue tubercula omnia, duplicem habent differentiam, quoniam quædam tendunt in acumen, & altum petunt, quædam ad maiorem extenduntur locum, non tamen in altum attolluntur sic & pustulæ non nullæ sublimes non nullæ latæ fiunt; 6. aph. 9. latæ quidem tum ob humoris frigiditatem, lentorē & crassitudinem, tum propter continentis membranæ densitatem; sublimes uero tum propter humoris cal-

caliditatem, & tunice raritatem, tum propter uirtutis robur, foris expellentis pus, unde Coni similitudinem referunt, et in mucronē fastigiatur, 1. progn. 40.

Putredo est mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelā, à calido externo, 11. meth. 8. ceterum non quicquid corrumpitur, *ὄν πρὸς θάι*, hoc est putrescere dicimus, sed quibus id cum fæctore accidit, 5. simplic. 15. dicitur autem putredo siue putrefactio Græcè *Σύνθλις*, quam duplicem Galenus facit, 1. de differ. feb. unā quæ sit superante natura, alterā quæ sit superata, Galenum, eo loco consule.

Pycnotica & Pycnōsis, uide condensantia, & Obstruentia.

Pyelus Græci uocant, paruos alueos in quibus nationes instituuntur, 7. meth. 6. uide Choana.

Pylægos posterior est & inferior uentriculi terminus, sic dictus, quoniam portæ modo, ne nutrimentū ex eo confestim dilabatur, prohibet, lib. Introd. cap. 11. qui & Pyloron dicitur ad dextram propè iecur situm habens, lib. de ven. & art. dissect. cap. 1. qui et Ianitor dicitur, uide Porta Ventriculi.

Pylus, uide Myrmecie, Clauus, Callus.

Pycōsis, uide Onyx.

Pyricauton, idest ambustum igne, simul & is affectus eodem nomine appellatur, quō quis in aqua feruenti ustus fuerit, 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Pytiroides, uide Hypostasis.

Pyriana, fœtus, fomentum est, non uno modo cor
pori

pori admotum, sed uel per suffitum, uel calidam spon-
giam humido aliquo decocto imbutam, uel uaporem
per arundinem, uel cucurbitulas.

Pyrinoides, uide Dentem.

Tyulcon organum siue instrumentum est, quo mul-
sa per ulcus infusa, iubemus aliquando quidē, ut egri
inclinati in laborantem partem tussiant, aliquando
etiam molliter concutiendo, sicq; pus uniuersum, sa-
niemq; ulceris extrahimus, 5. meth. cap. 8. à quo et
Tyulca, idest puris attractiua medicamenta denomi-
nantur, 2. ad Glauc. 8.



QUADRATVM corpus, quod & Eusar-
con uocant, est quod nec gracile, nec crassum
nec calidum aut frigidum, aut alio quouis nomine ex
ijs quę excessum defectum ue indicant dicere possis,
1. de temp. cap. 6. sed inter hec omnia extrema me-
dium constituitur, 3. de caus. puls. cap. 11.

Quartana febris, τεταρταῖος πυρετός, est, cuius cir-
cuitus est quarto quoque die, quo unam & eandem
accessionem facit, ac unam & eandem remissionem,
lib. de Typis, cap. 4.

Quassatio est quartus luxationis uertebrae modus;
tria enim uitia ex uertebrae exturbatione con-
tingunt, cum retro abeunt gibberositas, cum intro re-
panditas, cum in latus torquentur obstipitas, præter
hec quartum uertebrae uitium accedit, cum dimo-
te qui-

te quidem iuncturę ac compages sunt; sed uertebre tamen in sua sede permanent, quassationem hanc appellant, 3. de artic. 2. Dicitur & quassatio casus inequabilis pilorum non dissimilis ijs, quę abscidit bipennis, lib. finit.

Quotidiana febris, uide Cathemerina.

Quotidianarum febrium typus est, qui quotidie unam, & eandem accessionem, & eam quidem longitudine commensuratam, & unam eandemque remissionem habet, ut Tertianus circuitus est, qui tertio quoque die, unam & eandem accessionem longitudine commensuratam, & unam & eandem remissionem facit, lib. de Typis, cap. 4.



R



R A D E N S bilis, uide Ater succus, & Acidabilis.

Radius, uide Cubitus.

Radicem uasis, seu uenę uoco priorem eius partē, quę uel iocinori propior est, uel etiam Cordi, hæc in collo ab inferiore est parte, in brachijs & cruribus à superiore, 5. meth. cap. 3.

Ramenta sunt membranarum intestinorū rasurę, aliquando et cruentosę, 1. loc. aff. 4. uide Strigmenta.

Ramex, Hernia, Gręce Cele, est omnis in Scroto tumor siue ex delapsu intestini, siue Omenti, siue Vasorum spermaticorum, uaricis, tophi, siue lenti humoris, siue aquosę substantię, lib. finit. Fit autem & aliquan-

aliquando Ramex in inguine, quoties quidam ualidus Tendo (qui & membraneus dicitur, qui ante inguina ortū habet, et pubis ossi inseritur) laxescit, eiusque robur infirmius fit, & cum eo totus hic inguinum locus, laxior redditus, partes quasdam corporis subiacentium in se recipit, ueluti intestinorum, uel omenti, 4. de anat. adm. cap. 6. vide Celas .

Ranula, tumor, est phlegmonodes sub lingua consistens, potissimum in pueris, quem Græci βάρταρον vocant .

Rarefacientia medicamenta, quæ Aræotica Græci uocant, sunt quæ cutis meatus reserant, 5. simplic. 14. vide Anastomotica .

Rarum corpus est, cuius partes multis spacijs inanibus interceptæ sunt, aëre plene, & contra corpus densum, seu spissum, 1. simpl. 13. siue rarum corpus est, quod meatus quos Græci poros vocant, magnos habet, 2. de sanit. tue. cap. 5.

Rarus pulsus, uide Creber pulsus .

Rascetta, uide Brachiale.

Rationalis medicorum secta est, quæ naturæ rationem præbet, morborum causas inquiri, & signis ad illarum inuentionem utitur, curationem capiens à contrario, prout causæ exigunt, in Introd. cap. 3.

Raucedines, uide Branchos .

Recidua febris est, quam prauorum humorum reliquæ putrescentes accendunt, cum omnis humor alienus à natura corporis in quo continetur, aptus nō sit ad

fit ad eius nutritionem, & deinceps necessario ad putredinem conuertatur, 2. apho. 12.

Reciprocus pulsus, uide Deficiens, & Recurrens.

Reciprocus decurtatus, uide Deficiens decurtatus.

Recrementum, uide Callosum corpus.

Recrudescencia, ulcera maligna vocat, & recrudescere, quasi rursus crudum fieri, atque in pristina malignitatem quippiam redire, ac rebellare, 2. de fract. 28.

Recta sutura Caluarię, uide Obelœa.

Rectum intestinum est ultimum intestinorum omnium, quod ad sedem usque porrectum est, 6. de anat. adm. cap. 9. quod & princeps intestinum vocatur; laxaque eius pars inferior, qua maxime laxatur, ad cuius finem est Sphincter idest constrictorius musculus, ad cuius distinctionem reliquam recti partem, qua maxime dilatatur laxam appellamus, lib. de vuluę dissec. cap. 1. quod & extensum, & longaon dicitur lib. de anat. viii.

Recurrentes nerui, uide Nerui recurrentes.

Recurrens est, qui ad quantum excurrit magnitudinis aut uehementia, in alijs rursus ad tantumdem recurrit, lib. finit.

Reduua, uide Paronychia.

Refrictio, uide Anatrypsis.

Regius morbus est, qui amaram bilem in toto corpore redundantem comitatur, erisypelata & ulcera serpentia, cum eadem amara bilis unam quampiam parti-

particulam obsidet; nigram verò in toto quidem corpore, elephantia, in una quapiam particula, Cancer subsequitur. Pituitoso excremento in toto quidem corpore, succedit hydrops leucophlegmatias dictus, cū in una insedit particula tumor qui edematosus dicitur, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide Arquatus, & Icteros.

Relaxantia quædam medicamenta uocantur, Græcè chalaistica, familiari omnibus propè recentioribus medicis uocabulo, inde nimirum sicut & nomen ipsū indicat, quod tensas laxant particulas, quippe relaxari ac intendi, contraria inter se dicunt, 7. de comp. med. per gen. cap. 9. uide Chalaistica.

Remissionem febris uocat secundam totius circuitus paroxysmi partem, in duo vniuersa diuisi, accessionem & remissionem, lib. de totius morbi tēp. c. 8. vide Ablatio.

Remissus pulsus, uide Vehemens.

Renes, νεφροί, peculiare quoddam corpus sunt, densum, ex carne & fibris constitutum, carne aque substantia, non paucas habens inuolutiones, figura autē Græce litera C, et in medio cavitatem quandam, qua ex uenis & arterijs serosum excrementum excipiunt, ad quos non maiores solum uenæ, quarum aliæ in cavitatem hanc inseruntur, aliæ in membranam quæ eos tegit, sed meatus etiam capillis modo exiles deferuntur, ad renes siti, paulò altius quàm ilia, à quibus duo urinarij meatus emergunt, quibus ad vesicā
urina

vrina reducitur, quorum operatio est secernere, & percolare serosum excrementum à sanguine, lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Repanditas, uide Obstipitas, Quassatio, Chyphosis Repercutientia, uide Attrahens.

Respiratio, & Respiratus, uide Inspiratio, & Transpiratio.

Resolutio neruorū, est deperditio motus in aliqua corporis parte, non aut sensus; si. n. deperditur sensus dicitur sensus resolutio, 3. loc. aff. 10. licet eiusdē capitis initio dicat, ubi oēs pariter nerui tum sensum, tum motum amiserint, apoplexia hæc affectio appellatur; ubi uerò alteri laterum, aut dextro, aut sinistro id accidat, resolutio, eius scilicet partis, in qua consistit affectio, interdum dextrę, interdum sinistrę, quod si in aliquo membrorum idem euenierit, eiusdem mēbri resolutio, Græce paralysis esse dicitur, 3. loc. aff. 10.

Resolutus oculus dicitur, ubi naturali motu destitutus, neque sursum, neque deorsum intendi potest, verum sensus expers fit, frequenter id mali, partibus etiam oculi accidit, lib. Introd. cap. 15.

Restitutio, est ossis uel membri in propriam sedem collocatio, & repositio, 3. de fract. 38.

Rete, uide Omentum.

Retentrix facultas, uide Attractrix.

Retiforme corpus, est quasi tunica, humorem vitreum oculi ambiens, quod ex Cerebri portione superne descendente atque amplificata conflatum est,
reti

reti simile, quod à Choroidē, idēst, tenui Cerebri tunica, quæ illi superne dimittitur, continetur, unde tunica oculi choroidē, idēst secundina nominatur, 10. de vsup. cap. 2. vide Choroides.

Retiformis plexus, vide Flexus variciformis, & Amphiblestroide.

Retina est panniculus vitreum humorem oculi circumdans quasi rete, cui annectitur alius qui dicitur secundina, quod secundinæ sit similis, iuxta quem tertius est, qui ossa contingit durus & solidus unde sclerōs dicitur, lib. de ocul. cap. 2.

Reuersua febris nominatur; quæ non est acuta, sed diuturna, & imperfectas habet solutiones, com. 2. in 6. de morb. vulg. 21.

Reuulsio est, euacuatio alienæ materiæ per loca contraria, vide Purgatio, & Deriuatio. Est autem reuulsio faciendā deorsum quidem vbi succi ad superiora feruntur, sursum vbi ad inferiora vergunt, & vbi introrsum ad exteriora, vbi extrorsum ad interiora, vbi dextrorsum inclinant in sinistrum, si sinistorsum ad dextram reuulsio faciendā; sic sane fluxiones quæ retro inclinant in priora reuellendæ, quæ in priora in posteriorem regionem abducendæ sunt, lib. de hyrudin. cap. 2. lib. de Deriuat. cap. 19. quam Græci antispasmi vocant, vide Antispasmi, Deriuatio, Purgatio.

Rhabdoides sutura, eadem est ac recta capitis sutura, vide Obelæa.

Rhachitæ, qui & *Rhachiæi* sunt dorsales musculi, 4. de anat. adm. cap. 6. 7. aph. 36. *Rhachitis medulla*, idest spinalis medulla, unde *Rhachis* spina est, vide *Dorsum*, *Medulla*.

Rhacodes, idest lacerosa, vniuersa est cutis à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuata, instar lacere uestis, idque accidit, ubi qui ad abscessum perueniunt tumores tardi secti fuerint, aut ob medicantium imperitiam, aut eorum quibus medela adhibetur timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant ut longiori tempore cutis à pure rodatur, 2. *Glauc.* 8.

Rhacosis, idest detritio, multa scroti extensio est, lib. finit.

Rhagas, idest scissura, fissuraue diuisio est labia obtinens callo obdurata, lib. finit.

Rhagades, sunt rugæ ani intumescences, rimæque ac fissuræ sedis, 1. de comp. med. loc. cap. 8. quæ & rimæ sedis dicuntur, non aliter quam labra quandoq; et manus ex vehemēti frigore, *Plinius* fissæ appellat.

Rhages dicuntur extremi digitorum fines, qui & *αἰχμαῖ* vocantur.

Rhagois tunica, quæ cerulea, vnea & vniiformis dicitur, est oculi panniculus, albugineum humorem tangens, & circundans, nigri coloris, unde vnea tunica à colore dicitur, post quem est alius panniculus cornu similis. Vnde *Ceratoides* idest *Corneus* appellatur, iuxta quem est tertius non circundans alios, sed

eos intra se iungens, quem coniunctiuam uocant, & Adnatam, siue Agnatam; Inter crySTALLINUM & albugineum est tela aranea, lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11. & 10. usup. cap. 4.

Rhaphe, idest sutura, commissura, syntaxis serrata, uide Commissura.

Rhegma, idest ruptum, est ossis ad os traductio à profundo ad superiorem, lib. finit. uel Rhegma est solutio continuitatis in uasis, ut Fractura in osse, Conuulsio, seu spasma in ueruo, Apospasma in ligamentis, Thlasma in musculis, ita Rhegma in uasis ex uio lento ictu, uel graui casu, uel alio quopiam valente motu excitata, 4. meth. cap. 1.

Rhetidosis, idest oculi tabes, & corrugatio, 3. meth. 2. uide Tabes oculi.

Rheuma, idest fluxio, & humorum decubitus, 1. de comp. med. per gen. 4. uide Fluxio.

Rheumaticus vocatus affectus, ea ratione prouenit, qua toto uidelicet corpore infirmo, quæ una est mali habitus species, principibus uerò illius partibus, paulum licet ipsis insit sanguinis, grauari tamen solitis, eumque ad carnosas cutis partes protrudentibus potissimumque ad adenas, excipiendis recrementis idoneos. tum ob substantiæ laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habent naturales uirtutes; sicut, & pinguedo; partes enim infirmiores omnium primæ, excrementitijs morbis corripuntur, lib. de cur. rat. per sang. cap. 8. fluentibus uerò humo-
 Z 2 ribus

ribus Rheuma seu fluxio dicitur, cum uerò in aliqua parte constiterint, is affectus, qui inde generatur, Rheumaticus appellatur, 2. Glauco. cap. 2.

Rhexis, idest ruptio, est ulceratio ab ictu, uel alia quapiam causa, in alto totas subinde membranas diuidens, uel etiam humores, quibus uidendi facultas administratur, effundat, lib. Introd. cap. 15.

Rhodinum, uide Oxyrhodinum.

Rhodomeli, idest, mel rosaceum, quod aliquando simplex, interdum purgatorium paratur.

Rhœas, siue Rhyas, uide Encanthis.

Rhogme est ossis interruptio, per superficiem recta uel angusta, uel lata, lib. finit.

Rhopalosis concretio est summorum pilorum indiuisibilis, qui etiam amplius non crescunt, lib. finit.

Rhus, profluuium fœminarum propriè apud medicos significat, fluente sanguine assidue penè & inordinate per uterum; longeque diuersa fluxio est ab ea, qua fluit sanguis per uterum mensstruis periodis, cum illa præter naturam sit, hæc uerò secūdum naturam; Morbi nomen est ποῦς yuuaμeῖος, fluxus muliebris.

Rhyas, est oculorum uitium, quando meatus qui ab oculis in palatum desinit, uel obstructus, uel conuiuens, excrementa, non ad loca consueta transmittit, sed in oculos regurgitare facit, com. 2. in 6. de morb. vulg. 32. uide Rhœas, & Encanthis.

Rhypodea medicamenta sunt Græce appellata, quæ à sordium similitudine, quasi strigmentosa nominantur.

nantur, 2. de comp. med. per gen. cap. 1.

Rhyptica siue extergētia ea medicamēta nominātur, quæ in superficie, siue in cute, siue in ulceribus sordem auferunt; quæ uerò altius poros expurgant, ea Ecphrastica, & Eccathartica, quasi expurgantia, et farctū liberantia dicās, appellantur, 5. simplic. 12.

Rhythmus in pulsu est proportio temporis ictus, ad tempus quietis, 1. de differ. puls. cap. 7.

Rigor prius, est insiti caloris perfrictio, cum sensu doloris subita & vniuersim facta, lib. de tremor. cōuul. cap. 6. Nominaturque etiam Rigor, neruorum conuulsio, & Tetanos, 3. loc. aff. 10. Estque concussio & cōmotio inæqualis totius corporis à tenui & acri, copiosiori que humore quàm qui in horrore peccet, 3. Sanit. tuen. 5. qui & Rigor & Rigos dicitur, 1. de sympt. caus. cap. 8. vide Frigus.

Rigos, uide Rigor.

Rigor sine febre non nullis quidem accidit semel, non nullis autem per uices interpollens multorum spacio dierum, uel à principio vsque ad finem continuatur, aut uidelicet est ita omnino exiguus, ut neq; adesse videatur, cum se quieti tradiderint, sed cum moueri cœperint, tunc demum eum sentiunt, aut totam vim habet, ut sit etiam sine motu molestus, quod accidit pituita humore redundante, sed non putrescente, quando autem hoc tempore humor putruerit, non modo rigent, sed etiam febricitant agri, 2. de differ. feb. cap. 5.

Rob, uide succum medicatum.

Ros, tertia est humiditatis species unde partes nostri corporis nutriuntur, quæ continetur in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per eas sparsus, quam inferere particulis, sine nutrimento non est, 7. meth. 6.

Rotula, uide Patella.

Rubra bilis, uide Bilis Pallida.

Ructus est flatus excretio per gulam, cum et alius sit qui per intestinum rectum secernatur, com. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Ruptura, uide Vnionis solutio.



S



S *ACCUS, uide Cæcum Intestinum.*

Sacer morbus, ἱερά νόσος, idest Epilepsia, quo ei magnitudo designetur, sacrum enim apud antiquos significat magnitudinem; alij verò sacrum dici putant, quod diuinus esset, & à dijs in vindictam mitteretur quos Galenus reprehendit.

Sacer ignis, idest Erysipelas, lib. de purg. med. fac. licet Celsus, ignem sacrū prauū vlcus existimet dici.

Sacrum os, uide Dorsum.

Sagittalis sutura, uide Obelæa.

Salsa pituita est, quæ alieno calore computruit, 2. de natur. fac. cap. 9. quæ salsa redditur, aut propter putredinem, aut propter salsæ serosæ humiditatis admistionem, 2. de differ. feb. cap. 6.

Sal-

Salvus, qui & *Palpitatio*, & *Palmos* dicitur, 2. meth. 2. vide *Palpitatio*.

Saluatella vena est ramus venæ axillaris, media percurrentes inter medium digitum manus, & auricularem, 3. de anat. adm. cap. 5. & lib. de anat. viii.

Salubre corpus simpliciter est, quod ab ipso natura ortu, bonam habet temperaturam, in simplicibus & primis particulis, atque in ijs quæ ex illis componuntur instrumentis, est commensuratum, lib. Artis med. cap. 4. ex aduerso *Insalubre* simpliciter, ibidẽ.

Sanguificatio, quæ & *Hæmatosis* nominatur, est mutatio alimenti, in sanguinem, lib. finit. vide *Attritrix*, & *Hepar*.

Sanguifluas uenas eas appellat Hippoc. quæ magnæ sunt, quibus ruptis, sanguinis eruptiones contingunt, id quod ex paruis euenire non consuevit, nam & paucus ex huiusmodi sanguis effunditur, & cito, ad oras ipsas diuisiones coalescit, nocumentumq; nõ affert, 2. de fract. 24.

Sanguinarium medicamentum, quod & glutinatorium, cruentis opitulans, Græce autem *Enæmon* dicitur, est quod vulneris oras committere, seu glutinare molitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2. vide *Glutinatorium*.

Sanguineus Cordis Ventriculus dexter ipsius est, quo priori orificio sanguis in Cor intromittitur, posteriori autem ex ipso in pulmonem deducitur, ut alius est Cordis ventriculus sinister quidem, quem spirituo.

sum nominant; quo priori quidem orificio, ijs quæ in pulmone sunt arterijs, posteriori omnibus quæ toti animali sunt diffusæ, Cor est continuum, 6. de vsup. 7.

Sanguis nunc sumitur pro omni in vasculis incluso succo, in quo pituita, utraque bilis, & tenues serosique liquores continentur, nunc pro quarta substãtia, ut è directo reliquis humoribus opponitur, qui propriè sanguis dicitur, & è cuius exuberantia tota collectio nominatur, com. 4. in 6. de morb. vulg. 29. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 38. & lib. de multit. c. 10.

Sanies, vide Sordes.

Sanitas partium similariũ, est calidi, frigidi, humididi, & sicci symmetria, dissimilarium verò compositio, numerus, magnitudo, figura conueniens, 1. de sanit. tue. cap. 1. & 4. et com. 2. in 1. de morb. vulg. 3.

Sapa, quam alij Siræon uocant, est mustum plurimum coctum, sunt qui, & ficuum siccarum decoctum ita nominent, lib. de attenuante diætã, cap. 12. vide Apothermus.

Saphatum apud Auicennam, & Plinium manantia capitis ulcera, una uoce nominant, quæ Græci ἀχάγας, & κήγια, Aliabbas tineam, sub quo & ficus & ἰσθαρία, & ἐκασθίματα collocauit.

Sapor, vide Chymus.

Saphena vena est, quæ desuper ad partem cruris domesticã descendit, quæ descendendo occultatur, donec partem super malleolum interiorem operire incipiat, lib. de anat. viu. vide Malleoli uena.

Sarco-

Sarcocele est morbus testiculis induratis cōueniēs, quod si aquosus humor in tunicis quę circa testiculos sunt aggregetur, *Hydrocele*, *Epiplocele*, & *Enteroccele* dicitur, lib. de tumor. cap. 15. *Sarcocele* verò simpliciter *Ramex* dicitur, 14. meth. cap. 17.

Sarcoma est carnis in naribus præter naturam affectio, differens à *Polypo* magnitudine & opificio, lib. finit.

Sarcomphalon incrementum carnis est præter naturam in Umbilico, uel mitis, uel malignæ, lib. finit.

Sarcosis in utero est carnis collectę expullulatio, quam si magna sit particulatim recidere conuenit uel licatam scalpris, quo celerius emoriatur, sin' parua protinus tollere, lib. finit.

Sarcoticum medicamentum est, quod carne vlcus implet. 3. meth. 2.

Satyriasis & *Satyriasmus*, uide *Triapismus*, & *Elephas*.

Scabies, uide *Psora*.

Scabies oculi est summæ genarū, angulorūq; oculi erosio cum pruritu, quam acerrima fluxio progignit. lib. finit.

ScalPELLA, uide *Laminas*.

Scalptum uocant frictionem, motumq; per ungues effectum, quod in prurientibus particulis animalia naturaliter faciunt, idque in ipsis omnibus reperitur com. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Scamnū Hippocraticū, uide *Hippocraticū scānū*.

Sca-

Scaphoides, idest os nauiculare, siue nauiforme, est os profundo sinu excauatum, Tali caput anterius & oblongum excipiens; sic dictum à scaphę similitudine, cauitatem enim habet oblongam scaphę simile, qua simile caput *Astragali*, seu Tali intra se admittit, uide *Cubiforme*.

Scapulę sunt ossa post thoracem sita, cum osse occipitis, spinaque thoracis costis & osse quod gutturi preiacet, musculorum opera copulata, lib. de ossib. cap. 14. quę & *Omoplatę* dicuntur, lib. *Introd.* c. 10 uide *Omoplatę*.

Scarificatio, idest cutis incisio, lib. de cucurbit. cap. 4. uide *Encharaxis*.

Sceletos est ossium humani corporis inuicem coherentium vniuersa compactio, lib. de ossib. in proëmio; appellatur autem *sceletos*, quasi cadauer assiccatum, 1. de anat. adm. cap. 2.

Scelos, crus, pars est corporis organica, à coxendice ad imum pedem protensa, præcipuum ambulationis instrumentum, cui per ossa innitimur, in femur tibiā & pedem diuisum.

Scelotyrbe, quasi cruris turbam, uel perturbationem dicas, species est resolutionis, qua erectus ambulare homo non potest, & latus alias in rectū, quādoque sinistrum in dextrum, non nunquam dextrum in sinistrum circumfert, interdum quoque pedem non attollit, sed attrahit, velut ij, qui magnos cliuos ascendunt, lib. finit.

Scepti-

Sceptica, est illorum medicorum scola, qui nihil sciri posse dicebant; lib. an sanguis in art. nat. cont. cap. 5. atque in singulis rebus hærent, atq; hesitant. libel. de subfig. emp. cap. 1.

Schesis dispositio est, quæ facile discutitur, ut calefactum in sole lignum, ex aduerso ei quæ egrè soluitur, ut quod igni eatenus excalfactum est, ut iam accendatur, & fumum edat, 8. meth. cap. 1. *Schesis* est aduentitius corporis habitus, 3. de caus. puls. cap. 10. vide *Affectus*.

Schetica febris est, quæ facile discutitur, uelut *hetica*, quæ difficile, 8. meth. 1.

Schetron, exquisitum victum vocat Hippoc. ita qui contrarius ei est *Phaulon* idest. simplicem ac vulgarem & exquisitum; medium autem *Hypophaulon*, idest subvulgarem nuncupauit, 1. fract. 45.

Schidacedon, est diuisio per longitudinem facta conueniens fractis ossibus in qua non omnino separantur à se partes sic affecti ossis, sed ueluti per rectitudinem finduntur, ueluti *Cauledon*, diuisio est per trāsuersum facta, 6. meth. cap. 5.

Scindapsos, uide *Pituita*.

Scirrhis est liuiscens & crescens caro, ex uehemētia diuturnæ inflammationis, orta, lib. Introd. c. 15.

Scirrhum nominamus tumorem durum, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu, talis enim sanabilis non est; Sunt qui eos duntaxat tumores qui præter naturam sunt, & omnino insensiles scirrhos appel-

appellandos censeant, reliquos non scirrhus, sed scirrhusos tumores, 14. meth. cap. 6. Exquisitus verò Scirrhus nominatur, qui omnino durus, sensuque privatus est; qui verò non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentit, ex humore lento, & crasso, qui partibus quæ indurantur tenaciter insigitur, non exquisitus, 2. ad Glauco. 4.

Scleriasis, idest durities, est tumor palpebræ cum rubore & dolore, difficile aboletur, durat magis quàm inflammatio, lib. Introd. cap. 15.

Sclerintica pharmaca, idest indurantia medicamenta, quæ duritiem corpori inducunt, quod tribus auxilijs præstatur, congelatione, siccitate, & repletionem siue tensione.

Scleroma, idest durities, tumor est duriusculus, qui in parte vulvæ aliqua nascitur, fitque plerumque ex phlegmonis, quæ diu permansere, lib. finit.

Sclerophthalmia dura lippitudo, qua oculus durior, ad motum pigrior, dolens, rubicundus, redditur, palpebræque duriores, siccioreque sint, nec post somnum aperiri facile possunt vel inuerti propter duritiem; differt à Xerophthalmia, sola magnitudine doloris duritiei, & siccitatis, quod hæc sit illa satis imbecillior.

Scliros tunica, vide Retina.

Scoliosis, vide Obstipitas, Chyphosis.

Scoptula, vide Omoplata.

Scotodinos, hoc est tenebrosa vertigo; cum enim

caput

caput circumagi videtur. Dinos, idest Vertigo nuncupatur, cum autem & tenebricosa fuerit uisio, Scotodinos, hoc est tenebricosa Vertigo affectio appellatur; fit autem ob inordinatam spiritus flatuosi motionem; qui uel in capite localem habet generationem, vel sursum ex infernis fertur partibus, 4. acut. 42.

Est autem Scotodinos, seu tenebricosa vertigo, quando simul res conspectę videntur circumuolui, & sensus visus repete destruitur, cum egrotus sibi tenebras circumfundi opinetur, 4. aph. 17. Idem affectus, & Scotomia, & Scotoma, & Scotomaticus appellatur; ex ipsa appellatione qualis sit apparens, quippe à parua occasione hebetantur ij, qui sic laborant, adeo ut interdum cadant, maxime si aliquando in circum rotentur, seu alium quempiam, siue rotam, aut id genus aliud quippiam, aut ipsos quoque quos vocant in aquis vortices circumagi uiderint, 3. loc. aff. 8.

Scotomia, Scotoma, Scotomaticus affectus, uide Scotodinos.

Scrofulæ quæ & Strumæ Cherades, & Parotides & Eparmata dicuntur, sunt apostemata, secus aures lib. de med. facil. par. cap. 11.

Scrotum est tunica extrinsecus testiculos ambiens, lib. Introd. cap. 10. quod & Scortum, & vulgo Bursa testium, dicitur.

Scutiformis chartilago, uide Cricoides.

Scybala excrementa, sicciora, & quasi in nucleum formata, combusta .s. à uisceris phlegmone, 4. acut.

Scypho,

Scypho, vide Choana.

Scyros, idest Callus, & Porus.

Scytalides, vide Digni.

Sebum, siue Seuum, est oleosa, & pinguis substantia adipe siccior & magis concreescens, eiusdem cum adipe generis, (utrumque enim sanguis est concoctus, ex nutrimenti bonitate) nisi quod seuum fragile vsq; quaq; sit, nec ad ignem admotu tam facile lique scat, & cum refrixit denuo concre scat, ut ouis & Caprae; pinguedo liquidior sit, minimeque apta durari, oleo longa vetustate incrassato similis, vt equi & suis.

Secundiformis tunica, Græce Choroides; vide Choroides.

Secunda, siue Secundina, uide Chorion, Retina, Retiforme.

Secundum naturam fieri, cum multis modis dicatur, in eum tamen sensum frequentius accipiendu est, vt significetur, quod prima ratione à natura fit, idest, quod quasi finis ab ea coniectatur, non quod ex consequutione quadu alijs succedere consuevit, talis motus secundum naturam est, siue ex se aliquid, siue ab alio moueatur, vt motus Cordis qui in pulsibus fit est operatio, & ea secundum naturam; qui uero in palpitationibus fit, is & à Corde fit, sed affectio est, & ea non secundum naturam, 6. de placit. cap. 1. præter naturam autem quicquid est, aut affectus sunt, à quibus functio læditur, aut causæ horum, aut symptomatica, 3. de presag. ex puls. cap. 1. differtque ab eo quod

quod est non naturaliter se habere, 8. meth. cap. 9.

Sedes, uide Unionis solutio.

Sedimentū est id quod in urina residet, lib. de urinis cap. 16. quod si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula, si ad mediam regionem suspensum, si profundiori parte inferiorem occupat, locum, Hypostasis, ibidem cap. 21.

Semen ex Aristotele, est quaedam pars utilis excrementi, à quo & ex quo singula fœtus membra efformantur, 1. de semin. cap. 14. Adhuc semen nihil aliud esse dicunt, quam sanguinem à uenis quæ ipsum continent, exquisitè confectum, 2. de sem. cap. 2. quod & genitale uirus uocant, 1. progn. 42.

Semicoctos humores appello, qui à ventriculi calore alterationem perpeffi, non etiam perfectè ab eo superati fuerunt, 4. simpl. cap. 15.

Seminarij meatus, uide Parastate, & Glandulose assistentes.

Semiotica hoc est, adnotatrix medicina pars est, curationi morborum per victum, summe necessaria, præterita, presentiaq; symptomata ad morbi causam inueniendam, & ad præsagiendam, diligenter inspicuens, lib. Introd. cap. 8.

Semisyderatus homo, uide Syderatio.

Semitertiana, quæ hemitritæus dicitur, est febris quæ ex quotidiana continua & tertiana intermitte fit, 2. de differ. feb. cap. 7. frequenter febris secundum suam ipsius naturam ex intermittentium genere est,

est, ut tertiana, complexus autem quotidianę febris nullum integritatis tempus priori circuitui relinquit, dum secunda accessio antequam prior absoluitur, inuadere anticipet; hanc ego febrem compendiosę, claręque doctrinę gratia, vno volens appellare vocabulo, imposui ei nomen semitertianę, lib. de morb. tēp. cap. 8. Sane non nulli aiunt Semitertianam ita nominatam fuisse, ueluti semicirculum, ipsam tertiani circuitus dimidio minorem esse asserentes; Alij dicunt Semitertianam appellatam fuisse, quod dimidio tempore tertianam superet, vt si tertiana accessio ex duodecim horis componatur, semitertiana, duodecim ipsas horas tertianę in se se comprehendat, eisquę dimidium duodecim horarum addat, vniuersęq; simul euadant duodeviginti, lib. de Typis, 4.

Senecta serpentum, est, crassissimus quidam lentor ex diuturna latitandi mora hyemis tempore, sub cauernis terrę contractus, quę res potius temporis lōgitudine, quàm senescentis ætatis initio prouenit. de Theriac. ad Tison. cap. 13.

Senes à Decrepitis, non nulli Hippocratis sectatores distinguunt, nomen seniorum vltimę ætati tribuentes, senes autem in priori ætate statuentes, quę media est inter iuuenes & seniores; Aliquando senes vocat eos, qui extremam agunt ætatem, 3. aph. 31. Estq; id quod proprie omnes homines senectutē appellant, non aliud quàm siccum, & frigidum corporis temperamentum, annorum multitudinis ratione com-

ne comparatum, 5. de tuend. sanit. cap. 9.

Sensifici nerui, vide Nerui sensifici.

Sensus indigentie, est sensus soli ventriculo, et maxime ori eius concessus, ad cibum sumendum animal ipsum excitans, & stimulans, 4. de vsup. cap. 7. qui fames nuncupatur, lib. 5. cap. 8.

Sensus vitiosus est, omnis qui perperam obitus est sensus, quando scilicet proprium sensibile non sentit, vel cum vitio sentit, vel diminute, vel deprauate, vt in auditu surditas, auditus grauitas, ob auditio, In visu cecitas, visus obscuritas, & deprauationes quedã, lib. de sympt. differ. cap. 3.

Sepedonodes, idest putredinosos Græci uocant, sunt, qui ad putredinem sunt, proni. 8. meth. cap. 7.

Septa, quæ & Septica medicamenta dicuntur, sunt omnia quæ tum eliquare, tum colliquare ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore possunt, huiusmodi sunt arsenicum, auripigmentum, sandaraca, chrysocola, Aconytum; Vocantur autem Septica hoc est putrefacientia cum putredine; symptomatis autem similitudo, vt sic appellemus efficit, inter hæc autem numerantur & Cathartica, hoc est detractoria, quæ extimam modo superficiem, quam tetigerint, detrahant, non tamen in altum subire uoleant, ut alumen, galla omphaticis, æs combustum lotum, 5. simpl. 15.

Serapium uocat Actuarius potionem eam quam hodie syrupum uoce magis barbara nominant; sic u-

rò vocant quando medicamenta cum melle vel saccharo donec concreuerint, coquuntur. Diuidunt seplasiarj syrupum in breuem & longum, breuē quod parum aquei humoris in se habet, appellant, alioque nomine. communem vocant, longum quod humoris aquei multum obtineat, nominantque alia voce decoctum.

Septum transuersum, vide Diaphragma.

Serosum recrementum, vide Ochima trofis.

Serpigo, vide Herpes.

Sesamoidea ossa à sesami leguminis minuti specie sic dicta, quæ multis manuum & pedum articulis natura ex abundanti uelut auctarium circumponit, securitatis gratia, 2. de vsup. cap. 12.

Sessilis verruca, vide Formica, & Myrmecie.

Sextās, pendet uncias duas, sestarius uncias tres, 4. de comp. med. per gen. 14.

Sicca frictio est, quæ corpori foris adhibetur, ad curandam quodammodo lassitudinem, nullo humido, aqua videlicet, vel oleo foris circumfusus, 2. simplic. cap. 25.

Siccus hydrops, vide Hydrops.

Sies, vide Collyria.

Sielismus, est salina plus æquo in os affluxus, siue ab humidiori capite in glandulas ad radicem lingua sitas, siue à Vētriculo multa pituita redundante, quæ ex eo secundū gulam in os prorepat, 8. de comp. med. loc. cap. 4.

Sigmoi-

*Sigmoides apophysis dicitur processus vnius Omo-
platę quod instar antiquę Gręcorum literę C, cauus
sit, qui & Ancyroides & Coracoides appellatur.*

*Sigmoides membranę, seu cartilaginee sunt tres tu-
nicę, quę in uenā Cordis arteriosa sunt quę pulmo-
nem alit, intus foras spectantes, quas à figura Grę-
cę literę sigma, qui accuratius tractarunt anatomas,
sigmoides appellarunt; 6. de vsup. 14. Sigmoides ad-
huc dicuntur, cartilaginum asperę arterię extremę
partes, quę sigma literę figuram referunt, 4. loc.
aff. 6. vide Cricoides.*

Signa indicatoria, vide Decretorius.

Significatio febris, vide Insultus accessionis.

*Signa aliqua mala sunt, tum ut signa, tum ut cau-
sę, ut signa quidem quoties ex difficilioribus fiunt af-
fectionibus, ut causę verò quoties ipsa rursus alias
committant prauas affectiones, 2. progn. 49.*

*Sima Hepatis pars est, concava ipsius pars, qua
parte iacet vena porta; Vnde per Meseręi venas ali-
mentum à ventriculo, primisquę intestinis attrahit,
cuius opposita, conuexa & gibba nuncupatur, 4. de
vsup. cap. 13.*

*Similare membrum, quod & simplex, homoge-
neum, & prima corporis particula, quę ex primis cō-
stat elementis, & ex qua alię sunt, est, cuius quam-
cumq; partem sensibilem sumpseris, erit illa toti com-
municans in nomine & definitione, sicut os & caro,
de anat. vii. cuiusmodi sunt arterię, venę, nerui,*

aa 2 ossa,

- ossa, chartilago, ligamentum, membrana, caro, lib.
de morb. differ. cap. 3. vide Instrumenta. p. 3119

- Simiosis, vide Annotatio. p. 3119

- Simplex morbus, vide Compositus. p. 3119

- Simplicem febrem vocat Hippoc. quæ mitis est,
& cum signis tutis, 1. cris. 16.

- Sinapisinus est medicamentum vehementer cali-
dum, ex sinapi compositum, capiti conueniens, 3.
loc. aff. 4.

- Sinciput est anterior capitis pars supra frontem si-
ta, capillis intecta, lib. Introd. cap. 10. vide Bregma.

Singultus $\lambda\upsilon\gamma\acute{\iota}\varsigma$, est veluti conuulsiva quedam oris
ventriculi affectio, quod ex humorum copia graua-
tur, vel mordetur, uel propter frigiditatem contrista-
tur. com. 1. in 1. prorrh. 23. tum ex immoderata
inanitione, 4. acut. 69. non autem est vera conuulsio,
ut pote quæ in solis musculis accidit; uentriculus autem
nec musculus est, nec eius os, 3 de caus. sympt. c. 2.

- Singultuosa febris est, quæ in singultu rodentem,
acerrimumque humorem vomit, à quo tamen sympto-
mate febrientes sunt liberati; uerum febris huiusmo-
di, nequaquam singultuosa dici debet, nisi singultus
per totum morbum simul cum febre, egrum exacer-
bauerit, 4. acut. 69.

- Sinus, qui & Vomica, est solutio continuitatis in
carnosa parte effectus, cum sanguinis quadam in me-
diam regionem, affluxione, id quod abscessui & sinui
commune est, quoad enim pars ita affecta, in exteriori
re sum-

re summitate occlusa est, atque os nullum habet, abscessisse quidem ipsa dicitur, affectio verò abscessus propriè, idest apostema vocatur; at ubi aliqua ex parte aperta est, ut qui continetur humor excernatur, non amplius abscessus, sed sinus iam appellatur, 2. de his quæ in medic. 27.

Sinus rectus appellatur, cuius os in inferiore parte, fundum in superiore est, obliquus cum in latus declinat; sunt contrario etiam modo sinus, quibus deorsum fundum, sursum verò os vergat; sed non his fundum, quo facilior saniei exitus pateat, aperimus, 2. de his quæ in medic. 28.

Sinus vulua, vide Cornua.

Siriasis est inflàmatio Cerebri, et mēbranarū eius, quæ consequuntur syncipitis, et oculorū cavitates, febris ardēs, pallor, totius corporis siccitas et inappetentia.

Siræon, vide Apothermus.

Sitis, Græce Ἀρτα potionis desiderium est, idest appetitus frigidi, & humidus.

Solidas corporis partes, vocat ossa, nervos, chartilagineas, ligamenta, tunicas, musculos, membranas, uervos, arterias, lib. Denotatio dogmatum Hippoc. quas etiam particulis, elementares, similes, et simplices appellat, 1. de natur. fac. cap. 7.

Solutio morbi simpliciter est illa, in qua vel uirtute, uel morbo sensim emoriente, uel morbus, vel uita finitur. 3. cris. 1.

Solutus est, qui laxatos habet articulos, 5. de corp.

1. 2. 3. 4. 5.

A a 3 med.

med per gen. cap. 20 supra. No. 18120 v. 18120

Sopientia, vide Anodyna.

Sopor, idest Coma, propētio, delatio ue in somnum est, cum uigilare egri nequeant, non habentes apertos oculos, sed conuiuentes, vel altis somnis, vel tenuibus, uel uigilijs detineantur; idque accidit, vel humectata ea parte Cerebri, quæ sensus fons est, ut in ebrüs, deinde ob solum frigus; aliquando ob utrūq; subinde propter uirium imbecillitatē adeo iam emorientium, ut apertas palpebras seruare nequeant, com. I. in 3. de morb. vulg. 7. vide Caros, & Coma.

Soporarie arteriæ, quæ & Carotides dicuntur, sunt duæ illæ quæ ab arteria magna sursum ascendente, postquàm ex Thorace emerſit, ac claviculas transgreſſa in medium iugulum peruenit, erecta in duas partes ſciſſa, generantur, 1. de placit. c. 7. uide Carotides.

Sordes, crassius excrementum est; in ipsa enim primæ carnis generatione, duplex excrementum provenit, quod omnem qualitatis alimenti mutationem, alterum crassius, alterum tenuius sequitur; quæ per uniuersum corpus prouenientia, quod tenuius est, ipsa est insensibilis perspiratio, quæ etiam subinde fit visibilis, quoties uel naturalis calor languet, uel nutrimento utitur, quam iustam sit ampliore, uel motus quispiam vehementior animali contingit; alterum sordes, quæ in summo corpore nostro colligitur; Quin etiam in ulceribus, tenuius excrementum sanies, Græcè Ichor appellatur, quod crassum est

Sordes; ex priori excremento vlcus humidum redditur, ex crasso sordidum, 3. meth. cap. 3. vide *Ichor*.

Sorici cauda, siue *Soricinus*, vide *Myurus*.

Sparganosis est, dum ob lactis redundantiam, mamillæ tumefactæ sic distenduntur, vt copiam hanc vix ferre queant.

Spasma, vide *Rhegma*.

Spasmus, idest *Conuulsio*; musculi est ad suū principium contractio, vide *Conuulsio*. Inde *spasmosus affectus*, idest *conuulsiuus*, qui in suo principio, aut non multo postquam fieri cœperit, conuulsionem accersit, com. 3. in 1. prorrh. Adhuc *conuulsiuum affectum* appellat, qui ante mortem necessariò conuulsionis aliquod periculū inducit, 1. de præ sag. ex puls. *Spasmosus* autem *pulsus*, siue *conuulsiuus*, est *pulsus* inequalis in una pulsatione, & diuersis arteriæ partibus, in quo utrinque ab extremis retrahi, tendi, cœuelliq; arteria videtur, in modum chordæ tensæ.

Spasmus oculi, vide *Mollities*.

Spata, instrumentum est, quo *Pharmacopola* confecturas in *Cacabo*, seu mortario mouent, & nos per spîritus gratia similiter nominabimus, 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Spathome'a, vide *Laminas*.

Sperma, *spermatice arteriæ*, *spermatice vene*, *spermatice pori*, vide *Semen*, *Glandulosi assistentes*, & *Parastate*.

Sphacelare Hippoc. in lib. de fract. & artic. pro

corrumperere usus est; sphacelus autem est corruptio substantiæ uniuscuiusq; partis, quæ sphacelari dicitur saneque partis carnosæ interitum ex magnitudine inflammationis, quem propriè Medici gangrenam nominant; Greci sphacelum etiam appellabant, 7. aph. 50. sphacelon, adhuc uocant ossis cariem. 14. meth. 17. sphacelos uocem sunt qui dicunt vehementem dolorem declarare, alij tantum inflammationis excessum, ut partem ad corruptionis periculum inducat, 2. loc. affect. 7.

Sphacelodes Hemicrania, idest, alterius capitis partis convulsorius dolor, 2. loc. aff. cap. 7.

Sphacelon, uide Sphacelare, & Syderatio.

Sphæromata, uide Natem.

Sphage, uide Anticardion.

Sphagitida, idest vene Iugulares, 5. meth. cap. 4.

Sphenois os, (quod & Polymorphum appellatur, lib. Introd. cap. 12.) est quod ad cunei similitudinem, ex utroque latere à Caluaria ad palatam tendit, superiorem maxillam constituens, cuius ossis apophyses utrinque concaue, ab alarum similitudine, Pterygodes nuncupantur, lib. de ossib. cap. 1.

Sphincter quasi strictor, seu constrictorius, est musculus cōstringens orificium recti intestini, 6. de anat. adm. cap. 4. uide Rectum.

Spicilla, uide Laminas.

Spina est omnium vertebrarum, quas spondylos vocant, structura, sumitur et spina aliquando promedulla

dulla spinali, 3. loc. aff. 10. vide Dorsum, Myelon, & Medulla spinalis.

Spirationem naturalem appellat Hipp spirationis facilitatem, significantem neque thoracem, neq; Cor aut pulmonem, neque præcordia doloris aliquam habere affectionem, quin etiam neque partes quasdam ijs adiunctas uentriculum, lienem, iecur, 1. progn. 25.

Spiritus *πνεύμα*, præcipuum est naturæ instrumentum, quo omnes functiones muniaque exequitur; substantia aerea calida, leuissima, tenuissima, omnes in corpore motus naturales ciens; est enim tertia substantia, ex aduerso aliarum duarum, solidorum inquam, & humorum, disiuncta; eiusdem planè cum calore natiuo originis & temperiei cuius est perpetuò comes & instrumentum; nam cum ad vitæ munia oporteret calidum innatum per omnia diffundi, is verò singulis solidis partibus insitus & fixus & immobilis sit; ei natura spiritum socium asciiuit, qui ipsum suo celeri motu quò necesse erat deduceret. Estque tanta spiritui cum calore natiuo, substantiæ communitio, & operis societas, ut par sit etiam eiusdem esse naturæ, ut non immerito Hippoc. spiritus vocarit, impetum facientia, à sui motus celeritate. Aliquando Hippoc. absolute ipsam respirationem, vocat spiritum com. 4. in 6. de morb. vulg. 4. Vnde & densum et rarum spiritum, idest respirationē tardā & raram vocitabat, 1. de difficul. resp. cap. 2. interdum ab eodem *πνέω* inspiratu attractus qui respirationis vocis que materia

teria est, spiritus appellatur, 1. acut. & in progn. Aliquando flatus ipse quo nervosa & musculosa corpora distenduntur, spiritus appellatur.

Spirituosus appellat Hippoc. eos duntaxat, qui cū inspirant, aëre multo indigent, 4. acut. 115.

Spirituosus, vide Sanguineus.

Spiritus flatuosus, qui & flatus etiam appellatur, crassus ac vaporosus flatus est, non secundum substantiam aërius atque tenuis; Cogita verò eius naturam ex circumstante nos aëre, in memoriam reuocans, qualis in Austrinis constitutionibus, qualis in Aquilonaribus fiat, ei enim qui in Australibus assimilatur flatuosus, alteri verò qui in Aquilonaribus, is qui in nobis secundum naturam, est spiritus, 2. Glauc. 6. vide Flatus.

Spiritus animalis est primum animæ instrumentū, in Cerebri ventriculis contentus, ad sensum & motū in vniuersas corporis partes transmittendos, procreatus, 4. loc. aff. 2. Spiritus equidem qui in arterijs continetur, vitalis, & est, & dicitur, qui in Cerebro animalis, non quod substantia animæ sit, sed quod est primum eius illic habitantis instrumentum, qualiscunq; substantia postea fuerit, qui ex vitali perfectius concocto et in Cerebri anfractibus elaborato conficitur; qui animalis spiritus, neq; substantia animæ, neque eius domicilium, sed primum tantum instrumentum est; eo quod cum ex vulneratione fuerit euacuatus, illico animal quasi mortuum collabitur; cū iterum colligi-

ligitur, renouiscit, 7. de placit. cap. 3. spiritus animalis, exhalatio quedam est sanguinis benigni, 6. de vsup. 17.

Spiritus detentio, est respirationis ad plurimū tempus voluntaria cohibitio, qua & singultus, & oscitationes sanantur, 3. de diffic. respir. cap. 10.

Spiritus densus, est breuis spiratio, hoc est motus respiratoriorum organorum, per breue tempus, factus 3. de diffic. respir. cap. 10. vide Inspiratio densa.

Spiritus inter exeundū offendens, uide Expiratus.

Spiritus asper à quibusdam appellatur is spiritus, qui cum sono ducitur, siue ob angustiam loci quo ille redditur, siue ab humoris copia, 3. de artic.

Spiritus vitalis à Corde genitus in arterijs continetur, nutriturque respiratione & sanguine; quod si naturalis quoque alius spiritus est, utique is quoque in iecinore & uenis continetur, 12. meth. cap. 5.

Spiritus naturalis, uide Spiritus vitalis.

Spiritus sublimis est, qui sublimioribus thoracis partibus inspiratur, 4. loc. aff. 7.

Spirituum interceptio, uide Interceptiones spirituum.

Spissum corpus, uide Rarum.

Splen, siue Lien, corpus est rarum admodum ac laxum instar spongiæ cuiusdam, ut succos crassos & melancholicos facile attrahat, & excipiat, heparque expurget. Vnde ipsum Parenchyma idest affusione nominant, 4. de vsup. cap. 15. cuius simæ partes, seu

concaue Iecur, & ventriculum spectant, gibba his opponuntur, cap. 16. cuius corpus tanto est rarius hepate, quanto est crassius pulmone, cap. 15.

Splenica vena, est ramus superior & minor vene portæ, qui totus per lienem spargitur, nam cum vena porta in duos præcipuos ramos distincta sit, hic in lienem abit, alter in mesenterium diffunditur.

Splenici dicuntur, ij propriè, qui induratum splenis affectionem habent, non quibus inflamatum viscus est; 9. de comp. med. loc. cap. 2. Euadunt autem lienosi à copia melancholici humoris lieni infarcti, quæ defluxiones, & fædus corporis color subsequitur.

Splendentem urinam vocauit Gal. quæ & flaua est, & peculiari ac propria mistione constat, ita ut gemini coloris esse videatur, & rufi & rubei, splendor enim à rufo, nitorem autem à rubeo accipit, lib. de Urin. cap. 4.

Splenia, vide Plagula.

Spondylus, Sphondylus, Spōdilon, Vertebra idem significant, sunt viginti quatuor ossa, quibus Rhachis idest spina constituitur, tot enim sunt in homine secundum naturam se habente, aliquando verò plura, aliquando pauciora visa sunt, omnia curua & forata, spinam habent, & apophyses obliquas & transuersas descendentes & ascendentes, vide Dorsum.

Spongoidea ossa, vide ossa Ithmoidea, & Cavernosa ossa.

Spontanea uocantur vlcera, quæ ex mordente humore

more oriuntur, qui humor ea procreans sistitur in exitu ac tardat, extremamque cuticulam, quam solam propterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit; quando si hanc quoque sudoris vice transiret, haud quaquam vlcus excitaret, 14. meth. c. 17.

Spontaneum apud medicos dicitur, non quod sine causa sit, sed quod nostra causa non sit, 6. aph. 14.

Sponte euacuari à corpore dicimus, quæcumque sine aliqua medici opera excernuntur; non nunquam ea quæ nostrum regit corpus, potentia ipsum expurgante, non nunquam ex irritamento aliquo, aut quæ à vasis non contineantur, 4. aph. 2.

Sporades morbi, qui & sporadici sunt, qui sparsim priuatimque prebendunt, egros discrepantcr fatigantes, neq; secundum communem modum constantes, 1. acut. 9. vide Endemus, Communis.

Sporades venæ sunt, propagines quedam venæ maximæ in totum crus, ab interiore ipsius parte per inguina procurrentis, inordinatæ, ad cutem permeantes, modicis intervallis sparsæ, 3. de anat. adm. c. 12.

Spuriæ costæ, vide Illegitimæ.

Sputum appellatur, non id quod spuendo sanguineum ac biliosum atq; spumofum est, tale enim proprie sputamen nominamus, sed cum neque sanguini, neque bili pallidæ, uel nigre comistum fuerit, id quod tale fuerit, iam sputum vocamus, 1. de cris. 5.

Sputamen est sputum, cui aliquid alieni humoris est admistum, ut bilis, sanguinis, saniei, 1. de cris. 2.

spu-

sputum autem quod secundum naturam se habet est, cui flauum aliquid admiſtum est, ibidem.

Spyratus uocant Caprarum deiectiones, sunt autem hæ sicce, atque id quod excernitur propria circumscriptione rotundum, circumductumque existit. Cum igitur quis hoc pacto, sicca, & circumducta deiecerit, spyratode, idest in spyras voluta appellatur, suntque talia & quod plusculo tempore retinentur, et propter copiam igneque caliditatis, com. 2. in 1. prorrh. 6. que & Scybala excrementa uocantur, uide Scybala excrementa.

Squamosæ agglutinationes, que & mendosæ commissuræ, & temporales dicuntur, uide Lepidoides.

Staltica medicamenta, quæ carnes vulneribus æquant, lib. de Dynam. in præmio.

Staphyle est carnosa quedam particula, que in summo ore apparet dependens, si quis aperto plurimum ore toto, linguam deprimat; hæc ipsa caruncula duobus nominibus appellatur, à ueteribus Græcis, Gargareon, & Cion, hoc est Gurgulio & Columna; Cæterum posteriores medici fere omnes, non ita, sed Cyonidem, idest Columellam uocant; nam qui staphylen, idest, uuam & acinum ipsam appellant, eorum, neque meminisse præstat. Nos enim non particulam illam sed unam aliquam eius affectionem staphylen, siue uuam nominamus, raro autem hæc affectio circa columellam contingit, uerum valde sæpe inflammatur, 6. de comp. med. loc. cap. 3. quæ & vuula appellatur.

lib.

lib. de anat. viii. Est igitur staphyle non illius partis inflammatio, ut quidam putant, sed quedam illius passio, in qua tota Columella laxata, extrema sui parte maior est & liuida, superna verò tenuis ut similitudinem fructus uuæ, vnde nomen accepit, preseferat, Latini vuam nominant, Gal. ibidem.

Staphyloma, est oculi morbus, cum in summa tunica, quiddam acino simile euenit, 2. meth. cap. 2.

Statum ab Hippoc. solere, non temperamentum tantum aëris præter naturam, sed etiam omnem cuiusque rei formam appellari, recordemur, com. 3. in 3. de morb. vulg. in proæmio.

Status morbi est vehemētissima totius morbi pars, 1. de cris. 8. vel status morbi aliud non est, quàm morbi quantum ad casus & symptomata attinet, maximum, 1. apb. 7. vide Consistentia.

Steatocele, affectio est scroti succrescente in eo semine, lib. Introd.

Steatoma, uide Atheromata.

Stegnosis, idest stipatio, cutis uitium, quo per occultos meatus prohibetur transmitti quod superfluum est, obstructis, siue densatis meatibus, quam densitatem Mysim idest conuiuentiā vocāt, 3. de sanit. tue. c. 10.

Stegnotica medicamenta hoc est obstruentia, quæ sensibiles excretiones cohibent, corpus. n. quod claudit, & continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex se se emit, Græcè Stegnon, siue stegnoticum nuncupatur, 5. simpl. 14. vide Obstruentia.

Ste-

Stelechiæa, vena est superficialis, et Caudicis morsa sita, unde omnes aliæ venę sanguineis ac pedestribus animalibus procedunt, 6. de anat. adm. cap. 8. estque vena magna ad portas iecoris sita, aliarum omnium caudex, ibid. cap. 10.

Stephanos, Corona, & Iris, sunt locus ille communis, quo uniuersæ oculi tunicæ simul committuntur, 14. meth. cap. 19.

Stephaniæa uena, sutura, & os, uide Coronale os, *Sternon*, est antè Thoracis os, 7. de anat. adm. cap. 2. Sedes omnibus costis duplex est, prior Sternon, idest pectoris os, posterior uertebra, quę totidẽ numero planę sunt, quot, & costę habentur, duodecim inquam; quod quidem pectoris os, unum quidẽ os apparet ob harmoniæ perfectionem, quam ipsius particule in contextu sortiuntur, membranis autem derasis, quod & plura ossa sint, & numero totidem quot cum ea costę dearticulantur, palam innotescit, 8. de anat. adm. cap. 1.

Sternutatio maximum remediũ capitis halitu repleti est, qua uno impulsu tum à pulmone, tum à capite spiritus emittitur, ad expurganda ea quę in naribus offendunt, 2. de caus. sympt. cap. 4. *Sternutatoria* uerò medicamenta sunt, quę naribus admota, uapore ad Cerebrum sublato, crassitudinem humoris dissecant, et per nares seu palatum Cerebrum expurgent, 13. meth. 21.

Stigmata Gręcis, inter cutis uitia annumerantur, & di-

& dicuntur non puncta, sed macule punctorum quantitate & forma hominis cutem & superficiem decorantes, ac uariantes; Vermicatam vulgo nominant.

Stomachi paralysis symptoma est virtutis attractricis stomachi, cum alimentum cito trahere non potest, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Stomachicos plerique homines eos appellant, qui appetentiam perdiderunt, & quibus post acceptum cibum, ventris os grauatur, atque opprimitur, & quandam egre tollerabilem anxietatem habet. Appellant eodem modo etiam illos, quibus nausea contingit, & maxime si ad uomitum impellat, & adhuc magis si simul cibi corrumpantur, quandoque acidi, quandoque nidorosi facti, quandoque aliam uitiatam qualitatem adepti; Adhuc magis eos stomachicos appellant, quibus ructus huiusmodi cum molestia quadam, anxietate, & subuersione contingunt, sæpe cum non dum cibum acceperunt; quin etiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris morentur, grauantes & vix descendentes, hos etiam stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum habentes, ut & plurima edant, & maxime grauati, paulo post reuomant, vocant similiter. Alios rursus, qui fortiter exoluuntur, ubi diutius in ediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, quorum aliqui etiam nauseosi fiunt, nisi citius potum ac cibum acceptent, stomachicos etiam vocant, 8. de comp. med. loc. cap. 2.

Stomachum, os ventris appellant, cum & medici hanc partē ita appellare sint assueti, qui etiam *stomachica animi deliquia* appellant, & quosdam *stomachicos* esse dicunt, à quopiam videlicet in eo loco oborto affectu ita appellantes, velut *hepaticos* ab hepate, *Colicos* à Colo, *Nephriticos* à renibus, *Splenicos* à splene affecto, 2. de comp. med. loc. cap. 1. & 4. de caus. puls. 23. licet *stomachi* nomine collum omni ventri præpositum, instar isthmi cuiusdam angustum, intelligatur, 4. de vsup. cap. 1. quin & *Oesophagus*, *stomachus* dicitur, vide *Oesophagus*. Est igitur *stomachus*, os ventriculi, idest meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum intromittuntur; aliud habet, & *ventriculus* os infernum, quod Græci πυλῶρον, quo *chylus* descendit, vocitant; duobus enim nominibus, ueteres os ventriculi nominabant, *Stomachum*, & *Cardiam*, idest Cor, 8. de comp. med. loc.

Stomatica medicamenta sunt, quæ modice siccant, sic vocata, quod in assiduo sint usu, ea sunt, quod ex moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglandium viridis, atque etiam his magis quod ex musto, & cupressi sphaerulis componitur, 5. meth. cap. 10.

Strabilismus, qui et *Strabismus* dicitur, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam, vel sursum, vel deorsum, uel in latera nuunt oculi, lib. finit. vide *Illosis*.

Stranguria est vesicæ affectus quo *urina* non retinetur

netur, sed guttatim distillat, lib. finit. quæ & urinae stillicidium appellatur, 8. de placit. 6. fit autem vel imbecillitate vesicæ, vel urinae acrimonia, 3. de caus. sympt. cap. 2. vide Ischuria, & Celiaca.

Strangulatio, est internecio ob respirationis defectum facta; qui defectus fit, vel propter angustiam, et coarctationem alicuius spiritalium instrumentorum, idest respirationi seruientium, uel propter virtutis thoracem mouentis imbecillitatem, vel propter vitalis principij vehementem refrigerationem; Angustia autem fit, uel repleta ea regione quæ inter thoracem & pulmonem media est, vel pulmonis cauernis & fistulis, uel inflammatione quadam totum viscus habente, uel asperam arteriam, vel eius arteriæ caput, quod Græci laryngem & Bronchum nunciant, æti- ni guttur; uel illam gutturi præiacentem, quæ Græcè Pharynga, Latini Fauces nominant, 4. aph. 34.

Strangulatio uteri, & omnes apnææ, idest spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, & præsertim viduis accidunt, fiunt innata caliditate à multitudine materiæ frigidaë grauata, ad similitudinem flammæ, quæ præ multis humidis lignis suffocatur, 3. de diffic. respir. cap. 10. & 6. loc. aff. 5. qui affectus à Græcis ὑστέρσις, καὶ ὑστέρικη πνιξ, à quibusdam ἀπνοία ὑστέρικη, dicitur, Latini autem uteri strangu- latum, uterinam suffocationem, vel spirationis ob- uterum priuationem, tum à parte affecta, tum à su-

Stomachum, os ventris appellant, cum & medici hanc partē ita appellare sint assueti, qui etiam stomachica animi deliquia appellant, & quosdam stomachicos esse dicūt, à quopiam videlicet in eo loco oborto affectu ita appellantes, velut hepaticos ab hepate, Colicos à Colo, Nephriticos à renibus, Splenicos à splene affecto, 2. de comp. med. loc. cap. 1. & 4. de caus. puls. 23. licet stomachi nomine collum omni uētri præpositum, instar isthmi cuiusdam angustum, intelligatur, 4. de vsup. cap. 1. quin & Oesophagus, stomachus dicitur, vide Oesophagus. Est igitur stomachus, os ventriculi, idest meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum intromittuntur; aliud habet, & ventriculus os infernum, quod Græci πυλῶγον, quo chylus descendit, vocitant; duobus enim nominibus, ueteres os uētriculi nominabant, Stomachum, & Cardiam, idest Cor, 8. de comp. med. loc.

Stomatica medicamenta sunt, quę modice siccant, sic vocata, quod in assiduo sint vsu, ea sunt, quod ex moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglandium viridis, atque etiam his magis quod ex musto, & cupressi sphaerulis componitur, 5. meth. cap. 10.

Strabilismus, qui et Strabismus dicitur, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam, vel sursum, vel deorsum, uel in latera nuunt oculi, lib. finit. vide Illosis.

Stranguria est vesicę affectus quo vrina non retinetur

netur, sed guttatim distillat, lib. finit. quæ & urina
 Stillicidium appellatur, 8. de placit. 6. fit autem vel
 imbecillitate vesicæ, vel urina acrimonia, 3. de caus.
 sympt. cap. 2. vide Ischuria, & Celiaca.

Strangulatio, est internecio ob respirationis defe-
 ctum facta; qui defectus fit, vel propter angustiam,
 et coarctationem alicuius spiritalium instrumentorū,
 idest respirationi seruientium, uel propter virtutis tho-
 racem mouentis imbecillitatem, vel propter vitalis
 principij vehementem refrigerationem; Angustia
 autem fit, uel repleta ea regione quæ inter thoracem
 & pulmonem media est, vel pulmonis cauernis & si-
 stulis, uel inflammatione quadam totum viscus ha-
 bente, uel asperam arteriam, vel eius arteriæ caput,
 quod Græci laryngem & Bronchum dicunt, aut
 in guttur; uel illam gutturi præiacentem, quæ
 quam Græcè Pharynga, Latini Fauces nominant,
 4. aph. 34.

Strangulatio vteri, & omnes apnææ, idest spiritus
 interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, &
 præsertim viduis accidunt, fiunt innata caliditate &
 multitudine materiæ frigida grauata, ad similitudi-
 nem flammæ, quæ præ multis humidis lignis suffoca-
 tur, 3. de diffic. respir. cap. 10. & 6. loc. aff. 5. qui af-
 fectus à Græcis ὀστράκας, καὶ ὀστρακὴν πνίξις, à quibus-
 dam ἀπνοία ὀστρακὴν, dicitur, Latini autem vteri strā-
 gulatum, uterinam suffocationem, vel spirationis ob-
 vterum priuationem, tum à parte affecta, tum à su-

perueniente symptomate appellant .

Strangulator, uide *Lycoides*, & *Lupus*.

Strictor, uide *Anulus*, *Rectum*, *Sphincter*.

Strigmenta sunt particulae quaedam intestinorum, quae in excretionibus biliosis simul deiciuntur, summa intestinorum tunica humoris acrimonia derasa, 4. de artic. 31. uide *Rhypodea*.

Struma, uide *Charas*, *Parotides*, *Scrofula*.

Stryphna, uide *Halituosa*.

Stultitia est rationis deperditio, cum laesione memoriae, 3. loc. aff. 5.

Stupefacientia, uide *Anodyna*.

Stupor insignis est refrigeratio, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit, quemadmodum completa refrigeratio & sensum & motum omnino tollit; Equidem noui quosdam adeo refrigeratis pedibus, ut in primis quidem diebus sensus periret, sequentibus deinde diebus emortui pedes putrescerent, 2. loc. aff. 2. Est autem symptoma quale detibus euenit post esum malorum immaturorum, & aliorum acerborum & acidorum, 3. de aliment. facult. cap. 16. Estque adhuc stupor, cum neruus aliquo obstruente, uel adstringente cogitur, unde spiritum animale ad membrum transmittit, hinc membra sensu & motu priuantur, lib. de ren. aff. dign. cap. 3.

Styloides, uide *Graphoides*, & *Lithoides*.

Stymmata spissamenta sunt, quae oleis adduntur, aut

aut odoris gratia, aut ut confecta diutius ab iniurijs immunia permaneant, 2. de comp. med. per gen. 2.

Stryptica, quæ stringunt partes relaxatas, lib. de Dynam. in præmio.

Subalaris vena, vide Axillaris.

Subclauium, vide Cataclida.

Subchartilagea, vide Hypochondria.

Subcinctura, vide Diaphragma.

Subcingentes membrana, vide Hypezochores.

Subductiones solitus est Hippoc. appellare per aluum exeuntia, 7. aph. 64. dicitur autem subductio, de ea tantum excretionem, quæ per aluum fit, non de ea quæ fit per uniuersum corpus, 2. aph. 18.

Subfasciationes, & subligamina, vide Epidesm⁹, & Plagula.

Subligamentum, Enæorema, & Nubecula apud Hippoc. sunt id quod corpulentius, candidiusque in vrina, neque in summis eius, neque in fundo vasis, sed in media sede sublime & exquisite medium, uel deorsum potius, quam sursum, existit; licet apud Galenum nubecula sit id quod supernatat in vrina desuper, 1. progn. 26.

Sublimis spiritus est externus aër qui ob suffocationis periculū, nobis exurgētibz, toto thorace, in suffiriosis cynāchycis, suppuraiis, peripneumoniciis magna vi attrahitur, nam nobis inculpate degentibus, solis inferioribus thoracis, quæ ad septum transuersum sunt partibus inspiramus, sin ampliorem spi-

rationem, requirimus, etiam partes infernis uicinas unâ mouemus. Vbi plurima indigeamus, tum partes etiam ad opert. & scopula agitanus, totius thoracis valida opera vtentes, com. 2. in 3. de morb. vulg 4.

Submissio, vide Ablatio.

Substitutæ medicinas appello, quæ in alterius locum subrogari queunt, lib. de substit. med.

Subsultio, uide Palpitatio.

Subuersio Stomachi, aliquando appetitus depreditionem, aliquando nauseosas affectiones ab accepto cibo factas, significat, 8. de comp. med. loc. 3.

Subuersio uoluuosa stomachi appellatur, fortis & contetiosus vomitus; nam quemadmodum in Voluulis subuersiones fiunt cum magna contentione & violentia, adeo ut stercus etiam euomant, sic etiam alios vomitus concitatos, quis appellare uoluuolos posset, 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Subuola, manus pars est, ut enim supina pars manus, iuxta pollicem asurgens thenar, & uola dicitur, ita huic opposita Hypothenar, idest subuola nominatur, lib. Introd. cap. 10.

Succus, vide Humor.

Succum medicatum vocamus eum qui primū defecatur, subinde verò Solis aut ignis calore sic densatur, ut longiore tempore citra corruptionem asseruari queat, Arabes Rob vocant. Ex hoc genere est quod

quod ab iisdem Miua dicitur, sic enim appellant succum fructuum, eò usque decoctum, ut sapæ aut mellis consistentiam acquirat.

Sudamina, (Græce Hidroa,) è genere sunt pustularum in summa hærentium corporis parte, quæ instar ulcerum cutem exasperant; proueniunt autem veluti & ipsum ostendit nomen propter multos sudores, qui uel biliosiores, uel omnino mordaciores existunt; mordent enim hi cutem, & pruriginosam efficiunt, & per modum ulcerum exasperant, 3. aph. 21.

Sudor, Græcc ἰσῆς, est humidum tertie concoctionis excrementum, per cutem in aquæ specië erumpens, cuius materia est humor tenuis, & serosus alimento permixtus, quò id facilius exiguas, & capillorum modo tenues uenas subeat, atque ab his in partes, quæ eo ali debent, se se insinuet; estq; eiusdem cum urina generis, in eo tantum ab illa differens, quod hæc ad uesicam, hæc longius in corporis habitum deferatur; cuius humoris excretio secundum naturam est, non minus quàm urinae & aliorum excrementorum.

Sudor bonus est, in febribus, qui euenit die iudicatorio, toto promanet corpore, calidus, integre febrem finiat, vel morbum tollerabiliorem efficiat, idq; in acutis morbis, 1. progn. 26.

Suffocatio, uide Strangulatio.

Suffusio. uide Hypochyma.

Suffumigium, uide Thymiana.

Sugillatio, vide *Contusio*, *Hyposphagma*, *Hæmalopa*, *Exuccatio*.

Sumen, vide *Ephebaon*.

Summum humerum, vide *Acromion*.

Supercilia sunt et pars faciei, ubi frons à superioribus descendens desinit, ceu termini eius eminentes, & pilis confiti, lib. *Introd. cap. 10*.

Superexcretionem recentiores medici vocant, eas eruptiones, in quibus natura ad indicatorium auxilium contitata, modum excessit, 3. de comp. med. loc. cap. 3.

Supergeminalis, vide *Epididymis*.

Supergenualis, vide *Patella*.

Super humeralis, quæ & *Epomis* dicitur, vide *Humerus*.

Superimprægnatio, vide *Epicyema*.

Superligamina, vide *Epidesmus*, & *Plagula*.

Superligula, vide *Epiglottis*.

Superpurgatio, & *Supervacuatio*, vide *Hypercatarsis*.

Supinitas, Stomachi affectio est, qua quidam accepto cibo, si paulo fortiori motu moueantur, statim vomunt. Cæterum quæ à multis vulgo supinitas stomachi appellatur, contingit quidem iuxta intemperiem quamcumq; citra vitiatos humores. Aliquando sequitur ad solam oris vetriculi debilitatem, quod cibos amplecti, eisq; obuolui non potest, veluti tota

Ventris amplitudo solet. Fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignae qualitatis. Irriguus enim stomachus per largam humectationem, similiter ut ligamenta nervorum, laxatur, quandoque verò cum vitiatæ alicuius, modicae tamen humiditatis complexu; etenim multa, quemadmodum valde vitiatæ, etiam citra cibum, nauseam efficit, 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Suppuratio, vide Purulentia.

Suppuratus est, qui multum puris in capedine inter thoracem & pulmonem collectum habet; communiter verò omnes quibus inflammatum viscus aliquod suppuravit, suppuratos, Empyus & Empyicus vocant, 4. de caus. cap. 6. Suppurari autem aliquando ad generalius significatum transfertur, idest ad corrumpi; sic enim sanguis cum è suo loco exciderit, & per minimas partes ad eas quæ in musculis sunt cavitates, aut per inani & spatia, quæ uasis circumiacent, fuerit effusus, non permanet sanguis, sed aliquando suppuratur, aliquando nigrescit, aliquando in grumos vertitur, præsertim quando in magnam cavitatem præter naturam exciderit, 6. aph. 20. vide Empyus, & Purulentus.

Sura est Tibiæ venter quem Græci Gastrocnemion vocant, 3. de vsup. cap. 10. Estq; posterior tibiæ pars carnosæ, 16. de vsup. 8. veluti anteriorem carnis expertem, Anticnemion, & Ocream nomi-

nominant, 2. de anat. adm. cap. 4. uide Tibia.

Surditas, κώφωσις, est actio auditus abolita, à causa aliqua præter naturam, vel læsa audiendi facultate, eiusque primario instrumento, quod est animalis spiritus in aurem affluens, aut læsis organis, quæ natura ad audiendum comparauit.

Suspendiculum appellatur, quod fœminis intra abdominis membranam situm, à musculo dependens, atque ad vuluam ex utraque parte dextera & sinistra transmittitur, utrinque alterum ab Ilium musculis per mēbranæ abdominis foramina, 2. de sem. c. 5.

Suspensum, uide *Sedimentum* & *Hypoſtasis*.

Suspiriosus, idest *Asthmaticus*, lib. de remed. par. facul.

Sutura, uide *Commisura* & *Compages*. *Sutura* adhuc dicitur inferior pars penis in longitudinem, vergens.

Sycosis, marisca, ficus, ficatio, est tumor à fici similitudine sic dictus, vlcerosus, rotundus, subdurus, rubicundus, dolorificus; ex quo aliquando exiguum, & glutinosum quid egrèditur, tum in barba maxime exorians; aliquando humidum & inæquale & graueolens præcipuè in capillo proueniens ꝑ, semper fici similitudinem fert, & carnis excrescentiam. Interdum in mento fit. ab humore non solum crasso, sed etiam participe serosæ & tenuis humiditatis, qua exulceratur, eoq; differt ab Iontho. Nascitur & in ano, sola magnitudine à Thymo differens. Latini

Mariscam

Mariscain appellant, quam aliqui dicunt esse ficum præ pinguedine hiantem, semenque ostendantem, dicitur & ficatio, 2. meth. 2. & 10. simpl. Appellatur etiam Sycosis interioris palpebre dura, & asperior scissura, com. 2. in 6. de morb. vulg. 4. & lib. de ocul. cap. 9.

Sycota idest ficata, ex caricarum esu appellantur, tum maxima, tum suauissima iecinore ipso, ut liquet, ex dulcium esu alimentum vberius accipiente, 3. acut. 11.

Syderatio, seu sideratio, est corruptio solidorum corporum omnis, ut ipsis quoque ossibus insit, ne dū carnibus, aut vasis, quo differt à Gangræna quæ est mortificatio solidorum corporum, non ossium, lib. de tumor. cap. 11. quam syderationem sphacelon Græci uocant, 7. de anat. adm. cap. 13. Totam substantię uniuscuiusque partis corruptionem, syderationem, idest sphacelon, ueteres appellabant, sed in partibus carnosiss, alijs quoque nominibus eandem uocant; quin ipse Hippoc. tum putridam carnem, tum marcidam, tum uitiatam dicit, alijsque huiusmodi nuncupare consuevit; de osse uerò quod in tota substantia uitiatur, syderationis seu sphaceli nomine uti consuevit, tale autem uitium ossibus contingit, quando adiacens caro prauas sanies producit, quibus ipsa mædificando corrumpit, 2. de fract. 20. Vnde sphacelare idest corrumpere, & sphacelon, idest Caries, 5. loc. aff. 3. Semisyderatus autem homo dicitur, qui altera tantum

tantum parte dextra aut sinistra computruit, lib. de aqua, aëre, & loc. cap. 6. & 4. de artic. 17. quæ & sideratio.

Symmetria, idest temperies, & contemperatura, est debita conuenientia et proportio inter se tum similiarum partium, in calido, frigido, humido, & sicco, tum instrumentalium in compositione, numero, magnitudine, figura, 1. de sanit. tuen. cap. 1.

Symmetrum absolute est, quod nulli collatum, medium, mediocreque in omni temperie primarum tum actiuarum, tum passiuarum qualitatum, secundariumque constituitur, tale & Eusarcon, & Quadratum est; non absolute uerò *symmetrum*, quod in aliqua specie vel genere tale est, ut ad ipsius accessum uel recessum, aliquid temperatum, uel intemperatum dicatur, 1. de temp. cap. 6. *symmetrum* uerò medicamentum est, et quod sit similis temperamenti, cum eo cui admouetur, & mediū sit temperamenti omnium primarum qualitatum, 5. simplic. 27.

Sympaschin, est per consensum, seu per uiciniam affici, quoties pars aliqua, non proprio affectu, sed alieno afficitur, 1. loc. aff. 6.

Sympathia est affectio compatiens alteri cuiusdam primo patienti, uel propter uicinitatem, uel propter societatem, quæ in ea sunt partium, com. 1. in 1. prorrh. 20. uide *Idiopathia*.

Sympepsis est concoctio, qua natura crassis & crudis humoribus, & concoctu difficilioribus, siue
etiam

etiam per abscessum prouidet, ueluti calidioribus & tenuioribus per excretionem, 3. progn. 23.

Symphysis est naturalis ossium unio, uel quando duo ossa sibi inuicem coalescunt, ueluti fungosiora, mollioraque sunt, uel quando alia aliorum interuentu connascuntur, ut sunt sicciora, & densiora, uel media cartilagine, et dicitur *Synchondrosis*, uel medijs neruis & dicitur *Synneurosis*, uel media carne et dicitur *syssarcosis*, lib. de ossib. in proœmio.

Symptoma (quod & passio & pathos, & pathema, & *Epigenema*, quasi supergenium uel supergenitum dixeris, appellant) generatim nominatur, quicquid animali præter naturam incidit, ita ut tum morbi ipsi, tum morborum causæ, quæ scilicet intra corpus subsistunt, non quæ extra habentur, symptomata sint; Altera uerò significatione ac magis propria, detractis tum morbis, tum eorum causis, reliqua omnia, quæ præter naturam sunt, symptomata nominantur, lib. de sympt. differ. cap. 1. & cap. 2.

Symptomasis affectus est, quo meatus qui à Base Cerebri ueniens, oculo uidendi facultatem tribuit, ex atrophia, uel resolutione fit arctior, conciditq; lib. Introd. cap. 15.

Symuenicos, idem est ac accidens; apud Philosophos accidens id est, quod è regione substantiæ diuiditur, sed à medicis tum maxime Gal. 1 meth. distinguitur ex aduerso symptomatis, quæ enim inquit constitutionem unde actio nascitur, necessario sequuntur.

sanis

sanis quidem nobis symueuicota, idest accidentia, ægrotantibus symptomata nuncupantur. Accidentiũ autem differentias, 2. meth. tres constituit, sunt enim uel ut affectus, uel ut actiones, uel ut passionες, quorũ etiam hæc exempla ponit, inambulare, uri, cedi, album aut nigrum esse; ita ut id ex accidenti dicatur fieri, quod nec primum, nec per se fit, quod exemplo calculorũ motorũ declarat Gal. lib. de differ. sympt.

Synanche, uide *Cynanche*.

Synarthrosis, uide *Articulus*.

Synetia, uide *Continentes causæ*.

Synceras deiectiones uocat Hippoc. impermistas aquosæ humiditati, quoniam solus humor euacuatus deijcitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorem præ se ferens, siue bilis que æruginosa nominatur, nam deiectiones huiusmodi, exustam esse omnem natiuam humiditatẽ à calore febrili demonstrant, 7. aph. 6.

Synchondrosis, uide *Symphisis*.

Synchisis est oculi uitium, confusis secum eius humoribus, id quod accidit, ut plurimum ex uehementi plaga, interdum uerò & ex *Vueæ tunicæ* inflammatione, ruptis eius uasis, effusoque humore.

Syncomistos panis, uide *Autopyrus*.

Syncope est præceps uirium lapsus, 12. meth. 5. quem uirium lapsum duo præcipua symptomata consequuntur, exoluto quidem natiuo calore, frigiditas totius corporis, digesta uerò solidorum corporum substantia,

stantia, sudor quem medici syncopticon, & diaphoreticum appellant; ex quibus pulsus defectio, & sensus motusq; priuatio, consequuntur. Differtq; à lipopsychia & lipothymia, quod licet utraq; affectio affatim & confertim fiat, in syncope tamē plurimus subsequutus sudor diaphoreticus, languidiores vires reddit, qui cum aut nullus, aut modicus sit in exolutione, lipopsychia, et lipothymia, minorem noxam uiribus accumulat.

Syncretica, hoc est, relaxantia medicamenta, à coagmento sic dicta, 2. de anat. adm. cap. 1.

Synchromata, idest corporum simplicium & elementorum compositiones, seu concretiones, de differ. morb. cap. 5.

Syncrisis, idest, concretio & temperamentum, lib. de marc. cap. 4.

Syndesmi, idest ligamenta, sensus expertia, ex osse ortum ducentia, (non ex Cerebro aut spinali medulla) rotunda alba & exanguia, cavitare carentia, in fibras diuisa, 6. meth. 4. vide ligamentum.

Syndrome concursus est, & congressus symptomatum, lib. finit. Pletorica autem syndrome, est omnium humorum concursus; Syndrome autem pathognomonica, est concursus symptomatum morbum indicantium, lib. de cur. rat. per sang. cap. 9.

Synneurosis, uide Symphisis.

Synocha hoc est, continens febris est, cuius uersum tempus una accessio est, quæ uel semper in eodem.

dem uigore consistit, uel minuitur, uel augetur, donec iudicetur; quæcunq; enim per circuitus aliquos, egritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ scilicet membra uel mittunt, uel suscipiunt, uel generant, uel attrahunt superfluitates, sed quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars quæ præcipuè sit læsa; sed qui in uenis & arteriis omnibus continentur humores, atque uero præsertim qui in maximis, atque plurimo calore abundantibus sunt, aut ob aliam quamuis causam, ut in Ephemeris, aut ob putrefactionem feruētes febrem unam accendunt, Synochā appellatam, quæ à principio usque ad finem nullam habet intermissionem, ac tamdiu perseverat, hominemque deuoritur, donec qui ei causam afferunt humores, aut ex toto absumantur, aut coquantur, aut utrumq; patiantur, 2. de differ. feb. quæ & synochus putrida, deuoritur, ardens, Causon, succensa appellatur, 2. de cris. cap. 6. vide Continua, & Febrem Synochon.

Synochus idest continens febris, quartum febrium genus enumeratur, quod quia ex sui natura ultra tertium diem extenditur, nec humorem putrescentem habeat, nec febrilem calorem ut habitum possideat, propterea nec diaria, nec putrida, nec hectica dici potest, sed uel diaria plurium dierum, uel synochus non putrida, uel synochus conclusa merito appellari potest; quam febrem uel conuiuentia meatuum, uel recens corporum densatio excitat, 9. meth. 1.

Syno-

Synodontes, vide Hiatus.
Synonima, idest Vniuoca, quæ inter se communi-
cantia, ab vno factam denominationem habent, 4.
acut. 13.

Synopsis, idest, cõpendiũ, lib. de neruor. diff. c. 17.

Syntaxis, idest mutua compositio, & connexio,
1. de vsup. 14.

Syntasis, distentio, opposita est laxitati, vtraque
& in cute & in articulis contingens, aut resiccatis,
aut perfrigeratis, aut inflammatis, aut induratis, in
cute vero non his tantum modis, sed etiam vbi mu-
sculi intra ipsam, quouis modo augescunt, tum maxi-
mè ex carnis copia & abundantia, vt in vtre pleno
aqua, & Tympania, quod Gal. in pluribus libris
Methodi testatur.

Syntexis, Colliquatio, vide Febris colliquatiua.

Synthesis, est ossium inter se compositio, qualiscũ-
que ea sit, est enim vniuersi generis nomen, quam
alijs quoque nominibus vocari tradit Galenus, Syn-
taxin, scilicet, & Homiliam, lib. de ossib.

Synsilotica medicamina sunt, quæ vlcerebus cica-
tricem inducunt, 13. meth. cap. 5.

Syphon, vide Metenchryta.

Syringomata, instrumenta sunt, quæ ad fistulas
incidendas sunt comparata, 6. meth. 4.

Syreon, vide Sapa.

Syrinx, idest fistula, tubulus est callosus, angustus,
oblongus, interdum etiam obliquus, os habens cui ci-

carrix

*catr*ix obducinequit, per quod humor statis temporibus tenuis excernitur, quarum aliæ cæcæ nominantur, quæ osculum in profundo, sinum ad superficiem habent, aliæ occultæ quæ & os & sinum obtinent in profundo, lib. finit. uide *Fistula*.

*Sy*ssarcosis, uide *Symphisis*.

Systematica inæqualitas, est congregatio multarum inæqualitatum, & pulsus ex cumulo multarum pulsationum consurgens, 4. loc. aff. 8.

Systole est submissio pulsus, 1. de differ. feb. c. 7. (dicitur etiam *systole* & *Diastole*, idest, constrictio, & dilatatio, de motibus thoracis & pulmonis, lib. de vocal. inst. diff. cap. 2.) quo motu facultas fuliginosa excrementa expellit & repurgat, atque ita refrigerium calori nativo moliatur.

Systrophe, *Phyma* et *Schleria*, hoc est tuberculum & duresces, ut exponit Galenus in linguis Hipp. quam, 4. acut. scribit esse eam quæ à partibus excitatur intumescens.

T

TABES, quæ *Phthisis* Græce communiter appellatur, est ulceratio pulmonis, vel Thoracis, uel faucium, ut & tussicula & debiles comitentur febres, & corpus conficiatur, lib. finit. Nominaturque etiam *Tabes*, alicuius corporis particula præter naturam diminutio, siue ea in prima formatione huiusmodi appareat, siue post, eademque eiusdem

eiusdem particula atrophiam vocant, de diff. morb. cap. 9. vide ex egritudine senectus, & Phthisis.

Tabes oculi, quæ & Rhetidosis dicitur, est solius imminute pupillæ corrugatio, incidentibus alijs super alias rugis, quod spiritus parcius à primo Cerebri principio, quam pro natura deberet, affluat; differens à Tabe oculi senum, quæ est corrugatio corneæ tunicae, & pupillæ angustia, tamen ab imbecillitate senectæ, ex defectu humoris tenuis quo repletur, tum ex spiritus superne affluētis inopia, 10. de usup. 5. 3. aph. 16.

Tabida febris, vide ex egritudine senectus, & Marasmus.

Tabidos appellant veteres medici, qui morbo tabifico quem Phthoën vocant sunt opportuni. Tales plenissime sunt, qui adeò sunt angusto thorace & restricto, ut à Tergo in morem alarum promineant aperta scoptula, unde hos etiã Pterigodes. i. alatos vocant; Præterea quibus caput facile impletur, quodq; spiritus organis multas destillationes dimittit, hi facile tabescunt, com. 1. in 1. de morb. vulg. 18.

Talpa & Testudo, sunt affectus cutis capitis proprii quæ nomina recentiores addiderunt, cum penes antiquos hi affectus, neque nomen, neque tractationem inuenerint. Testudo autem Guidoni, abscessus est magnus, mollis, humoralis, latiore forma, in modum testudinis, unde nomen accepit, quæ si in capite nascatur talparia, uel talpa dicitur; in collo, bocius, in testiculis, hernia; interdum autem cum pure, squa-

mis, uel fistulis reperitur, reponitur sub abscessuum genere, subque meliceride potius quam atheromate Talpa verò, cum albam materiam contineat, ad atheromata potius quam meliceridem refertur. Bocium verò vulgus vocat, mollem, & laxum tumorem in exteriori gutturis parte, quem Græci Bronchocele nostri herniam gutturis, & eo affectos gutturosos uocant. Est autem colli tumor grandis & rotundus inter cutem, & asperam arteriam, in quo, modo caro hebes, modo humor aliquis, melli, adipi, pulti, aqueuè similis includitur. Huic similis affectus est, quem Guido vocat Natā seu Naptam, quæ est excrescentia magna, carnosā, ueluti caro Natium, uel anchurum, diuersarum quidem formarum & magnitudinum, cuiusmodi sunt melopepon & cucurbita.

Talus non idem est ac malleolus, sed talus est os sub malleolis contentum, unde quaque contactu, quod ne tangere quidem possis, lib. de ossib. cap. 22.

Taraxis, seu Conturbatio, est cum oculus leuiter, ac mediocriter commotus, tandem rubicundior euadit, lib. Introd. cap. 15. quem Paulus definit, esse humiditatem & caliditatem oculi cum rubore præter naturam, à causa externa inductam, ut Sole, fumo, puluere, oleo; quò, differt ab ophthalmia quæ causam tantum internam agnoscit, Paul. lib. 3. c. 22.

Tardus pulsus est cum longo tempore, arteria distenditur, 1. de differ. puls. cap. 7.

Tarson, uide Pedion.

Tarsus

Tarsus oculi, est substantia quædam membrana durior, ac tensa, qua parte Periostios oculi tunica remeare ad corneam incipit, tenuibus quidem pertusa foraminibus, ex quibus palpebrarum pili emicant propter suam duritiem, extendens in rectitudinem palpebras, 10. vsup. 7. uide *Cilia*.

Taurus est inferior Colis pars, in longitudinem eius vergens, vsque ad sedem porrecta, lib. *Introd.* cap. 10.

Tela aranea, vide *Rhagois*.

Telephi., & *Chironia*, vlcera dicuntur inueterata, & quæ vix curam recipiunt, cicatricemque difficillime contrahunt, sic dicta quod Chirone medicina peritissimo ad sanationem indigeant, uide *Chironia*.

Telma, idest solidum, & tensum, durumque ac pilis etiam nudum, facileque sentiens, pedis vestigiū, lib. de musc. diff. cap. 33.

Temperies, vide *Symmetria*.

Tempora, Κεράφοι appellantur partes ab utroque syncipitis latere, supra aures sita, lib. *Introd.* cap. 10.

Tempora morborum talis res morbis sunt, qualis animalibus differentia secundum ætates, neque enim tempus simpliciter hoc vocabulo significatur, neque conueniens illud tempus in quo præsidia etiam consideramus, sed tantum morborum ætas, quæ temporū vicissitudine immutatur, ut animal ætatibus, lib. de

stino substantia simile ; differt autem, quod neq; vacuum reperiatur, neque tot vasis & inuolucris sca-
teat, & de anat. adm. cap. 9. quod & Ileon & Inuo-
lutum appellatur, lib. de anat. viii.

Tenuia appellantur medicamenta, quæ facile in
tenues cõminui partes possunt, Leptomeri Græcè; cras-
sa quæ contra, Parimeri appellata, 1. simplic. 3.

Tenuis pulsus, vide Gracilis.

Terebella, vide Abaptista.

Teredo, Teredon, siue Terdo, est caries in osse,
3. meth. 1.

Teretes lumbrici sunt, palmi longitudine, vel etiã
maiore, ad Stomachum vsque proserpentes uermes,
lib. Introd. cap. 13.

Tergum, Noton Græcè, sunt posteriores Corpo-
ris partes, quæ collo subiacent, scapulis, dorso, spina
& lumbis constans, lib. Introd. cap. 10.

Terra Argyrite, vide Argyrite terra.

Terra medicaminosa, quod aqua irrigata, facile
in lutum soluitur, terra appellatur; quia verò ea uti-
mur velut alijs medicamentis, idcirco non iniuria
Pharmatidis, Latine sola medicaminosa vocatur,
nempe quia sola est eiusmodi, vt euidentiore vim
medicaminosam possideat, 9. simplic.

Terræ intestina, Gisentera Græcè, idest, Lumbrici terrestres, 11. simplic.

Tertiana simpliciter, est tertiana intermittens, con-
tingit enim hanc ipsam sine aliqua adiectione tertia-

nam simpliciter ita nominare, quemadmodum, & quotidiana intermittens, quotidiana simpliciter appellatur, 2. de diff. feb. cap. 7. Earum febrium intermittentium, quæ tertia quoque die accessionem faciunt, quæ quidem breue habent accessionis tempus (quod duodecim horarum equinoctialium spatio ad summum finitur, 2. de differ. feb. cap. 3.) ac cum rigore inuadunt, & per sudores & bilis vomitum, & biliosa excrementa finiuntur, his tertianæ exquisitæ nomen impositum est, quibus uerò aliquid horum deficit, hæ non exquisitæ sed simpliciter tertianæ appellantur; quod si intermissione minorem habuerint, accessione videlicet in longius tempus protracta, hæ tertianæ extensæ vocantur, 2. de differ. feb. cap. 8. Exquisita uerò tertiana est, quæ sui ipsius naturam puram, synceramque seruat, idest, flauam bilem redundantem, & motam, tempus æstiuum, locum calidum & siccum, hominis ætatem & temperiem similem, 4. aph. 59.

Tertianus circuitus, vide Quotidianus.

Testes, testiculi ὀρχῆς, sunt corpora duo glandulosa, alba mollia, rara, laxa, cauernosa, rotunda, seminis, et generationis principium, quæ quod duo sint Ἀδύμοι appellantur, quos Galenus, 3. aliment. fac. glandibus annumerauit; quæ in maribus extra membranam abdominis sunt, & protendent musculis, quos ἡσπαστήνας uocant; mulieribus intus latent à lateribus uteri, frigidiore minores & imperfectiores quam

quàm marium, 14. de vsup. cap. 10.

Testudo, vide Camarion, Fornices, Talpa.

Tetanos, rigor, distentio neruorum; est conuulsio perpetua totius corporis rigidi, & in neutram partē se inclinantis, contractis ad suum principium neruis, & musculis, quibus caput annuit, renuit, circumagitur, equaliterq; ante et retro tēsis, Gal. lib. de muscul. dissect. vide Distentio.

Tetrpharmacum medicamentum est, quod ex cera, adipe, resina, pice æqua omnium portione constat. Aduersus Lycum, cap. 7.

Thele, papilla; mammæ capitulum est, unde infans lac sugit, medium in mamma protuberans, quā ambit circulus quidam subniger, qui φῶς appellatur.

Thenara propriè uocant prominentes uolę manus partes, à verbo θέναι, quod est verberare, ut non nulli uolunt qui Etymologijs gaudent; quippe cū, his prominentibus partibus percutere soleamus ea quę percutimus; alij non omnes partes prominentes palmę ita appellari aiunt; sed solas eas quę sub pollicibus extant, 1. de fract. 20.

Therapeutice, idest, medendi methodus 7. de cōp. med. per gen. cap. 1. quę & Curatoria dicitur.

Theriaca appellarunt Crito, & cum sequenti, quod Vipera carnes acciperet; Andromachus verò, qui primus illam composuit, Galenen, hoc est tranquillam, lib. de usu Theriac. ad Pamph. prope finem.

Tberisma, teterrimum ulcus est, tum ex se nascēs,

tum

tum alteri superueniens, ut refert Celsus, colore liuidum, nigrum, odore fœdum, multo mucoso humore repletum, quod inflammatio, febris, prurigo & dolor comitantur, à quo sanguis interdum fluit, serpit et exedit, atque ob id aliqui herpetem exedentem, vocant, aliqui dicunt idem esse cum Carcinomate, quod Gal.com. 2. in 6. Epid. dicit in solo pulmone generari, alij in quacunque corporis parte.

Thermantica, calfactoria medicamenta sunt, quæ suo calore omnem perfrictionem, & stricturam calefaciant, lib. de Dynam. in procemio.

Therminthi nomen, nigras quasdam pustulas in cruribus maxime orientes significat, à figura, coloris, magnitudinisque similitudine quam cum Therminthorum, idest, cicerum fructu habent, deriuatum com. 3. in 6. de morb. vulg. 37.

Thlasma, quæ & Thlasis dicitur, vide Rhegma, & Vnionis solutio.

Thlypsis, vide Epiparoxineste.

Thoracem consueuerunt Medici appellare, totum illud corporis spatium, quod duodecim costis vtrinque circumscribitur, pertinetque anteriore quidem parte ad pectorale os, ac septum transversum, declinat vero posteriore ad spinam duodecim vertebris ac reflectitur, lib. de ossib. cap. 13. & 6. de vsup. cap. 2.

Thorexin nominare consuevit Hippoc. vini potionem, 2. aph. 21.

Thrombos sanguinis grumus est, seu sanguis concretus,

cretus, 5. meth. 8.

Thrombosis est dum lac grumescit in mammis, et in casei formam transit; grumescentiam lactis interpretes non nulli vocant.

Thymiama hoc est suffumigium, quod ex moderate adstringentibus resiccantibus ac discutientibus utiosos, & serosos humores, & corrigentibus humorum malitiam, & contrariam vim habentibus aduersus putrefactiones quorum plurima ex aromatum sylua habentur, constat, 8. de comp. med. loc. cap. 7.

Thymus, asperæ carnis extuberatio est, quæ similis circa genitale ac sedem oritur, lib. finit. & 14. meth. 13. Est & tumor præter naturam, uide Epulides. Est & Thymus idem quod Glandium, seu Aden, seu Glandula, uide Aden, Glandula, vel ut alij Thymos carnosus est, excrescentia, nunc in Glande, nunc in præputio, nunc in ipsa sede consistens, sic dictus, quod Corymbis Thymi sit similis. Thymorum aut alij mites, alij maligni; Mites sunt exigui, scabri, candidi, dolore carentes; feri autem ampliores, scabiores, liuidi, dolorifici.

Thyreoides chartilago, uide scutiformis, & Crioides.

Thyroides, est ossis pubis foramen ab ostij similitudine, sic appellatum. 3. de anat. adm. cap. 13.

Tibia est tota cruris pars, inter talum, genuq; posita, in interiori parte sita, cuius tibiæ pars anterior tenuis, & carnis expers, Ocrea appellatur, lib. de ossib.

offib. cap. 22. Eademque infra genu *Anticnemion*,
(*Latinis Crea*) 2. de anat. adm. cap. 4. posterior *Car-*
nosa pars Sura, & *Gastrocnemion*, 16. de vsup. c. 8.

Tilmata, idest *vulsiones facte in fibris musculorū*,
dum nimis distente interdum rumpuntur, 4. de ijs
que in medic.

Titillatio oculorum, vide *Mollities*.

Toma pro *phlebotomia* vsurpatū, 2. de nat. hum. 9.

Tomē dentes, idest *Incisoriū*, dicuntur quatuor pri-
mi anteriores, ad cultri similitudinem, ad eos cibos
incidendos, qui mollitiem in se habent; sicuti ad du-
ra confringenda, alij utrinque proximi constituun-
tur, ceteri omnes dentes molares, siue maxillares
appellantur, lib. de offib. cap. 4. quos etiam *Mylas*,
idest, *molas* uocant, 11. de vsup. cap. 8.

Tonica, siue *Tonotica* medicament. sunt quæ
extrinsecus illiniuntur, robur particula lese inseren-
tia, 13. meth. cap. 22.

Tonicus motus est, qui exercetur a corpore labo-
rante *Tetano*, duabus contrarijs virtutibus opposito-
rum musculorum inter se pugnantibus, 1. de motu
musc. cap. 8.

Tonos, idest, *neruus*, nuncupatur ab ipsis opera-
tionibus, vnum instrumentum duobus hominibus;
eo quod *neruus neuin*, hoc est nutare, seu flectere, &
tonos tinin, hoc est tendere, natum est, 1. de motu
musc. cap. 1. vide *Neruus*.

Tonsille, vide *Isthmus*, *Vue*, *Paristhmia*.

Tophus,

Tophus, vide Callus. *Topica remedia, idest localia, 13. meth. cap. 22. quæ loco affecto non prius applicari debent, quàm totum prius corpus purgetur; ne his irritato affectu, plus etiam affluat ad membrum læsum, uitiosi succi, lib. de remed. par. fac. cap. 6.*

Torcular, siue Linon, est locus quidam vacuus, quasi Cisterna in uertice capitis, in quem meningis duplicationes sanguinem deducunt; unde velut ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, sanguinis riuus mittuntur, 9. de v. sup. c. 6. et 9. de anat. adm. c. 1.

Tormina, idest, Dysenteria vocabulum, nō pro vlceratione intestinorum, vt plerique medici solent, sed pro cruenta ex intestinis proluuie sumit Hipp. vt etiam quando ex Iecoris imbecillitate cruenta deijciuntur, affectio ea torminum nomine appelletur, id quod & fieri, & dici à Medicis quoque videtur, 4. de art. 40. fiunt autem tormina & propter morsum vehementem, & propter spiritum flatuosum, qui nō habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus, 4. aph. 11. vide Dysenteria.

Torpor est motus & sensus difficultas in toto corpore, & maxime in artubus à frigore, & compressione neruorum corporū incidens, 1. de caus. symp. cap. 5. aliquando torpor significat, ventriculi in concoquendis cibis imbecillitatem, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1.

Tortio est cum articulus quidē est illesus, sed ner-
uosa

uosa circa ipsum partes tortæ sunt, id quod maxime in ijs contingit, quorum in uacuum gressus dilabitur, 3. de ijs quæ in med. 31.

Toxica, hoc est venena, quæ mortem inferunt, lib. de Dynam.

Trachea, idest, aspera medicamenta, quæ suffocata loca vlcérant, et exasperant, lib. de Dynamid. in procæmio.

Trachea arteria, uide **Aspera Arteri.**

Trachoma, altera est species scabiei palpebrarū, aspera, dolorem, & gravitatem faciens, in oculis humiditatem generans, lib. de ocul. par. 4. cap. 9. Inde **Trachomata** appellantur, quæ hanc asperitatem detergunt, 14. meth. 19. Hinc **trachōtus**, asperitas, quæ est vitiosa confirmatio parti cui accidit, in aqualitatem absumpto humore inducens, opposita affectio leuitati, quæ sunt duo prima morborum genera in formatione sita.

Traductio, est diducti ossis in naturalem statum reuocatio, lib. finit.

Tragemata, sunt ea quæ post cenam, uoluptatis inter bibendum excitanda gratia, & ad dulcorandū, assumuntur, 1. de aliment. fac. 34.

Transpiratio, seu **Perspiratio**, est insensibilis per poros perflatus, 1. de sanit. tue. cap. 12. vide **Inspiratio**.

Translatiuus motus, uide **Metalepticus**.

Transumptiuus motus, quem **Metalepticum** vocant,

cant, quo in machinis utuntur plurimi, tum archi-
tecti qui mechanici dicuntur, tum medici qui orga-
nici nuncupantur, qualem motum natura musculis
conciliauit, quoniam nervorum eorum principia ad
Cerebrum appenso, quando ratio vult tanquam ha-
benis quibusdam musculos laryngis intēdere, motus
qui à principio proficiscitur à superiori loco per totū
collum fertur deorsum, ad multā usque thoracis par-
tem, indeq; rursus redit usque ad laryngem, ubi ner-
uis in prædictos musculos insertis, quasi à manibus
quibusdam singuli musculi deorsum trahuntur, 7. de
v. sup. 14.

Traulotes, Latinis Blasitas nominatur, qui hac
passione correpti sunt, τραυλοι Græcis, Blasī verò La-
tinis dicuntur, & sunt qui aliquam certam literam
exprimerē non valent.

Tremor, vide Palpitatio.

Tremor oculorum, vide Mollities.

Trichiasis, idest capillitium, morbus est in quo
cum crassa urina, veluti capilli una exeunt, 4. aph.
76. Adhæc Trichiasis est affectio, in qua pili inuti-
les & pungentes palpebris enascuntur, 4. de comp.
med. loc. cap. 8.

Triens, hoc est uncie quatuor, 4. de comp. med.
per gen. cap. 14.

Triglochina, siue Trisulca figura est, quæ quinque
membranis Cordis, tribus dextera parte, duabus si-
nistra, similes in figura triangulari, telorum cuspidi
assimi-

assimilatur, 7. de anat. adm. cap. 9.

Trigona medicamenta sunt, ex seminibus composita, quæ sicut ad torporem inducendum in præsens mitiora, ita in futurum sunt tutiora; adq; hæc quoque omnia, vtilius annotina sumuntur, 12. meth. c. 1.

Trismos, siue Trysmos, idest stridor, est convulsio musculorum mandibularum, ex qua fit dentium inuita concussio, 2. de caus. sympt. cap. 2.

Trisulca, vide Triglochina.

Tritæophyes (quæ & Tritæus) febris, hoc est tertiane naturam sapiens nominabitur, quæ tertio die exasperatur, & ferme in integritatem remittitur; sed si qua febris, tertio quoque die exacerbatur, neque per minimum interuallum ita mitescat, ut in eo febricitas propè synceram integritatem esse uideatur, hanc si quis tritæophyes nominare velit, forsitan, & ipse non sine ratione in hanc sententiam descendere videbitur, com. 2. in 6. de morb. vulg. 23.

Tritæus, vide Tritæophyes.

Trius, Græce Τρις, apud Hippoc. significat eam corporis partem cui siue stantes, siue ambulantes, siue sedentes, siue iacentes, innitimur, ut stantibus nobis atque ambulantibus, plantæ pedum, nates sedentibus, spina supinis, cubito innitentibus, cubitus, 2. de his quæ in medic.

Trochantera, quod & tuberculum, magni ossis femoris processum vocant, 2. de anat. adm. cap. 6. & lib. de ossib. cap. 21. vide Femur.

Trochlea

Trochlea brachij, vide *Bathmides*.

Trociscos, vide *Pastillos*.

Tromata, hoc est ictus, nominat Hippoc. magnas noxas ab aliquo extrinseco, etiam sine vulnere illatas, com. 5. in 6. de morb. vulg. 12.

Tromos, idest tremor, 2. meth. 2.

Trypsin, vide *Anatrypsin*.

Trysmos, vide *Trismos*.

Tubercula, sunt quædam sponte nascentes. & celerrime factæ inflammationes, quæ celerrime in altum attolluntur acumen, & celerrime suppurantur, & plurima horum in inguinibus & alis est generatio, quoniam in his partibus plenæ sunt adenes, qui apti natura sunt ad has superfluitates prompte excipiendas, 3. aph. 26. *Turberculum* adhuc & *Phyma* nominat Hippoc. quod in alijs ipse solitus est vocare suppurationem, græce *Empyema*, 7. aph. 8. de tumor. cap. 15.

Tumor, vide *Oncos*.

Tunicarum nomine, quidam sola composita operimenta dignantur; alij autem crassa, alij nisi composita simul & crassa extiterint, eis appellationem hanc non tribuunt; Ad eundem autem modum, & de membranis litigant; quibusdam enim simplicitas sufficit, alijs autem tenuitas, alij ambobus opus esse arbitrantur, ut ita nominentur, & nisi tenue fuerit simul, & simplex operimentum, id volunt vocare membranam; At antiqui certè, tunicas, membra-

D d nas,

nas, meningas, præter hæc omnia eiusmodi vocant, quos nos quoq; sequentes, à vana quidem in nominibus garrulitate, discedemus, 4. de vsup. cap. 9.

Tunicæ Cordis sunt corpora tegentia extrinsecus utrunq; ventriculum Cordis, 6. de vsup. cap. 8.

Turgere, verbū est translatum ab animalibus concubitum appetentibus, ad humores, nam sicuti illa stare loco non possunt, quadam titillatione impulsæ, eoq; affectu concitata, sic & humores plerumq; in motu vehementiore, atque transfluxu à partibus ad partes in morbi principio hominem infestant, mouētes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moveantur, & transfluant, & tanta latione agrum molestant; Tales sunt humores turgentes, qui sunt in motu, latione, et fluxu, 1. aph. 22.

Turgidus dolor est, qui à parte primario affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur, 2. loc. aff. 7.

Turgidus pulsus, vide Gracilis.

Tussis, est vehementissima quædam efflatio, quæ plurimus simul, celerrimeque foras actus spiritus attrahat, propellatque suo impetu, quæ vias suas obstruunt, 2. de sympt. caus. 4. Cum enim externus aër in asperas arterias trahatur, quæ chartilagineæ duræque sunt, nec contrahi circa id quod continent, possunt, incitatum hunc excogitavit spiritus exitum, quem vocant tussim, quo spiritus sibi ipsi violenter, & cum impetu delatus, vias expurgat, non aliter
quàm

quàm tibiās, & fistulas expurgant harum opifices,
2. de caus. sympt. 3.

Tussis sicca, in qua nihil expuitur, 4. aph. 54.

Tylosis, idest callus; sic autem nuncupatur, cū in palpebris aspritudines ex senectute crassiores, albidiores & parum sensiles extiterint, eo quē minus detereri possunt, lib. Introd. cap. 15.

Tympanias, qui & Tympanites, Hydropis est species, in quo spiritus totam thoracis superiorem et inferiorem regionem, tumentes facit, 4. acut. 111 vide Ascites.

Tynesmus, qui & Tinesmus & Tenesmus appellatur, est recti intestini vehemens tensio, & prompta deijciendi cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa & pingua, progressu verò temporis, etiam abrasionis specie deijciuntur; sed per totum morbi spatium, ijs quæ à supernis descendunt, haud quaquam misceri videntur, 6. loc. aff. 2. Atqui Tinesmus vlcus est in recto intestino factum, quod quidem infert symptomata Dysenteria similia, nixus tamen multo vehementiores, 3. de sympt. caus. 2.

Typhodes febres, idest succendentes, vt Causodes incendentes sunt, quarum media est semitertiana, 1. aph. 12. vide Febris Typhodes.

Typhomania (quæ & Typhonia) est delirus Lethargus, vel lethargicum delirium, lib. finit. quæque Typhomia appellatur, commistus affectus ex lethar-

go & Phrenitide, lib. de Comat. cap. 2. Ego verò quoties ad finem vsque tum desipientia, tam Coma persistunt, affectionem hanc ex phrenitide, & lethargo mistam appello, quidam Typhomaniam vocauerunt, 1. prorrh. 1.

Typus est ordo intentionum & remissionum; periodus siue circuitus est tempus intentionum ac remissionum in morbis factum, lib. de Typis, cap. 2. siue est formula quedam accessionis, cum vel subsequitur, vel anticipat, 1. cris. 3.

Tyria apud Arabes, & barbaram sectantes medicinam, idem est ac Ophiasis, Tyri enim voce, oēs serpentes, & potissimum Viperas intelligunt.

VACUATIO, Græce κενώσις, vide Purgatio. Vacuus pulsus est, qui arteriæ elevationem facit bullosam, ut digitorum impressioni egressus, per vacua occurrat, 1. de differ. pul. 6.

Vaginalis tunica, vide Elytroide.

Vagina, vide Membrana dura.

Valga appellantur crura, in exteriorem partem vergentia; quæ verò in interiorem, vara & manca 3. de his quæ in med. 31.

Vapor, humor est extenuatus, qui pluribus est in spiramentorum raritate, corporis mollitie, substantiæ fusione, 1. simplic. 8.

Varices siue Cirsus, venas omnes dilatatas anti-qui appellabant, lib. de tumor. 16. Varices, sunt venæ la-

nae latiores in coxis & testiculis & cruribus, quæ ex crasso & melancholico sanguine contingunt, adeo ut pellente natura ad partes ignobiliores, humores crassos & melancholicos, dictarum passionum generatio sequatur, 6 aph. 21.

Variciformis flexus, uide *Flexus variciformis*.

Varicosum parastata, uide *Glandulosi assistentes*.

Varicosus assistens, uide *Genitalis*; *Glandulosi assistentes*, & *Meatus genitalis*.

Varicosus meatus, uide *Genitalis*.

Varus, exiguus durusque tumor est, in faciei cute obortus, Græcè *Ionthos*, qui differt à *ficosis* tumoribus in mento prouenientibus, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod participet tenui quadam sanie, ratione cuius facile ulceratur, non rectè atque ex arte curatus, lib. de remed. par. fac. cap. 11. uide *Ionthos*, & *Ficosus tumor*.

Vasa deferentia, uide *Glandulosi assistentes*.

Vasa spermatica, *Seminaria*, quæ vulgo *vasa preparantia* appellantur, uide *Glandulosi assistentes*.

Vehemens pulsus, siue *Validus*, & *Fortis*, est qui violenter tactum impellit, remissus siue languidus, qui debiliter, de puls. ad Tyron. cap. 3. & lib. 3. de differ. puls. cap. 5.

Vehementia morbi, est, ea quam magnitudinem vocant, et mos morbi, quem modum appellant, 1. cris. 3.

Vellicationes, seu *discerptiones*, iunioribus medicis appellantur, *vulsiones*, quæ in fibris musculorum

contingunt, dum nimis intentę interdum rumpuntur,
3. de his quę in med. 30.

Vena, φλεψ, est vas spermaticum, vna constans tunica, fibris triplicibus contextū, sanguini deferendo destinatum; uene etiam nomine, arterias comprehenderunt veteres, quo sensu Plato in Timæo uenas à Corde oriri asserit, vt testatur, Gal. 6. de Placit. vi de Arteria.

Vena arteriosa, uide *Arteria uenosa*.

Vena axillaris, uide *Axillaris uena*.

Vena axygos Græce, coniugio carens Latine, uulgo uena sine pari, ea est quę in quibusdam animantibus iuxta Cor adnascitur, in quibusdam uerò ut in hominibus, ex ea emergit parte, qua iam Cordis aurem uena Caua tangit; Hinc si quidem emergens, humiliter depressiusq; per Cor desertur, atque in spinam contorquetur, 2. acut. 10.

Vena Basilica, uide *Axillaris*.

Vena capillaris, uide *Apanthismos*.

Vena capitis, uide *Humeraria*.

Vena Caua, uide *Cava uena*.

Vena Cephalica, uide *Cephalica uena*.

Vena cōmunis, uide *Cōmunis uena*, et *Media uena*.

Vena coniugio carēs, uide *Vena axygos*.

Vena coronalis, siue *Stephaniæa*, uide uena *Peristephaniæa*.

Vena crassa, uide *Crassa uena*.

Vena cubiti externa, uide *Humeraria*.

Vena

Vena cubiti interna, uide Axillaris.

Venę emulgentes, uide Emulgentes uenę.

Vena Funis brachij, uide Funis brachij.

Venę guidez, uide Apopletica.

Venę Hemorrhoidales, uide Hemorrhagia.

Vena Hepatica, uide Axillaris.

Vena Humeralis, uide Humeraria.

Vena Iecoraria, uide Caua uena.

Vena Ischiadica, uide Ischiadica uena.

Venę Iugulares, uide Apopleticę.

Vena lata & magna, hoc est humeralis, 1. de artic. 53. licet communiter medici, & anatomici magnam uenam uocent uenam Portę, sicut Cauam, maximam appellant.

Vena manifesta, uide Manifesta uena.

Vena media, uide Communis.

Venę meseraicę, uide Mesenterium.

Vena nigra, uide Media Cubiti uena.

Vena Peristephaniæ, est quę Cor ipsum coronat, principiumq; sui ortus, extra membranas habet, 6. de usup. cap. 14.

Vena Poplitis, est ramus medius uenę Caue qui deorsum ad poplitem fertur, ubi uulgo uena Poplitis dicitur, qui per profundum Surę procedens, non modicam in musculos eius rancorum sobolem spargit, atque ob id, hæc uena communis, seu media dicitur, quemadmodum in manu, lib. de dissect. uen.

Vena porta, uide Caua uena.

Vena purpurea, uide Cōmunis uena, Media uena.

Vena saluatella, uide Saluatella uena.

Vena saphena, uide Saphena uena.

Vena sine pari, uide Vena az ygos.

Vena splenitica, uide Saluatella uena.

Venę, & arterię umbilicales sunt, quę uterī acetabulis adherescunt, quibus fētus in utero alligatur, & alimentum trahit, 1. de semin.

Veneticos oculos appellant, eos qui suffusione affecti sunt, fiunt autem Venetici oculi duobus modis, uel propter aquam si nimium fuerit coagulata, uel propter siccitatem quam patitur Crystallinis, lib. de ocul. par. 4. cap. 12.

Ventralis dispositio, uide Cēliaca.

Ventrem superiorem ueteres appellabāt thoracē; alimenti receptaculum omne, quod à septo transuerso est, uentrem inferiorem; Interdum autem uentrē superiorem nominabant, in quem cibi assumuntur, quę ab eo sunt omnia, uentrem superiorem; Interdū quoque & sola quę crassiora sunt intestina; sunt qui Colon duntaxat, uentrem inferiorem uocant, 4. acut. 112. 7. aph. 38.

Ventriculus est, in quem primo animalia cibum recipiunt, 6. de anat. adm. cap. 2. Aliquando uentriculi os, per abusionem, pro stomacho sumitur, lib. de cur. rat. per sang. cap. 1.

Vermiculans pulsus est, cum species exhibetur, quasi perreptantis arteriam uermis, undarum in modum

dum insurgentis, & non uno tempore arteriæ disten-
tæ paruus, languidus, & creber; Sin autem non par-
uitati, sed magnitudini sit adiunctus, dicitur *Vndu-*
sus; si ad extremam deueniat remissionem, crebrita-
tem, & paruitatem, formicans dicitur, de Puls. ad
Tyron. cap. 8. & 1. de differ. puls. 26. & 27.

Vermiformis excrescentia, siue *Epiphysis*, uide
Vermis Cerebri.

Vermis Cerebri, est obstaculum quodam, quod
habet porta, qua à medio Cerebri uentriculo, ad po-
steriorē itur, cuius forma est sicut pinca, lib. de ocul.
par. 2. cap. 2. Quin' particula quædam Cerebri, incū-
bit meatui qui est à Cerebro ad Cerebellum, quæ cir-
cumscriptionem obtinet figurâ uermi similem, in li-
gnis enascenti; Hinc etiam nomen *Anatomici* inue-
nerunt excrescentiam uermiformē, corpus hoc, quod
totum meatum contegit, uocantes, 9. de anat. adm.
5. diciturq; uermiformis epiphysis, 8. de usup. c. 14.

Vernaculus morbus, uide *Endemus*, & *Cōmunis*.

Verricularis, uide *Amphiblestroide*.

Verrucosa, uide *Dulcia ulcera*.

Vertex Capitis, (Græce Κόρυς) in media capi-
tis regione synciput superāte, est collocatus; unde ue-
lut à centro circulus, capillorum prouentus, incipe-
re uidetur, lib. Introd. cap. 10.

Vertex Cordis, est inferior uisceris terminus, fi-
gurâ turbinatus, qui infernæ pectoris ossis regioni
cohaerescit, cuius in extremo mucronata cartilago

con-

constituitur, 7. de anat. adm. cap. 3.

Vertebra, uide *Dorsum*.

Vertigo est affectio, qua caput circumagi uidetur,
4. acut. 42. uide *Scotodinos*.

Vesica fellis, uide *Cystis Choledochos*.

Vestigiū, uocat inferior pars pedis, 2. de fract. 10.

Veternus, hoc est gravis sopor, de caus. morb. c. 3.
siue ignauia & stoliditas. 1. prorrh. 31. & 2. aph.

3. dicitur autem *Veternus*, quasi ueteranus morbus,
qui *Lethargus* uocatur, in quo ægri ueteranorū, idest,
senum more, inexpergescibili somno detinentur. *Te-*
rentius in *Eunucho*.

Vibratio, siue *Agitatio*, est uiolentus alicuius cor-
poris partis motus, ut conquiescere non liceat, etiam
si strenue admodum renitaris, differens à *Tremore*,
qui nisi partem mouere uelis, non accidet, lib. de
trem. palp. cap. 6.

Vibratus pulsus, (Græcè κλῦνός) uide *Con-*
uulsus.

Victum appello, non hunc tantum, qui cibo, &
potione constat, uerum etiam qui omnibus alijs, ut
ocio, exercitatione, balneo, uenere, somno, uigilijs,
& omnibus quæ quouis modo sunt in humanis cor-
porib⁹, idest, uiuendi ratio, co. 3. in 3. de morb. uulg. 9.

Villi, uide *Fibræ*.

Vinacia sunt solide uinæ reliquie, cum in torcula-
ri succus ipsarum omnis expressus fuerit, 2. de ali-
ment. fac. 9.

Vinum

Vinum aparachyton, idest, originale, cui marina aqua non est addita, 4. de comp. med. loc. cap. 7. cui opponitur *vinum tethalassomenon*, 4. acut. 2.

Vinum vinosum, vide *Hydatodes*, & *Oenodes*.

Virtus naturalis, vide *Virtutes*.

Virtus ratrix, vide *Virtutes*.

Virtus vitalis, vide *Virtutes*.

Virtutes, (quas facultates Medici uocant, Plato animas) sunt tres illæ quæ toti corpori, ex suo quodâ veluti fonte distributæ, animal gubernant; Prior quæ uel naturalis, uel altrix, uel appetitrix, alterans, & concoquens appellatur, 2. progn. 26. ad nutriendum animal necessaria. stirpibus communis, quæ Iecur veluti pro fonte habet, canales verò ab hoc in totum corpus sparsos, ipsas venas; Altera quæ & facultas, virtus, seu anima vitalis, & animosa appellatur, quæ non modo ut stirpibus, aut vita præditis, sed etiam ut animalibus anima est insita, sedem habens in Corde, cuius canales arteriæ sunt; Posterior Ratiocinatrix in Cerebro domicilium habens, voluntarijs actionibus, unâ cum sensibus præsidens, cuius canales sunt nerui, sensum motumque in totum animal deferentes, 9. meth. 10.

Vitalis motus, vide *Motuum species*.

Vitellina bilis, quæ & lutea dicitur, vide *Bilis Pallida*.

Vitiliginum, quas *Alphos* vocant, generatio similis est generis cum eo affectu, quem *Leuce* siue *albam*

bam vitiliginem, Arabes Alboras appellant, non tamen sub ijs tota caro vitiatur, vt in Leuce, sed in summo corpore, veluti squamæ quæpiam, Vitilignes insiguntur, albæ quidem ex pituitoso, nigrae ex melancholico succo exortæ, 3. de sympt. caus. cap. 2. In Vitiligine autem alba, sit nutrimenti appositio, non assimilatio, 1. de natur. fac. cap. 11.

Vitreus oculi, vide Hyeloides, & Crystallinus. Vitreus humor à Praxagora appellat, qui vitrei nomen ipsi imposuit, pituitæ species est, frigidissimus, quippe vitro fuso, tum colore, tum substantia, haud absimilis est, 2. loc. aff. 5.

Ulcera dulcia, vide Ochthode, & Dulcia ulcera Ucleratio est ruptio circa corneam tunicam, quæ uel ex ictu, uel ex strenua phlegmone oritur, lib. finit.

Ulcus, quod Græci Elcos, uide Vnionis solutio.

Ulcus depascens, vide Phagedænas.

Ulna, vide Cubitus.

Ulmelia, idest, solimembria, est totius corporis, ex membris compago, 1. de vsup. 8.

Umbilicus nihil aliud est, quàm multitudo magnorum vasorum quæ ex multis paruis uenis, & arterijs, et propaginibus earumdem per totum Chorion dispersis, conflatur, & eo loco uniuntur, per quæ, & sanguis, & spiritus ad fætum deriuatur, in medio urinaculum habentium, lib. de dissect. vul. cap. 10.

Uncia habet dracmas octo, quæ dracmæ etiam
Holce

Holce dicuntur ; dracma habet siliquas duodeuiginti, alij dicunt scrupulos tres ; scrupulus habet obolos duos, obolus siliquas tres, lib. de pond. & mens. c. 3.

Vndosus pulsus, uide Vermiculans.

Vnguis, siue Ungula, uide Pterygium.

Vnio, uide Prosthesi.

Vnionis solutio, siue Continuitatis solutio, est morbus in quo partes, quæ secundum naturam unionem acceperunt, inter se soluuntur, lib. de const. art. cap. 6. quæ solutio si in osse fiat, dicitur Fractura, seu Catagma ; in nervosis musculorum partibus ex distentione, ruptura ; in fibris Conuulsio, seu spasma ; in carne ex vulnere incisio, ex aliquo acuto punctura, seu punctio, ex aliquo graui contusio ; ex erosione in osse, Tereodon ; in carnosis partibus, Vlcus ; in instrumentalibus et ligamentis, auulsio, siue aposthagma, ibidem. In vasis, musculisq ; ex uiolento ictu, uel graui casu, uel alio quopiam ualente motu excitata, Rhegma & Thlasma ; cum contusione & ruptione, Ecchymosis, 4. meth. 1. ab aliquo acuto occurrente, atque abscondente, Incisio, Dissectio, & Sedes, lib. de caus. morb. cap. 11.

Vniuersalis morbus, uide Communis.

Vniuoca, uide Aequiuoca.

Vocis organa uoco, per quæ spiritus redditus uox efficitur, hæc sunt aspera arteria, guttur, fauces, ueluti spiritus plectrum, per ipsas transeuntis, nam bæ uocis instrumentum sunt, ut locutionis lingua.

Vola

Vola manus nominatur, supina pars manus iuxta pollicem assurgens, Græce Thenar, cui pars opposita Hypothenar, et Subuola uocatur, 1. de usup. c. 17.

Voluntarius motus, uide Motuum species.

Voluulus, uide Ileus, & Chordapsus.

Voluulosa stomachi subuersio, uide Subuersio.

Vomica, uide Sinus.

Vomitus & nausea, expultricis facultatis uentriculi prauus motus sunt, ad ea quæ uentris corpus contristant, quàm citissime per stomachum uacuanda; Nec idem est uomitionibus et singultientibus motus, quippe in uomitionibus, ea quæ in capacitate sunt uentris reiiciuntur, in singultu quæ in ipso uentris sunt corpore, simili scilicet tum affectu, tum motu, qualis est ijs, qui ex intemperie tussunt, omnibus nimirum uentriculi partibus, quod se contristat, expellentibus, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Vrachichronius morbus est, qui breui tempore finitur, Polichronius uerò, qui longo tempore cõprehenditur, 3. dieb. decr. cap. 13.

Vrachòs, appellatur meatus, qui infantis Umbilico inseritur, ex quo enascitur, & suspensus est, qui meatus mutuo congressu quinq; uasorum absoluitur; nam à uenis quæ secundas implent, binę aliæ prodeuntes sunt uenæ, ab arterijs ibidem sitis, binę arteriæ, & à neruis unus neruus, complicati mutuo, qui Umbilicum absoluunt, lib. Introd. cap. 11. uide Umbilicus, & Vrinaculum.

Vraniscus,

Vraniscus, idest paruum celum, quod Latine palatum dicitur, pars est oris superior, à celi similitudine, nomen accipiens, lib. finit.

Vrentia, uide *Caustica*.

Vretheres, (idest *Vrinarij*) sunt meatus quidam oblongi & fortes, *Vrinarij* dicti, qui renes uesicæ committunt, ducentes per colatoria, urinas à sanguine segregatas, ad uesicam, 5. usup. 5. Qui *Vrinarij* meatus, nec arteriæ sunt, cum nec pulsent, nec duplici constant tunica, neque uenæ, quia sanguinem in se continent, nec similem omnino uenæ habent tunicam; à nervis autem plus distant, quàm à iam dictis, 1. nat. fac. cap. 6.

Vrethra, siue *Vrithra* est meatus urinae reddendæ accommodatus, qui in pene est, quem & fistulam *Vrinariam* appellant, 4. aph. 82. Est quæ cervicis uesicæ meatus, & urinae fistula, 1. loc. aff. 1. uide *Fistula urinaria*.

Vretica, uide *Diuretica*.

Vrina, quam Græci, *Vron*, uocant, est excrementum tenue, et aquosum sanguinis, 5. usup. 5. uide *Lotium*.

Vrina optima, cuius sedimen album, & laue, & æquale extiterit perpetuo tempore, usq; dum iudicatus fuerit morbus, lib. de atrab. 8.

Vrinaculum, quod Græci *Vraxon* uocant, est meatus qui ex fundo uesicæ exortus, lotium in tunicâ *Alantoidem* prægnantis mulieris derivat, quæ ita à similitudine figuræ, quam habet cum intestinis, appellatur,

latur, 15. de usup. c. 15. uide Vraxòs, et Umbilicus.

Urinarij, uide Vreteres.

Urinarius meatus, Græce οὐράχος οὐρήθρα, uide Vreteres.

Urinæ difficultas & suppressio, uide Ischuria.

Urinæ profluuium, uide Diabete.

Urinæ stillicidium, uide Iscuria, 3. aph. 16.

Urinæ substantia, uide Consistentia.

Uron, uide Urina.

Uteraria, uide Hysterica.

Uteri suffocatio, est spirationis ob uterū ablatio, quæ et Apnœa uocatur, eamdemque uterinam suffocationem, & strangulationem appellant, 5. aph. 35. & Hystericum morbum, 4. de caus. pul. 22.

Uteri Rheuma, uide Menses.

Uterus, μήτρα, Vulua, & Matrix appellatur, est ea corporis pars, quæ mulieribus ad concipiendum & pariendum, à natura est concessa, 6. loc. aff. 5.

Utricularij, uide Hyderici, & Ascites.

Vua, uide Gargareon, & Staphyle.

Vuæ, Paristhmia & Tonsillæ, nihil aliud sunt quàm inflammationes, Vuæ, quidem Gargareonis, Tonsillæ uerò adenum, eorum qui in principio faucium inter se oppositi sunt, quæadmodum Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt. Videtur autem Hippoc. non omnem Gargareonis inflammationem unam nominare, sed unam solam speciem, quæ Gargareonis terminus similis acino Vuæ est, lib. de tumor.

tumor. cap. 17. vide Staphyle, Gargareon. *Vue uinose*, quæ nullam vehementem qualitatem habent, 2. de aliment. fac. cap. 9.

Vuea oculi tunica, vide Rhagois & Cærulea.

Vuiformis, vide Rhagois & Cærulea.

Vulgaris morbus, vide Communis morbus.

Vulsio est cum fibre musculorum nimis distente rumpuntur, quæ nunc vellicatio, nunc discreptio appellatur, 3. de us. quæ in med. 30.

Vulua, vide Hystera & Uterus.

Vulua, vide Staphyle.

X

XEROPHTHALMIA, idest arida lippi-

tudo, cum anguli oculi vlcera, & asperitudinem, pruritumque contraxerunt, palpebræ rubent, & la-

crima salsa & nitrosa, ab oculis profluit, lib. Introd. cap. 15. vide Sclerophthalmi.

Xerotribia, idest sicca frictio, 8. meth. 2.

Xiphoides, vide Pectorale os, & Chartilago en-

siformis.

Xister, vide Aures.

Z

ZOOLOGIA, idest animalium generatio,

lib. de constit. art. cap. 13.

Zulapium, *Ætvari*, & alij recentiores Græci, barbara uoce, appellant id quod hodie iuleb itidem

barbaro uocabulo nuncupamus; fit è stillatitio liquo-

E e re, ant

re, aut quod rectius est, ē succis & saccharo tantum
ut ex Mēſue ſatis conſtat, licet Sepplaſiarij ab ea for-
ma compositionis, neſcio quā iure, non nihil diſceſse-
rint.

Zygoma os, ſiue Iugale eſt, quod temporis muſcu-
lo prepoſitum eſt, tranſuerſam in medio ſuturam ha-
bens, cuius poſterior pars omnis cum capitis oſſe,
quod iuxta aures eſt, anterior cum parte ſupercilij
extrema, ad paruum oculi angulum, continuatur, lib.
de oſſib. cap. 2. quod cum duplex ſit ad utramque au-
rem, ſuper foramina, per quæ facultas audiendi eſt,
emergit, lib. Introd. cap. 11. quod vulgo os paris, vo-
cant, alij iugamentum, Græce autem Ζυγάμα, ſiue
δυζωμας, quaſi coniugiale, & ex duobus coniugā-
tum, vocatur. Zymōſis Iecinoris, eſt tumor ædematoſus Iecino-
ris apud Hippocratem.



P R Æ C I P V A R I V M

*Arabicarū vocum, ad artē medicā facien-
tū, ordine alphabetico series; in qua vide-
re est, quā Arabica vox, cui Græca et La-
tina reddatur, & significato respondeat.*

<i>Arabica</i>	<i>Græca</i>	<i>Latina</i>
Abgas.	Choriōn.	Amnium tunica.
Abortus.	Amblofis.	Abortus, Deperditio.
Abrahamia.	Cacoethe.	Maligna ulcera.
Accidens.	Symptoma.	Passio, Coincicens.
Achael.	Psellotes.	Traulus, Balbus.
Achilus, Algaras.	Ægilops.	Anchilops.
Achmas.	Pedion.	Planta pedis.
Achimon.	Argemon.	Iridis oculi ulcus.
Acras, Arsarum.	Priapismus.	Tentigo.
Æthalegi.	Palmōs.	Palpitatio.
Acualis dolor.	Nitticōs.	Perforatiuus.
Adereb fluxus.	Hepaticus affectus.	Iecoris Imbecillitas.
Adiutorium.	Omoplatæ.	Humerus.
Adorem.	Raphē.	Sutura. (tiones.
Adorē corticales.	Lepidoide.	Squamosę cōglutina.
Adorem laudæ.	Lambdoide.	Sutura Occipitis.
Adorē mendosę.	Lepidoide.	Suturę iuxta aures.
Aduftiua.	Causon.	Adurens febris.
Aduftiuū, aufume.	Epicauma.	Sordidum vlcus oculi.
Afficem.	Ophthalmia.	Lippitudo.
Alabene.	Supinitas.	Succubus.
Alacaran.	Ancyroide.	Anchoralis processus.
Alachahab.	Pterne.	Calcaneus, Calx.
Alachun.	Larynx.	Asperę arterię Caput.
		Ee 2 Ala-

Arabica. A Græca. Latina. 1

Alagiagi,	Ostium hieron,	Os sacrum,
Alaiuanie,	Zodynamis,	Vitalis virtus.
Alandagi,	Anadolis, Diaphoresis, Digestio, coccostio.	
Alarbian,	sarcomata,	Polypus narium.
Alaschridem ac	Ilischi, vide infra.	
Alasceilez,	splenitica,	saluatella vena,
Ala stardad,	Apothetapia,	Recreatoria.
Alatabal,	Coryza,	Grauedo.
Alatzar,	Ectropion,	Palpebra inuersio.
Albaras alba,	Leuce, Alphas,	Morphea alba.
Albaras nigra,	Lepa,	Morphea nigra.
Albarnaber,	Carcynoma,	Cancer Narium.
Albatagin,	Carpus,	Brachiale.
Albere,	Plogastrium,	Ventris medium.
Albhear,	Dyspnæa,	Difficultas spirandi.
Alborati,	Omphalus,	Umbilicus.
Albothin,	Therminthi,	Exitura nigra.
Albugo, Pan,	Albedo, Leucoma,	Cicatrix oculi.
Alcaca,	Inion,	Occiput.
Alcahab,	Astragalus,	Talus.
Alcangiari,	Sternon,	Os pectoris.
Alcarba,	Phalacrotes,	Caluitium.
Alcusi,	Ach'ys,	Caligo oculi.
Alchab,	Astragalus,	Claucula, Talus.
Alchada,	Omoplate,	Humerus.
Alchael,	Aphonia,	Vocis caræria ex lingua.
Alchiet,	Diaphragma,	Pæcordia.
Alchalcon,	Larynx,	Guttur.
Alchama,	Choana. Pye'os,	Infundibulum, Lacuna.
Alchamar,	Amblyopia,	Cæcitas à solis intuitu.
Alchambar,	Anæa,	Amentia.
Alchàngeri,	sternon,	Eniformis cartilago.
Alchiam,	Pfoæ Ischis,	Lumbi.
Alchepectinis,	Metacarpium,	Post brachiale.
		Alcheffir,

Alcheffir,	Porus,	Meatus.
Alchei,	Ostium hieron;	Osfacium.
Alchelof,	Taraxis,	Oculi Perturbatio.
Alchirunie,	Chironia,	Vlcera rebellia.
Alchool,	Xerocollurion,	Collyrium solutum.
Alchola,	Aphtha;	Oris ulcera.
Alchola maligna,	Noma Phagedæna,	Vlcera depascentia.
Alcosbor,	Apostolis apostema,	Abfcessus.
Alcude,	Cephalæa,	Dolor Capitis diuturnus.
Alcurati,	Dysenteria,	Tormina.
Alcuze,	Tetanus,	spasmus, Convulsio.
Aldaragi,	Raphè,	sutura.
Aldebha,	Cynanche,	Angina.
Aldebul,	Marasmus,	Marcor.
Aldees,	Narche,	Ignavia, Torpor, hebetudo.
Aldeh,	Dianæa,	Mens. (de motus)
Aldemamid,	Dorhien,	Furunculus.
Aldememul,	idem ac Aldemamil,	& Aldemamir.
Alderab,	Diarrhæa,	Alui prefluuium.
Alderabe,	Vla,	Gingiva.
Alderez,	Gastir encephalos,	Ventriculus Cerebri.
Alduar,	scotoma, scotodinos,	Tenebrosa Vertigo.
Aldubellet,	idem ac Dubellet,	& Dubellati, vide infra.
Alenada,	Anadosis,	Digestio.
Alfasc,	Hypochelon elcos sinuosum vlcus,	
Alfald,	Phlebotomia,	Venefectio.
Alfase,	Hemalops,	sugillatio oculi.
A ficume,	Epicauma,	Nubes Vuæ.
Algaras,	Aggilops,	Fistula lacrimalis.
Algasamach,	Epiglottis,	superlingula.
Algeffa,	Emphisæma Pneumatosis,	Inflatio.
Algeromati,	Esthiomenon,	Herpes exadens.
Algiebar,	Mycosis,	Lusciosus affectus.
Alguama,	Cittosa, Picatio,	Appetitus deprauatus.

alguardenigi,	Ophthalmia vera,	Lippitudo vera,
alguafa,	Melancholia,	Melancholia,
alguati,	Sperma,	Semen.
alhad,	Tenō, aponeurosis,	Tendo, Eneruatio.
alhadel,	Paraphrosyne,	Delirium.
alhadani,	Parosis, Cheras,	Struma, Abscessus iuxta
alhaduth,	Copros gonorrhæa,	Spermatica egestio.
alhael,	Adenes,	Emunctoria, Glādule.
alhagiagi,	Ostium hyeron,	Os sacrum.
alhagan,	Perinaeon, femēn,	Interfœminum.
alhaliben,	Adenes,	Inguina, emunctoria.
alhamear,	Paraphrosyne,	Infania, Fatuitas.
alhasad,	Anchōn,	Cubitus.
alhasos,	Coccyx,	Cauda.
alhasis,	Ostium hyeron,	Os sacrum, latū, ma-
alhasi,	Eularcon,	Quadratum corpus.
alheame,	Phlebs metopon,	Vena frontis.
alheasme,	Epieisma,	Fractura Cranei.
alhuntor,	Botrya,	Alveoli dentium.
alices,	Scordinema,	Pandiculatio.
allicod,	Proptosis,	Oculi procidentia.
alintifar,	Mydriasis,	Vuez dilatatio.
alifema,	Coryphe,	Vertex Capitis.
allebe,	Sphagē,	Iugulum.
allui,	Cynicus spasmus,	Canina convulsio.
almabad,	Phlebs ancilis,	Vena Poplitis.
almachade,	Hedra, archus,	Anus, sedes.
almachein,	Ranteres,	Anguli maiores oculi.
almadiam,	idem ac almabad, & almadab.	
almadid,	Phlebs,	Vena.
almagabin,	Adenes,	Emunctoria.
almagiat,	Proptosis,	Procidentia.
almaxaben,	Maschalis,	Axilla.
almecheni,	Canthus,	Angulus oculi.
		Alme-

Almeliletu, oñes	Epifemafia, amñs	Annotatio febris.
Aimeneumiat, ides	Narcotica, amñs	Sônifera, stupefaciētia
Almenhenein, ides	Pfoa, amñs	Lumborum Caro.
Almerfegi, amñs	Rhagoidis proptosis, amñs	Vuez prociēdētia.
Almies, amñs	Cathocus, Catholepis, Deprehētio, Aliena	
Almefemar, amñs	Porus, Helos, amñs	Callus, Clauus, Cicio.
Almefar, amñs	Phoxos, amñs	Acuminatum caput.
Almefere, amñs	Erysipelas, amñs	Vicinirubriam.
Almetacargie, amñs	Myefa, amñs	Mucor.
Almirach, amñs	Mys, amñs	Musculus.
Almefmar, amñs	Elos, amñs	Clauus.
Almochati, amñs	Pericranion, amñs	Pericranium.
Alnefeme, amñs	Psychidynamis, amñs	Animalis Virtus.
Alnisuchat, amñs	Errhyna, amñs	Caput purgia.
Alofos, amñs	Lordosis, amñs	Luxatio.
Alofos, amñs	Coccyx, amñs	Cauda.
Alrabio, amñs	Asthma, amñs	Anhelatio.
Alrad, amñs	Sarcotrafma, amñs	Carnis vulnus.
Alrahune, amñs	Paraphrosyne, amñs	Delirium.
Alrafafe, amñs	Epigonatis, amñs	Patella.
Alraute, amñs	Pterygia, amñs	Ala, Pinnula, narium.
Alrosbot, amñs	Porus sarcoticus, amñs	Porus Carneus.
Alruicy, amñs	Paracme, amñs	Declinatio.
Alfabiar, amñs	Comatosa, amñs	Sônifera opiata.
Alfaguaid, amñs	Embryon, amñs	Fetus.
Alfahad, amñs	Pechys, amñs	Vina, Cubitus.
Alfahafati, idem ac Sahafati, vide infra.		
Alfaim, amñs	Nestes entheron, amñs	Ieiunum intestinum.
Alfamach, amñs	Typhlon Ecesma, amñs	Cecum foramen.
Alfamach, amñs	Orys, amñs	Auris.
Alfaria, amñs	Epilepsia, amñs	Morbus Comitialis.
Alfarnach, amñs	Hydatis vesica, amñs	Aquula.
Alfatere, amñs	Ancyloblefaron, amñs	Palpebrarū coherētia.
Aliebat, amñs	Caroides, amñs	Soporarius, Apoplecticus.
Alfeda, amñs		

Alfeda,	Θάλασσα	Thlasma,	Contusio.
Alfedar,	Σκωτία	Scotomia,	Tenebriofitas.
Alfeedic,	Μελίκερις	Meliceris,	Melleus abiceffus.
Alfedid,	Βράχιον	Brachion,	Brachium.
Alfelac,	Σκληρία	Sclerias,	Palpebrarum durities
Alferiaran,	Καθάρτικον	Catharticum,	Purgans.
Alshara,	Εpileψία	Epilepsia,	Comitialis morbus.
Alshaurat,	Ερρύνη	Errhyna,	Caput purgia.
Alshela,	Γάνγλια	Ganglia,	Contractiones.
Alshalie,	Ηγεμονική	Hegemonica,	Rectrix Virtus animæ.
Alstrengi,	Κέρειον	Cerion,	Fauus.
Alsurbed,	Φλέβη υπογλωττίς	Phlebs hypoglottis,	Vena sublingua.
Altarfat,	Υποσφάγμα	Hyposphagma,	Cruenta suffusio.
Alteneter,	Διάφνωξ	Diaphnoë,	Transpiratio.
Alterbet,	Καχεξία	Cachexia,	Prauus habitus.
Altharas,	Βάρυκοια	Barycoia,	Obauditus.
Althaun,	Φυγέθλον	Phygethlon,	Apostema pestilens.
Altheca,	Τράυλος	Traulus,	Balbus.
Althoin,	Βύβο	Bubo,	Abiceffus pestilens.
Althumar,	ὸ αὐτὸς ὡς Ἀλχάμαρ	Alchamar,	
Althute,	Ἡμorrhoids	Hemorrhoids,	Morus sedis.
Altualil,	Ἀχρόχρδον	Achrochordon,	Verruca.
Aluardengi,	Χυμώσις	Chymosis,	Palpebræ distortio.
Aludi,	Γονόρροια	Gonorrhea,	Seminis fluxus.
Aluebe,	Πάλμος	Palmos,	Palpitatio.
Alunum,	Βότρυον	Botryon,	Vlcus cauum oculi.
Alureschip,	Εξανθημάτα	Exanthemata,	Pustule.
Alufuas,	Πάσανα	Pasana,	Dementia.
Alzamane,	Παράλυσις	Paralysis,	Resolutio neruorū, molli-
Ancha,	Μέρος	Meros,	Femur, Crus.
Anulus,	Λάρυγξ	Larynx,	Asperæ arteriæ caput.
Anulus,	Βότρυον	Botryon,	Fossula.
Aqua descendēs,	ὑποχύμα	Hypochyma,	Suffusio.
Aqua Cranei,	ὑδροκεφάλον	Hydrocephalon,	Aqua Capitis.

Arcuatio,	Repanditas,	Luxatio postica uerte-
Arefatu,	Epigonatis,	Patella, Genu. (bratū.
Arfatum,	Priapysmus,	Tétigo, Penis rigidus.
Arteria Orithi,	Aorta,	Magna, Crassa.
Arteria Arulidi,	Læuis,	Arteria venalis.
Arteriæ subnecti,	Carotides,	Soporariæ.
Arterica,	Arthritis,	Articularis morbus.
Aschachilos,	Sphacelum,	Membrū demortuū.
Ascham.	Pathos, Pathema,	Passio.
Asef,	Hydroon,	Sudamen.
Aseid,	Pechys,	Cubitus, Vlna.
Afelha,	Oedema,	Tumor laxus.
Afellata vena,	Maschalæa,	Axillaris vena.
Asestra,	Ectropion,	Palpebræ inuertio.
Atanatum,	Bubon, Læmon,	Abscessus pestilens.
Atafus,	Pneumatosis,	Inflatio,
Athacarugi,	Myfca,	Mucor.
Atherael.	Apostema,	Abscessus.
Aurés muris,	Myotis,	Scissura Vnguium.
Balchee,	Telephion elcos,	Vlcus Telephium.
Balchie,	Psydrachia,	Pustulæ Capitis.
Bancharas,	Pâcreō, Calicreō,	Carō glandulosa.
Baras,	Pforonychia,	Scabrities Vnguium.
Barbati,	Oscheon,	Scrotum, Bursa testiu.
Barachien,	Bubon læmos,	Apostema pestilens.
Basilare os,	Sphenois, Polimorphú,	Os palati.
Bathara;	Anthrax pestilens,	Carbo, vlc ⁹ escharosū
Baurach,	Aphronitrum,	Salnitrum.
Bear,	Dyspnæa,	Difficultas spirandi,
Beditus,	Strumē Cherades,	Scrofulæ.
Benat noctis,	Epinyctis,	Nocturna effloratio.
Beriteron,	Peritonæon,	Peritonæos tunica,
Besbeia,	Polypus, Sarcoma,	Caro multipes nariū.
Betaram,	Encope,	Incisio.

*Arabica.**Græca.**Latina.*

Bezahartica,	Alexipharmaca,	Ad venena pharmaca
Bezel,	Parachentesis,	Punctio, Perforatio.
Biles,	Allantoide,	Intestinalis tunica.
Birsen,	Pleuritis,	Lateralis dolor.
Bolismos,	Bulismos,	Ingens esuritio.
Bothor,	Bothor,	Pustula.
Bothor,	Synchyfes,	Exitura oculi.
Brachium,	Brachion,	Brachium.
Buri,	Sarcocele,	Carnosa hernia.
Cadar,	Hemiplexia,	Dimidij corporis re-
Cafacan,	Cardia,	Cor. (solutio.
Calcataron,	Pterygium,	Vngula Oculi.
Callus,	Helos,	Clauus.
Caluitium,	Phalacrofis,	Capillorum casus.
Camaduci,	Inion,	Occiput, Occipitium.
Cambium,	Chymus,	Sanguis, seu humor.
Camisia foetus,	Allantoides,	Intestinalis tunica.
Canalis,	Porus,	Meatus,
Cancrena,	Gagrena, Necrosis, Gangrena.	
Canna Pulmonis,	Trachea arteria,	Aspera arteria.
Cannæ Tibiæ;	Ocrea, Sura,	Ossa duo Tibiæ.
Capsula Cordis;	Pericardium,	Cordis Inuolucrum.
Caras,	Aphonia, Traulus,	Vox depdita, depraua
Caratin,	Gysenteron,	Lubrici terrestres. (ta.
Carabitus,	Phrenitis,	Delirium febriens.
Carenum,	Sapa, Sireon,	Mustum coctum.
Carmata,	Bubon,	Glandularū abfcessus.
Caro addita,	Hyperfarcosis,	Thymus.
Cassum,	Thorax,	Pectus.
Cataraça,	Hypochyma,	Suffusio.
Catalan,	Encope,	Incisio.
Chadessan,	Derefte,	Excoriare.
Chahab,	Astragalus,	Talus.
Chalahan,	Ecfarthrema,	Luxatio.

Chasem,	Ozanz,	Narium vlcera.
Chatrab,	Lycanthropia,	Lupina infania.
Chede,	Anorexia,	Inappetentia.
Chesaram,	Catagma,	Ossium fractura.
Chila,	Cirfos,	Hernia.
Chis, Saccus,	Cystis,	Vesica.
Chis hordei,	Ptisana,	Cremor hordei.
Cholera,	Chole,	Bilis.
Colera citrina,	Picrocholos chymos,	Bilis pallida.
Cholera vitellina,	Chole lechita,	Bilis Vitellina.
Cholera famosa,	chole Notha,	Bilis spuria.
Cholera min fame,	chole melæna,	Bilis adusta.
Cholera rubea,	Picrocholos chymos,	Bilis amara.
Cholera nigra,	chole melæna,	Bilis atra.
Cholirica passio,	cholera,	Bilaris.
Chranites,	Brenitis,	Phrenitis.
Chuba,	Lychen, Lepra,	Impetigo.
Chuzez,	Tetanus,	Tensio. (Iago.)
Clipealis cartilago,	Chodro Thyroides,	Scutiformis cartilago.
Cimbalaris,	ericoides,	coopectoria cartilago.
Cohol,	colluriõn.	collyrium fufum.
Colcõtar,	calcitis,	Vitrioli species.
Complexio,	crasis, Symmetria,	Temperies.
Conach,	Apnæa Hyfteros,	Vteri præfocatio.
Congelatio,	Catalepsis,	Deprehensio.
Congelatio dētiũ,	Æmodia,	Stupor dentium.
Confimilia,	Homogenea,	Similares partes.
Contorfio,	Scoliolis,	Obftipitas.
Conturbatio,	Taraxis,	Vellicatio oculi.
Conuulfio canina,	Spasmus Cynicus,	Distorfio faciei.
Coronale,	Argemõ, Lencoma,	Albugo oculi.
Corruptio offis,	Teredon.	Offis Caries.
Cortex intēftini,	Æphelcis, Ramētũ,	Intēftini tunica.
Crus,	Cneme,	Tibia,

Cutubuth,	Lycanthropia,	Lupina insania.
Coxa,	Meros,	Femur, Crus.
Darb, Darab,	Diarrhæa,	Alui profluuium,
Debus,	Marasmus,	Tabes.
Demonium,	Mania,	Furor.
Dentes Atham,	Gomphij,	Molares, Sapientiæ.
Derezi,	Raphè,	Commiffura, Sutura.
Diaciminum,	Diaspoleticum,	Ex cumino Pharmacû
Dipsacos,	Diabete,	Vrinæ profluuium.
Dislocatio,	Lordosis, Luxatio,	Exarticulatio.
Disnia,	Dyspnœa,	Difficultas respiratio.
Domestica pars,	Maschaliza,	Interna. (nis.
Dubellati,	Phlegmon,	Abscessus calidus.
Dura mater,	Meninx crassa,	Cuticularis tunica.
Durities,	Scirrhus,	Abscessus durus.
Embroce,	Balanion,	Balneum.
Empialos,	Hepiala,	Febris Epialus.
Emulgentes,	Emulgentes,	Percolantes venæ.
Emunctoria,	Adenes,	Glandulæ.
Encaras,	Phlebs Meseræi,	Vena miseraica,
Endros,	Epidydymis,	Supp geminalis tunica.
Eneruatio,	Paralysis,	Resolutio.
Epittima,	Epithemata,	Linimenta.
Effere,	Epinyctis,	Effulgescentia.
Effere cholerici,	Phlegmō, Phlogosis,	Inflammatiō.
Esticos febris,	Hæctica,	Habitualis, Facta.
Exitura,	Apostema,	Abscessus purulentus.
Expressio oculi,	Proptosis,	Vuæ prolapsus.
Fagdan,	Loidosis,	Spinæ luxatio.
Fames vaccina,	Bulimos,	Vehemens esuritio.
Faricon,	Causon,	Febris ardens.
Fasclan,	Apocope,	Abscissio.
Febris triagulata,	Tetartæos,	Quartana.
Fedehan,	Hernia, Ramez,	Ruptura.

Ferismus,	Priapismus,	Tentigo.
Feterat,	Paracme,	Remissio morbi.
Fister musculus,	Sfincter,	Constrictor.
Filachaliafuch,	Stephanizæ,	Sutura Coronalis.
Fechan,	Diafremma,	Luxatio.
Fiffura,	Rhogme,	Rima.
Focilia duo,	Cerchis, Pechys,	Radius, Cubitus.
Fœdion,	Epilepsia,	Puerilis morbus.
Formica,	Myrmecia,	Sessilis Verruca,
Formica,	Herpes miliaris,	Serpigo.
Formicalis,	Myocephalon,	Muscæ caput.
Foflula,	Botryon,	Vlcus cauum Corneæ.
Franites,	Phrenitis,	Cum febre delirium.
Fricatio,	Anatripsis,	Fricatio,
Furcula,	Clis,	Clauis, Iugulum.
Furfures,	Pythiriasis,	Porriigo.
Fugule, Fulille,	Parotis,	Ad aures morbus.
Furfus,	Nympha,	Colliculus.
Gadu,	Scirrhus,	Tumor durus indolens.
Galea, Ouum,	Cephalæa,	Diurn' capitis dolor.
Garab, Algaras,	Ægilops,	Vlcus anguli oculi.
Gafi,	Syncopis,	Præceps viriû lapsus.
Gauonij,	Paristhmia,	Tonsillæ, Amygdalæ.
Gedaul,	Mefarzon,	Mefenterium, Lactes.
Geleniabin,	Diarhodomel,	Ex rosa & melle, gelu.
Genu;	Gony,	Os Tibiæ, Genu.
Gefla palpebræ,	Scerophthalmia,	Scabrities palpebrarû.
Gibbofitas,	Cyllofis,	Diftorfio.
Gienun,	Mânia,	Furor,
Gingia mater,	Pericranium,	Pericranium.
Glandulæ,	Ganglia,	Contractiones.
Grando oculi,	Chalaziô, Pofthie,	Hordeolus.
Guesques,	Melancholia,	Fatuitas,
Guidez venæ,	Sphagitides,	Apopleticæ, Iugulâres
		Gurra

Arabice.

Græcæ.

Latine.

Gutta serena,	Amaurosis,	Visus obscuritas.
Haben,	Hydrops,	Aqua inter cutem.
Hacar,	Apostema,	Ulcus, siue abscessus.
Hacuna,	Satyriasis,	Tentigo, Penis tensus.
Halmes,	Paraphrosyne,	Delirium.
Hamcha,	Anæa,	Dementia.
Hamicha,	Lata exanthemata,	Variolæ.
Hasef,	Hidroa,	Sudamina.
Hazam,	Encope,	Incisio.
Hedian,	Moria, Morosis,	Desipientia.
Henadam,	Pepha,	Concoctio.
Hesme,	Aposphagma,	Auulsio.
Hirque oculorum,	Canthus,	Anguli Oculi.
Humor,	Chymus,	Humor.
Iafuc,	Bregma,	Sinciput.
Iestigatio,	Palmos,	Palpitatio, Saltus.
Iezemet,	Catalepsis, Caros,	Deprehensio.
Iber, Subeth,	Coma,	Sopor.
Ignis persicus,	Anthrax,	Carbo, Carbunculus.
Ilischi,	Eroticos,	Effrænis amor.
Impetigo,	Lychen, Lepra,	Sassa cutis asperitas.
Impetigo aspera,	Lychenes,	Tensa prurigo,
Incubus,	Ephialtes,	Nocturna suffocatio.
Inuerfa palpebra,	Lagophthalmos,	Leporinus oculus.
Inuiscatio palpebre,	Ancyloblepharō,	Palpebrarū cōiunctia.
Inuolutus,	Allatoides, choriō,	Vrinaculū, Secunda.
Irimbre,	Craſis,	Tēperies, assimilatio.
Iuleb,	Hydrorhodomel,	Ex rosacea et saccharo.
Iuncus,	Ionthos,	Varus.
Kef,	Xir,	Manus.
Kers,	Stomachus,	Ventriculus.
Kili Vena,	Hepatitis,	Caua uena.
Lacertus,	Myr,	Musculus.
Lachar,	Encope,	Incisio.

Lapi.

Lapidofitas oculi,	Tylofis,	Callus palpebrarum.
Latica febris,	Cathemerina,	Quotidiana, cōtinua.
Lauda,	Oshyoides,	Os gutturis.
Laxatie,	Paralyfis,	Resolutio.
Lactea,	Galaxi,	Lactes.
Lentigo,	Exuccatio,	Sugillata.
Lepores nasi,	Mycteres, Pterygiō,	Alc. Pinnulæ narium.
Leucam,	Lepra,	Lepra.
Lilimie,	Coeloma,	pfund ⁹ oculi abscess ⁹ .
Lipiria febris,	Lyparia,	Lyparia. (uus.
Loch,	Apophlegmatismus,	Pituitę p os educti-
Longaon,	Apefthylmenon,	Rectum intestinum.
Luluma,	Cælomata,	Vlcera caua Vuæ.
Lythargirium,	Molybdæna,	Plūbago, limatura plūbi.
Macula oculi,	Hypophthalmiō	Hyposphagma, Sugillatio.
Malum granatum,	Xiphoide,	Ospectoris.
Manuale opus,	Chirurgicon,	Manuum opera.
Maram,	Alimma,	Vnguentum.
Masera,	Phlegmon micis,	Leue inflammen.
Masticatorium,	Eclegma,	Pituitę eductu ² p os.
Mater puerorum,	Epilepsia,	Comitialis morbus.
Mater sanguinis,	Aneurisma,	Arterialis sāguinis fluor.
Maudana,	Catapotia,	Pilulæ.
Melon,	Pepon,	Anguria.
Melon Indus,	Melopepones,	Anguria viridis rotūda.
Men,	Drosomeli,	Manna. (pulsus.
Men Giezer,	Systole Diastole,	Contractio, dilatatio.
Menstruus sanguis,	Caraminion,	Menses.
Meri,	Oesophagus,	Gula.
Metachlach,	Tolerà,	Turbida vrina.
Metenen,	Psoa,	Caro lumborum.
Mirach,	Epygastrium,	Abdomen.
Mirachia,	Hypochondriacus,	Flatuosus morbus.
Mollificatio,	Paralyfis,	Resolutio.
		Morphea.

Arabice.

Greece.

Latine.

Morphea,	Alphos, Leuce,	Vitiligo.
Morum,	Condylomata,	Extuberatio ani.
Mucla,	Derma,	Cutis.
Munfis,	Ecpyesmos,	Totius oculi prolapsus.
Muzum,	Muzum,	Auster ⁹ sapor, uel acer.
Nascentia,	Apostema,	Exitura. (bus.
Nauculare os,	Scaphoides,	Nauiforme os.
Nebith.	Oenon,	Vinum.
Nerdi os,	Astragalus,	Talus, Os ballistæ.
Nerualis Sutura,	Obolicea,	Sagittalis, Recta.
Monoculum,	Typhlôn,	Cæcum intestinum.
Morbilli,	Exâthemata sublimia,	Pustulæ elatæ.
Nocra,	Phlebs,	Vena.
Nodus,	Atheran,	Atheroma.
Nubes,	Hypochyma,	Suffusio, Cataracta.
Nucha,	Notygon myelon,	Spinalis medulla.
Nyctalopa,	Nyctalope,	Nocturna cæcitas.
Oculi egressio,	Ecpyesmos,	Totius oculi prolapsus.
Oculus poplitis,	Epigonaris, Myle,	Patella, Rotula, Genu.
Oculi profunditas,	Atrophia,	Nutritionis defectus.
Oculi vlc ⁹ serpès,	Anthracosis.	Carbunculus.
Officialia mēbra,	Organica,	Instrumentalia.
Opium,	Meconium,	Succus papaueris.
Oregmon,	Catarrhus,	Destillatio.
Os Cruris,	Gony,	Genu.
Os Cunei,	Sphenois,	Basilare, Palati.
Os latū, Alchatim,	Coxa,	Femur.
Os laudæ,	Pharyngetron,	Os Gutturis,
Os Nerdi.	Cyboides,	Cubiforme.
Os Paris;	Zygoma,	Os Iugale, Os téporū.
Os Pedis,	Pedion,	Planta pedis, Pecten.
Ossa Shemie,	Lithoidea,	Lapidea, Petrosa.
Oseum,	Scrotum,	Testium Inuolucrum.
Osei mollificatio,	Rhacosis,	Detritio, Scroti extensio.
		Ouum,

Ouum, *ovon* Ceph'æa, Dolor Capitis diuturnus.
 Panaritium, *panon* Paronychia, *panon* Reduaja.
 Pannus idem, *panon* Lentigo, Nigror, Liuor, Nigritia.
 Paria, *paron* Tonos, *paron* Nervus.
 Pars domestica, *paron* Oechion meros, Interior.
 Pars sequestris, *paron* Exothen meros, Exterior. (respōdes.
 Proportionalis, *paron* Symbolicus morbus, Naturæ, loco tēporis.
 Pecten alchēf, *paron* Metacarpium, *paron* Postbrachiale.
 Peliomata, *paron* Exuccatio, *paron* Liuor.
 Peltalis chartilago, Thyroides, *paron* Scutiformis.
 Periodica febris, *paron* Typica, *paron* Intermittens.
 Phitanos febris, *paron* Palymbola, *paron* Reversua, erratica.
 Phlebotomia, *paron* Phlebotomia, *paron* Venæ sectio.
 Pia mater, *paron* Choroides, *paron* Meninx tenuis.
 Pixis, *paron* Schias, *paron* Coxa.
 Plaga, *paron* Ulcus, *paron* Effusio, *paron* Vulnus.
 Plancta noctis, *paron* Epinyctis, *paron* Nocturnæ efflorescences.
 Porrina, *paron* Porracea, *paron* Porracea bilis.
 Portinarium, *paron* Pyloron, *paron* Janitor.
 Pruna, *paron* Anthrax, *paron* Carbo.
 Pupillæ cōstrictio, *paron* Ptisis oculi, *paron* Tabes oculi.
 Quindege venæ, *paron* Sphagitides, *paron* Apoplecticæ, Iugulares.
 Radani, *paron* Thlasma, *paron* Contusio, Attritio.
 Radicalia mēbra, *paron* Spermatica, *paron* Seminalia.
 Ragamia, *paron* Rhogme, *paron* Fissura.
 Rahaf, *paron* Hemorrhoids nariū, Fluxus sanguinis nariū.
 Ranula, *paron* Sardoia, *paron* Ranunculus.
 Ras, *paron* Cephalus, *paron* Supernus venter.
 Rascetta, *paron* Carpūs, *paron* Brachiale.
 Rasga, *paron* Epigonatis, *paron* Patella.
 Ravedseni, *paron* Rhabbarbarum, *paron* Rhabbarbarum.
 Renalis dolor, *paron* Nephriticus, *paron* Renum dolor.
 Resudatio, *paron* Hidroa, *paron* Sudamina.
 Rere mirabile, *paron* Plegma dictyoides, Plexus retiformis.
 Rhau.

Rhaune,	Anza,	Amentia, Dementia.
Rhia alfabiam,	Hydrocephalon,	Aqua Capitis.
Rig I,	Merds,	Femur Crus.
Rha alfabiam,	Epilepia,	Comitialis morbus.
Rob,	Opbs,	Succ ^o seipso coctus scs.
Rorani Corui,	Coracoides,	Colnicularis, pcellus.
Rorap,	Epigonatis,	Patella, Genu.
Ruptura,	Ce,	Ramex, Hernia.
Ruptura Cornex,	Proptosis,	Oculi prolapsus.
Saccus,	Catalepis,	Deprehensio.
Sacculos,	Cephalalgia,	Capitis dolor.
Sachai,	Inflis,	Scissura.
Sadacham,	Infilasma,	Contusio.
Sagittalis,	Obolicea,	Recta Sutura.
Sahafati,	Achores,	Vlcus capitis manans.
Sahara,	Pannychides,	Peruigiliu nocturnu.
Saltus,	Dalids,	Palpitatio.
Sagnis mortuus,	Exuccatio,	Sugillata.
Sanies in siphac,	Hypopyon,	Pus Cornex.
Sanies vngularis,	Onyx,	Vnguis oculi.
Sauch,	Pisana,	Cremor hordei.
Sauthar,	Cephalalgia,	Caput purgia.
Scabies oculi,	Trachoma,	Puritus oculi.
Scarificatio,	Encharaxis,	Cutis incisio.
Sce len vena,	Splenitica,	Saluatella.
Sciatica, seu dolor,	Coxendix,	Ischias, Coxendicu morbus.
Scleriosis,	Scleriosis,	Tumor dur ^o palpebre.
Scotomia,	Scotodinos,	Tenebriosa Vertigo.
Scrofule,	Cherades,	Stumx.
Sebel,	Enchanris,	Rhas, Inangularis.
Secania bin,	Oxyzacchara,	Syrupus acetosus.
Secundina,	Chorion,	Secundatio.
Secundina tunica,	Choroides,	Meninx tenuis.
Sedar,	Cataphora,	Somnolentia.

Sedere,	ἵκναι	Scotoma,	ὀφθαλμική	Verigo,	ἰσχυρὸς
Sehagian,	ἰσχυρὸς	Trauma,	ἰσχυρὸς	Vulnus,	ἰσχυρὸς
Selasene,	ὀφθαλμική	Acantha,	ἰσχυρὸς	Spina apex,	ἰσχυρὸς
Sephros,	ἰσχυρὸς	Carcynos,	ἰσχυρὸς	Cancris species,	ἰσχυρὸς
Serach,	ἰσχυρὸς	Emphraxis pylori,	ἰσχυρὸς	Obstructio pyloroni,	ἰσχυρὸς
Serapif,	ἰσχυρὸς	Hypochondria,	ἰσχυρὸς	Præcordia,	ἰσχυρὸς
Sibarey,	ἰσχυρὸς	Mania,	ἰσχυρὸς	Furor,	ἰσχυρὸς
Sieff,	ἰσχυρὸς	Hygrocolluria,	ἰσχυρὸς	Arida Collyria,	ἰσχυρὸς
Silac,	ἰσχυρὸς	Tifosis,	ἰσχυρὸς	Depilatio palpebrarum,	ἰσχυρὸς
Siphac,	ἰσχυρὸς	Peritonæon,	ἰσχυρὸς	Peritonæos tunica,	ἰσχυρὸς
Sirsen calidum,	ἰσχυρὸς	Phrenitis,	ἰσχυρὸς	Phrenitis æque,	ἰσχυρὸς
Sirsen frigidum,	ἰσχυρὸς	Lethargus,	ἰσχυρὸς	Lethargus æque,	ἰσχυρὸς
Siracoft,	ἰσχυρὸς	Manna,	ἰσχυρὸς	Manna,	ἰσχυρὸς
Sisamina ossa,	ἰσχυρὸς	Sesamoidea,	ἰσχυρὸς	Sesamidea,	ἰσχυρὸς
Sochos,	ἰσχυρὸς	Catalepis,	ἰσχυρὸς	Catoche,	ἰσχυρὸς
Soda,	ἰσχυρὸς	Cephalæa,	ἰσχυρὸς	Dolor Capitis,	ἰσχυρὸς
Soram,	ἰσχυρὸς	Catalepis,	ἰσχυρὸς	Deprehensio,	ἰσχυρὸς
Sofati,	ἰσχυρὸς	Plêdritis,	ἰσχυρὸς	Lateralis dolor,	ἰσχυρὸς
Spasmus humidus,	ἰσχυρὸς	Notiodes,	ἰσχυρὸς	Ex repletionem,	ἰσχυρὸς
Spasmus siccus,	ἰσχυρὸς	Xifotes,	ἰσχυρὸς	Ex inanitionem,	ἰσχυρὸς
Spatula,	ἰσχυρὸς	Homoplatæ,	ἰσχυρὸς	Scapulæ,	ἰσχυρὸς
Spatularis,	ἰσχυρὸς	Omiza vena,	ἰσχυρὸς	Humeralis vena,	ἰσχυρὸς
Spina,	ἰσχυρὸς	Phlegmôn cutis,	ἰσχυρὸς	It flammen cutis,	ἰσχυρὸς
Spondylus,	ἰσχυρὸς	Spondylos,	ἰσχυρὸς	Vertebra,	ἰσχυρὸς
Stoliditas,	ἰσχυρὸς	Paraphrosyne,	ἰσχυρὸς	Delirium,	ἰσχυρὸς
Strabrofitas,	ἰσχυρὸς	Illofis,	ἰσχυρὸς	Strabismus,	ἰσχυρὸς
Suber,	ἰσχυρὸς	Caros,	ἰσχυρὸς	Coma,	ἰσχυρὸς
Subetica venæ,	ἰσχυρὸς	Carotides,	ἰσχυρὸς	Soporariæ Arteriales,	ἰσχυρὸς
Suber Alfari,	ἰσχυρὸς	Coma ahypnon,	ἰσχυρὸς	Coma vigl,	ἰσχυρὸς
Suffus,	ἰσχυρὸς	Couis,	ἰσχυρὸς	Pulvis,	ἰσχυρὸς
Suffumigia,	ἰσχυρὸς	Thymiamata,	ἰσχυρὸς	Suffitus,	ἰσχυρὸς
Sura,	ἰσχυρὸς	Omphalos,	ἰσχυρὸς	Umbilicus,	ἰσχυρὸς
Sycodei,	ἰσχυρὸς	Cylos,	ἰσχυρὸς	Exuberatio faciei,	ἰσχυρὸς
Syncopalis humoresa,	ἰσχυρὸς	Chymosa,	ἰσχυρὸς	Ex crudum humore febris	ἰσχυρὸς

Syncopalis minuta,	Lepton Pyreton,	Extenui humore febris.
Tabulos,	Lypparia febris,	Febris inæqualis.
Tarax,	Comphosis,	Surditas, Obauditus.
Taraxis,	Ophthalmia notha,	Conturbatio oculi.
Tarfari,	Hyposphagma,	Cruenta suffusio.
Tarfus,	Comphosis,	Surditas.
Tebegi,	Emphysema,	Palpebræ inflatio.
Tebiegi,	Cachexia,	Præus corporis habitus.
Telha,	Sapa, Sirxon,	Mustum coctum.
Temor,	Hypogastera,	Ventris concauitas.
Tenur corporis,	Hypogastrium,	Abdomen.
Teienabin,	Manna,	Mannæ species.
Tharuca,	Trochanter,	Tuberculum femoris.
Tharcamatica,	Trachomatica,	Detergentia.
Thau,	Ganglia,	Glandulosi affectus.
Theca,	Cranion,	Caluaria.
Thoeban,	Parachentesis,	Perforatio.
Tinea,	Achores,	Maniæ ulcera capitis.
Tinnitus aurium,	Ichos, Syrismos,	Sibilus aurium.
Traulus,	Pfellotes,	Balbuties.
Trehel,	Oedema,	Tumor laxus.
Triangula,	Tetartzos,	Quartana febris.
Tyria,	Alopecia, Ophiasis,	Defluuium capillorum.
Vachzi,	Nygma,	Punctura nervi.
Vacillatio,	Taraxis,	Spuria lippitudo.
Varices,	Cirfos,	Dilatatae venæ.
Variolæ,	Exanthemata lata,	Efflorescences.
Vena almabat,	Ancyle,	Poplitis vena.
Vena algebein,	Metopon,	Frontis vena.
Vena alhaleb,	Porus Vreter,	Meatus Vrinarius.
Vena Medeni,	Dracontion,	Dracunculus.
Vena Curuaturæ,	Ancyle,	Poplitis vena.
Vena Funis brachij Basilica,		Iecorariæ ramus.
Vena subeticæ,	Carotides,	Soporariæ.

Arabice.

Græcæ.

Latine.

Venzemulgentes,	Emulgentes,	Colatoriz.
Venter,	Epygaltrion,	Abdomen, fumen.
Ventosa,	sicya,	Cucurbitula.
Verruca,	Achrochordon;	Verruca.
Vesicæ,	Phyctenæ,	Pustulæ.
Vgane,	Gnathus,	Gena.
Virga,	Ædeon, Caulon,	Coles, Penis.
Viriditas oculi,	Glaucoma,	Glaucedo oculi.
Vndimia,	Oedema,	Tumor laxus.
Vngula oculi,	Pterygion,	Ala oculi, Vnguis oculi.
Vfago,	Lichyn,	Impetigo,
Vuario,	Staphyloma	Vucæ oculi egressus.
Zaara,	Agrypnia,	Morbosa vigilia.
Zachema,	Catarrhus.	Destillatio.
Zemane,	Para'yfis,	Resolutio.
Zinaria,	Iode Cholos,	Æruginosa bilis.
Zirbus,	Epiploon, Epiplun,	Omentum.
Zuccarū tabarzet,	Als Indicòs,	Saccarum album.

F I N I S.

Errores in impressione commissos, si qui sunt parui ponderis, quique dum liber percurritur, etiam modice erudito viro patent, consulto dimittimus. Id vñum silentio prætereundum non est, fol. 79. vltima linea absoluta antequam sequens folium voluatur, desiderari hæc verba, idest repanditas, in latus Scoliosis, idest obstipitas, 3. de art. 2.

Quin & sequenti folio 80. desideratur primum illius pagellæ initium, quod in fronte, erat inscribendum, illud autem est hæc vox, Chyris, quam continenter sequuntur illa verba, idest sicca frictio.

Ad hæc fol. 428. lin. 14. legitur, Vlceratio est ruptio, lege Vlceratio oculi est ruptio.

Arabic. Greek. Latin.

Venemulgentes, Emulgentes, Colatonic.
 Venet, Ap, gallion, Abdomen, lumen.
 Venet, vica, Cucubulus.
 Venet, Achthorodon, Venet.
 Venet, In yfene, Venet.
 Venet, Gallus, Venet.
 Venet, Edgon, Galton, Cois, Penn.
 Venet, Glancom, Glacodoe.
 Venet, Odcom, Tumorlaxus.
 Venet, Vag, Vag.
 Venet, Vag, Vag.

Series Cartarum.

a ABCDEFGHIKLMNOPQRST
 VXYZ Aa Bb Cc Dd Ee.

Omnes sunt quaterniones, excepto Ee, sexterniones.

M E S S A N A,
 Ex Typographia Petri Brex. 1598.






Beate Carolinæ

DE CHIRI MNOPORST
A M N C M E

Compositum est in typographia Petri Beyer

M E E A N E

In Typographia Petri Beyer. 1755



Vita Nova
di M. S. (litti)
Latina - (B. Piave)

1971

